

ABETAEI

MEDICINA







392

A. XIV. b

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

500 FIFTH AVENUE NEW YORK

RECEIVED

APR 10 1895

LIBRARY

RECEIVED

APR 10 1895

LIBRARY

RECEIVED

APR 10 1895

LIBRARY

RECEIVED

APR 10 1895

LIBRARY

RECEIVED

APR 10 1895

LIBRARY


RECEIVED

APR 10 1895

LIBRARY

RECEIVED

APR 10 1895



ARETAEI CAPPADOCIS

MEDICI INSIGNIS AC VETVSTISSIMI
LIBRI SEPTEM

Nunc primum e tenebris eruti

A IVNIO PAVLO CRASSO PATAVINO
accuratissime in latinum sermonem uersi.

RUFFI EPHESII

MEDICI CLARISSIMI,

De corporis humani partium appellationibus

LIBRI TRES.

AB EODEM IVNIO PAVLO CRASSO
latinitate Donati.

Quæ in omnibus his libris scitu ac memoria digna habentur,

INDEX LOCUPLETISS.

Operis calci appositus demonstrabit.



VENETIIS APVD IVNTAS.

M D L I I

Cum summi Pontificis Senatusq; Veneti
Decretis ad Annos decem.

AR ETAT CAP PAPABOIS

MEDICI IN SIGNIS AC VETVSTISS

LIBRI SEPTIMA

Nunc primum e tenebris erui

A IVNIO PAVLO CRASSO CATVINO

acceptissimae in lullion scripturae

RVTI EPHESI

MEDICI CLARISSIMI

Decorporis humani partium appellationibus

LIBRI TRES.


AB HOMIN IVNIO PAVLO CRASSO

laetantur Domini.

Quin omnia his libris ac memoris dignitas

INDEX LOCVTETIS.

Operis cuius appellationis demonstrabit.



VENETIIS AD V. I. N. T. A. S.

M. D. C. I.

Quin hunc librum hunc librum hunc librum
De hunc librum hunc librum hunc librum

ILLVSTRISS. PRINCIPI

ALBERTO SENIORI,

*Marchioni Brandenburgensi, Prusiae, Stetini, Pomeraniae,
vandalarum, Cassubiorumq; Duci, Burggraui
Norimbergensi, ac Rugiae Principi,*

IVNIUS PAVLVS CRASSVS S. P. D.



*Vo longè omnium pulcherrima, diuinisq; operibus
consimilia nobis à dijs fuisse concessa, veritatem
scilicet eloqui, & mortalibus benignè facere Pytha-
goras ille philosophorum sapientissimus asserebat. Id
ego mecum saepe animo reputans ALBERTE
princeps Illustrissime verissimam tanti philosophi
sententiam esse cognoui. Deus nanque cùm res omnium summa, per-
fectissima, verissimâque sit, cuiusque veritatis fons est vberimus.
idem cùm sit perquàm beneficus & liberalis, in omnem mundum
munera sua longè latèque diffundit: & quicquid est, à Deo vitam
& perfectionem, quantam eius natura capere potest, adipiscitur. qua-
propter ego Deum imitari, eiusque muneribus aliquo pacto defungi
cupiens, vt primùm per ætatem licuit, veritatem docere, atque hu-
manum genus pro virili parte iuuare constitui. Inde factum est, vt
annos propè viginti in nostra Patauina Academia per totam Euro-
pam celeberrima Hippocraticam medicinam publicè non infrequenti
auditorio interpretatus fuerim. Verùm cùm ab eo docendi officio ni-
mijs laboribus deterritus corpusculi que nostri valetudini consulens de-
stitissem, alia ratione veritatem patefacere, humanòque generi opem
ferre quærebam. Ea verò est, aut aliqua per me vtiliter inuenta lite-
rarum monumentis commendare, aut veterum autorum obsoleta do-
cumenta illustrare, in hominùmque memoriam reuocare. Cùm in hac
animi fluctuatione versarer, fortè liber quidam græcè manu scriptus,
veterrimus, & cariosus in manus meas incidit: in fronte libri nomen
authoris inscriptum erat Aretæi videlicet Cappadocis: de morbis age-
bat, qui singulatim humani corporis membra corripunt: ipsum auidè,*

* ij vt

ut mihi moris est, & ter & quater perlegi. perlectus liber cum gaudio, tum moerore animum perfudit meum. Quippe gavisus sum tam egregij autoris librum, qui vetustatis iniuria hominumque socordia in tenebris tot secula iacuisset, in lucem Dei beneficio fuisse vindicatum. Indolui vero non mediocriter ipsum non sanum, non integrum, sed multis mendis inquinatum, multis magnisque vulneribus concisum & laceratum ad manus nostras delatum esse: Ceterum haec fragmenta colligere, utque pluribus vsui forent, latina facere, ac publicare satius esse iudicavi, quam ea in totum carie, tineis, situque deleri permittere. Scriptor enim mihi plurimi faciendus visus est: nam salutaria in primis documenta proponit: auxiliaque pellendis morbis praesentanea recenset. quo quid magis expetendum mortalibus sit, nescio. quid enim cetera vitae bona affecto languentique corpore proficiunt? praeterea summopere lectorem detinet, atque delectat. nam & quatenus materiae conuenit, grandiloquus est cum ampla & sententiarum gravitate, & maiestate verborum, vehemens, varius, copiosus, ad permouendos animos acerrimus, ipsa quoque vetustate venerabilis. Qua vero tempestate vixerit, apud nullum graecum latinumue scriptorem haeterus reperire, aut certis coniecturis assequi valui. Natione Cappadox fuit, ut libri testatur inscriptio. in qua regione, licet barbara, tres tamen gentes Graeca Dorica, Ionica, & Aeolica floruerunt. Galenus cum huiusce Aretae nusquam meminerit, alioquin veteres medicos saepe commemorans, nullam de eo notitiam habuisse videtur. Paulus Aegineta semel eum initio quarti sui voluminis, Aetius vero Aetius frequentius nominauit. Suae patria lingua ionica scribit: Hippocraticamque dicendi formam, idest breuitatem cum gravitate coniunctam emulatur. Hippocrate nanque fuit aetate posterior: siquidem eum nonnunquam testem adducit: eiusque vel integros aphorismos in suis voluminibus conscripsit. Nulli se sectae addictum se Aretaeus aperte demonstrat: in quibusdam enim ab Hippocrate, Galeno, Aristoteleque dissentit. De nonnullis etiam morbis propria quaedam a nullis alijs tradita, rationi tamen consentanea, scituque dignissima exponit. Quam multos in eo transferendo labores tulerim: quantum temporis atque olei absumpserim, vix queam dicere, cum plurimis undique vulneribus confossus esset. ex tribus tamen collatis exemplaribus multa, quae deficiebant, restitui: quae erant deprauata, castigavi: quae confusa erant, in ordinem redegi. per coniecturas etiam certissimas ab artis medicae peritia

peritiam desumptas, non paucos locos librariorum incuria vitiatos antiquæ & sanæ lectioni restitui. De quibus autem ambigebam, neque sinceram veritatem eruere, mihi quæ penitus satisfacere poteram, eos asterisco notavi: aliorum quæ iudicijs pensandos castigandosque reliqui. Ut quæ in summa dicam, quantum huic libro opis attulerim, qui candida mente, & liuore purgata ipsum curiosè lectitabunt, & cum græcis exemplaribus conferent, facillè deprehendent. Libellus præterea quidam Ruffi Ephesij De medicinalibus appellationibus inscriptus Francisci Frigimelici medici nobilissimi, & omnibus reconditis disciplinis ornatissimi opera cum ad me allatus esset, auctoris præstantia atque eruditione cognita, eum quoque eadem de causa latinitate donandum, Aretæoque adiungendum esse iudicaui. Vterque enim vetus scriptor est: Vterque græca oratione artem medicam literis commendauit. Fuit sanè Ruffus Traiani Adriani quæ Cæsarium temporibus medicus eximius Ephesi natus Vrbe Ioniæ celeberrima, minorisque Asiæ Metropoli. Hic multos de medendi facultate libros eruditissimè composuit, magnique Galeni testimonio laudari commeruit. nam de atrabile neminem exactius luculentiusque, quàm Ruffum, disseruisse commemorat. Verùm ex tot eius doctissimis libris hic vnus, quod ego sciam, vix reliquus est. in quo singularum corporis partium græca vocabula enumerat: nec non & earum positum, figuram, numerum, vsum, facultatesque declarat. Igitur hunc libellum perutilem, dignumque, qui ab eruditis perlegatur, latina lingua donare, & in manus studiosorum proferre haud alienum duximus. Neque hîc parum diligentiae adhibendum fuit, cum græcis vocibus latinas respondentes indagaremus: neque id in omnibus semper assequi possemus. Interdum enim linguam nostram vocabulorum inopem (nisi forsân hoc ignorantia nostra factum sit,) inueniebamus. At vbi nos latina deficerent, græcis, quemadmodum & in alijs doctrinis fieri solet, pro latinis vsumus. Porro illud monitos lectores velim, huiusce libelli primam partem à Ruffo bis eisdem ferè verbis fuisse conscriptam, eademque fermè ad vnguem repetita. Quo id consilio fecerit, diuinare nequeo. Ego verò cum ita manu scriptum librum offenderim, ita & transferre, & ædere libuit. neque enim ex toto partes hæc similes sunt: Sed nonnulla, quæ in altera desunt, in altera reperiuntur: nonnulla, quæ in altera obscure ac breuibus perstricta sunt, in altera clarius ac fusius explicantur. Hos itaque peructeres ac præstantissimos artis medicæ scriptores, ne
eorum

eorum, qui de humano genere bene meriti sunt, memoria prorsus euanesceret, diuulgare cum mihi in animo esset, meaue commendatione apud vulgus eos minus probatum iri suspicarer, sub tuo nomine id facere optimum esse censui Illustrissime ac Sapientissime Princeps. Te verò potissimum inter Christiani nominis principes delegi, cui has lucubrationes meas dicarem, quod te constans fama & sanctissimis moribus, & vera religione insignem, bonarumque disciplinarum alumnus, & parentem celebrat. non potui igitur non te maxima veneratione atque amore prosequi: cum nihil sit in terris optimo principe dignius, nihil amabilius: nihil, si modò humana diuinis conferre fas est, quod magis Deo simile dici queat. Verus enim princeps ille est, qui ut dignitatis fastigio, perinde & virtute ceteris mortalibus præstat. Qui talis autem agnoscitur, is tanquam terrestris Deus, aut saltem Dei vicem gerens inter homines, suspiciendus, ac sanctè pieque obseruandus est. Iccirco & antiquitus populi & ciuitates viros probitate vitæ excellentes ad magistratus & ad imperia prouehebant: eosque vel inuitos imperare cgebant. Ut Scylax de regibus Indiæ memoriæ commendauit. Te verò huiusmodi esse, hisque de causis tanto imperio dignum iudicatum, Maxime atque Optime Princeps, nemo tam rerum imperitus est, qui nesciat. Ea enim in te omnia sunt, quæ in summo rege inesse debere omnis testatur antiquitas. Porro familiæ tuæ, maiorumque tuorum splendorem, ac fortia facta consultò prætereo, quando quidem Quæ nos, (ut poeta ille dicebat,) non fecimus ipsi, vix ea nostra puto. At quæ tua propria sunt, & verè regia ornamenta, ea planè digna sunt, quæ ab omnibus in cælum ferantur, ab omnibus memoriæ ac literis prodantur. Admirabilis prudentia, quam propriam regum esse virtutem Aristoteles voluit, in primis apparet. per eam enim tantam molem tuæ latissimæ ditionis tam in bello, quam in pace scientissimè gubernas ac moderaris: populisque tuis ventura incommoda longè prospiciens & cauens eos in summa tranquillitate conseruas. Iustitia præterea, quæ cuiusque regni firmissimum vallum ac munimentum est, nullo vnquam in principe, quam in te clarius enituit. nam sua cuique pro meritis tribuis: diuites potentioresque non depressis: pauperes atque humiles sustines, foves, à contumeliisque defendis. Liberalitatem autem tuam, & erga omnes, sed præcipuè literarum cultores munificentiam quis vnquam satis pro meritis laudauerit? Plurimos enim ære tuo non in Germaniæ modò verum etiam Italiæ gymnasiis

gymnasius vberimè fouisti atque sustentasti: scholam Regiomontanam instituisti: doctissimisque viris, qui studiosam iuventutem erudirent, vndique accitis exornasti: bibliothecam quibuslibet veterum scriptorum libris refertissimam profusissimis impensis condidisti. quam qui viderunt, cum antiqua illa Philadelphi Aegyptij bibliotheca certare contendunt. Nempe fortitudinem, quanta in te sit, res in bello strenuè ac fortissimè per te gestæ omnibusque vel remotissimis gentibus manifestæ declarant. Humanitatem & clementiam incredibilem non modò subditi, sed & finitimæ & longinquæ nationes testantur: cum nemini vnquam te adire volenti occludatur accessus: nemini vnquam irrita ceciderit, modò fuerit honesta petitio. Iure itaq; Homeri poetarum principis carmina illa de te cani possunt, quibus bonus princeps pastor populorum dicitur: Iuppiter deorum hominumque pater appellatur. Quid mirum ergo, si tu virtutibus adeo fulgens, in tanta fortunæ amplitudine positus, (quæ duo in eodem rara inuentu sunt,) me ad te amandum, & quoquo modo possem, colendum illexisti, vel potius attraxisti? Ac non vereor, ne flagitiosa quadam assentatione aucupari tuam gratiam videar: neque enim tu is es, qui sis nescius eos magis, qui te non admirentur, inuidos, quàm eos, qui laudent, assentatores esse iudicandos. Nam quæ de te hæcenus prædicauimus, neque mea commenta sunt, neque solus attestor: sed hæc passim Germani, Sarmatæ, Itali homines, neque vulgaris notæ, sed grauissimi quique viri vno ore fatentur, ac celebrant. Hisce ego rebus impulsus, sed tua potissimum lenitate mansuetudineque fretus benignissime Princeps hosti tibi dedicauimus libellos, non me latet, quàm ignobile, quàm sordidum munusculum: At me legisse memini Artaxerxi Persarum regi cognomento Memori agrestem quendam haustam è proximo flumine aquam caua manu obtulisse: neque ab eo reiectum, sed comiter acceptum & phiala aurea, stola persica, multisque daricis donatum abiisse. Dices forte, quid principi cum medicorum libris? multa & præclara priscorum regum exempla adduci possunt, Attali regis minoris Asiæ, Gentij Illyriorum, Iubæ Mauritaniæ, Mithridatis regum barbarorum maximi. Hi omnes medicinæ scientiam adamarunt, diligenterque coluerunt: Quod nisi iam plus æquo vagatus essem, tibi Valentissimis argumentis ostenderem, principi viro nihil medicina charius, nihil iucundius, nihil fructuosius in vita accidere posse. Itaque ne tuas aures grauissimis in administranda republica negociis occupatas diutius inani loquacitate fatigem, finem faciam, si
hæc

hæc pauca ad iecero, me in his vertendis auctoribus fidelem, quàm elegantem atque disertum esse maluisse. cum in arte medica res spectentur, non verba pendantur. Sterilis quoque materia est morborum natura & curatio: neque magnæ, (in alieno præsertim libro) facundiæ capax: quæ alioquin nobis tenuissima est. Sed iam aliud opus, quod deus fortunet, sanè quàm pulchrius meo iudicio, longèque vtilius amicis nostris hortantibus, ac propè impellentibus aggressi sumus: vbi non alieni scriptoris sententijs adstringemur, sed proprijs viribus nitentes spatiamur. latius excurreret oratio, amœna interdum quæret diuerticula: casus mirabiles, euentus varios, aliaque iucunda dictu, ac legentibus non minus frugifera, quàm blanda narrabimus. Interim hos libellos nostri erga te animi veluti arrabonem qualemcunque mittimus, grandiorum librum, & magis operosum, si hos non respueris, missuri posterius. Vale.

ARETAEI CAPPADOCIS

MEDICI INSIGNIS

DE CAUSIS ET SIGNIS ACUTORVM MORBORVM

Liber Primus sine principio,

Iunio Paulo Crasso Patauino Interprete.

Hæc sunt integri Libri Capita. Ex quibus
prima quatuor perierunt.

De Phrenitide.	Cap. I.
De Lethargo, seu Vaterno.	Cap. II.
De Tabe.	Cap. III.
De Apoplexia.	Cap. IIII.
De Accessione morbi comitialis.	Cap. V.
De Tetano seu Rigore.	Cap. VI.
De Angina.	Cap. VII.
De Affectibus columellæ.	Cap. VIII.
De Tonfillarum ulceribus.	Cap. IX.
De Pleuritide.	Cap. X.

De causis & signis accessiōis morbi comitialis. Cap. V. sine principio.

hebetudines, vertigines, tendonum grauitates, venarum colli reple-
tiones & distentiones. nausea frequentius quidem à cibis; non mini-
mè tamen & ab inedia pusilla quædā nausea sequitur: & vberior pitui-
ta fit vomitus. paucis assumptis cibis fastidiunt, & crudi sunt. flatibus
replentur: præcordia elata habēt. Hæc sanè perpetuò comitantur. Cùm
vero accessio appropinquat, splēdores quidam purpurei, aut nigri, aut
omnes vnà permixti ob oculos in orbem versantur, ac discunt: vt in
coelo Iris prætentata esse videatur. foedum odorem sentiunt: aures sonāt,
iracundi fiunt: bilis præter rationem accēditur. Quidam igitur leui de
causa, vtpotè ob animi angorem, ceciderūt: aliqui intentè fluminis de-
cursum, aut rotā, quæ circūuoluitur, aut turbinem, qui in orbem agi-
tur, conspicati: alios autem rerum graueolentiam, vt gagatis lapidis
odoratus prostrauit. His vtique in capite vitium inhæsit, atque inde no-
xam inferens ortum habet. Nonnullos verò & corripit à neruis procul
à capite positis incipiens, quicūque principium in consensum affectus
inducunt. Itaque magni manuum, aut pedum digiti conuellūtur: vn-

A R E T A E I

de & dolor, & stupor, & tremor sequitur. atq; hæc in caput impetum **E**
faciunt, si & malum surrepens caput inuasit. His porro fragor quidam
redditur perinde, ac si ab ligno, aut lapide verberentur. cumque ab hu-
mo surrexerunt, quædam tanquam si ex insidijs vapulassent, comme-
morant. hoc sanè pacto illi, quibus primò id malum incidit, decipiun-
tur. Quibus verò familiare & consuetum est, simul atq; morbus in di-
gitum impetum dedit, aut inde exortum est, vsitatos, qui adsunt, adiu-
tores inclamant, futuramq; ab experimento calamitatem prospiciunt:
obsecrant quoq; vt membra, vnde oritur, constringant, reflectant, di-
rigant. quinetiam ipsimet sibiipsis affecta membra, tanquam inde mor-
bum eximentes trahunt, velluntq; atque ita sibi met auxiliantes, non- **F**
nunquam & nos ad ægritudinis notitiam impulerunt. Nonnullos vti-
que ceu inuadente fera pavor corripuit, aut adumbrationis opinio in-
cessit, atque ita prociderunt. At in ipso morbi insultu sensibus captus
homo iacet: manus ipsi neruorum distentione conuelluntur. crura ve-
rò non solum distracta sunt, sed etiam huc atq; illuc à tendonibus proj-
ciuntur. Id genus calamitas iugulatis tauris haud absimilis est: ceruix in-
curuatur, caput variè distorquetur. siquidem nonnunquam primum,
ceu arcus, inflectitur, quando pectori maxilla adhærescit: nonnunquam
verò in scapulas refringitur: veluti his, qui per vim crinibus trahuntur,
vsu venit. quando modò in hanc, modò in illà partem ad humeros ad- **G**
mouetur. Sic laborantes magno hiatu os aperiunt: id siccum habent,
linguam prælongam: vt periculum sit, ne aut magno vulnere faucietur,
aut penitus abscindatur. Interdum cōuulsione dentes inter se collidun-
tur: oculi inuerfi sunt: palpebræ cum palpitatiōe frequenter dehiscunt.
quòd si quando conuiuere velint, palpebræ non committuntur, sed al-
ba oculorum cernuntur, ac subapparent. Supercilia nonnunquam, vt
his, qui ad iram concitantur, in glabellam attrahuntur: nonnunquam
ad tempora vehemēter admodum reuelluntur: vt cutis circa frontem
valde prætenta sit, atq; in superciliorum medio rugæ euanuerint. Ma-
læ rubentes palpitant. Labia interdum quidem in acutum clauduntur: **H**
interdum verò ad obliqua dilatantur: quando in ridentis speciem der-
tibus circumtenduntur. Malæ rubent quidem, sed cū morbus incre-
uit, & faciei liuor accedit: ceruicis vasa distenduntur: vox, vt in strangu-
latu, aufertur. etiam si vehementer inclames, non sentiunt. eorum vox
nihil nisi gemitus & suspirium est. respiratio verò suffocatio quædam
est, veluti in his, qui laqueo strangulantur. Inter initia arteriarum mo-
tus vehemētes sunt, & celeres, & parui: in fine verò magni, tardi, & lan-
guentes: in vniuersum autem ordine carentes. Penis quoq; erectio se-
quitur. Hæc vtique circa accessiōis finē patiuntur. Vbi ad mali remis-

sionem perueniunt, tunc sponte vrinam reddunt, alius fluit: nonnullis etiam adstrictis compressisq; vasculis genitura excernitur. id vero & dolore irritante, & humiditate erumpente accidere potest. siquidem & istis neruorum dolores fiunt. Ad hæc os vehementer humidum habent: pituitam multam, crassam, & frigidam: eam si trahas, in longum, veluti filum, ipsius multitudinem deduces. Porro temporis longitudine, et laboris vehementia, quæ intra pectus sunt, feruent. spiritus vero intus coercitus omnia concutiet. eorundem quoq; et conuulsio & perturbatio sequitur. inter respirandum præterea humores & os & nares inūdant. spiritus cum humore effertur. Cum præcedens vero strangulatio remittit, omnia item remittere videntur. Quinetiam, vt magnis procellis concitatum mare, spumam ore profundunt: quando & tanquam iamdudum expulso morbo resipiscunt, & resurgunt. Cæterum cum à morbo quiescunt, ab initio, membris segnes sunt: capitis grauitate premuntur: dissoluti sunt, languidi, pallentes: consternati animo ob lassitudinem morbiq; vetecundiam contristantur.

De Tetano, seu Rigore. Cap. VI.

Tetani musculorum, qui in maxillis sunt, & tendonum distentiones sunt, dolorem quidem magnum inferentes, celerrime vero necantes, haud facile quoque sanabiles. At noxæ ab hoc malo cum omni corpore communicantur: omnia enim cum principiorum vitijs consentiunt. Species verò conuulsionis tres sunt, cum rectum corpus riget, aut retrorsum flectitur, aut prorsus versùs incuruatur. Recto quidè corpore Tetanus dicitur, cum neutram in partem detortus homo, atq; inflexilis contentus est. At conuulsiones, quæ retrorsum, aut in priorem partem fiunt, à tentione et loco nomenclaturam accipiunt. Nam in auersam partem ægrotantis reclinationem *Opisthotonon* vocamus, neruis, qui eo loci sunt, male affectis: *Emprosthotonon* autem, si in priorem partem homo deflectitur, neruis antè positis laborantibus. Tonus enim neruorum, tentionisq; vocabulum est. Causæ autem istorum infinite sunt. nam ob vulnera fieri solent, membrana, aut musculis, aut neruis punctis, ex quo plerunque moriuntur. A vulnere enim conuulsio letale est. *Conuellitur* autem & ex abortu mulier: verum & hæc raro admodum euadit. & ab aliquo vehemente ceruicis ictu nonnulli conuelluntur: Et frigus longe excellens horum vitiorum causâ esse potest. Quapropter hyems omnium maxime horum vitiorum ferax est, secundo loco, ver & autumnus, æstas autem minime, nisi vulnus præcesserit, aut peregrini morbi grassentur in vulgus. Mulieres sanè magis, quàm viri, neruorum distentione tentantur: frigida enim sunt. verum ipsæ fre-

quentius liberantur, quoniam humidæ sunt. Quantum ad etatæ atti-
 net, pueri assidue hoc morbo vexantur: sed non admodum pereunt, quod
 illis vsitatum & familiare id vitium sit. Iuuenes aut rarius, quam pueri, id pa-
 tiuntur: sed crebrius intereunt: viri minimè. At senes inter omnes ma-
 gis & eo vitio corripiuntur, & eo necantur. In causa est frigiditas & ari-
 ditas senectæ, & mortis natura. Cæterum si frigiditas cum humido cō-
 iungatur, minus noxiæ sunt conuulsiones, minusque ab ipsis discrimen
 impendet. Affectum hunc ista comitatur, omnes subito atque affatim
 corripit, labor & intentio tendonum adest, et dorsi, et musculorum, qui
 in maxillis & pectore sunt. Inferiorem enim maxillam superiori anne-
 ctunt adeo, ut neque vectibus, aut cuneis per Iouem facile diduci possint.
 Quod si quis vi detes abducens humorem instillauerit, non demittunt, sed
 effundunt, aut ore continent, in nares retrudunt. Isthmus enim simul
 inhærescit, ac tonsillæ duræ atque intentæ eius, quod deuoratur, impres-
 sioni non cedunt. Facies est rubida, variegata, oculi ferme rigentes, qui
 vix circumuoluantur, strangulatio vehemens, spiratio vitiosa, manu-
 um crurumque distentio, musculi palpitantes, facies varijs modis distor-
 ta, buccæ & labia tremunt, maxillæ quatuntur, dentes strident. In alio
 verò quodam & aures mouebantur. Ego sanè vidi, & miratus fui, lo-
 tium supprimi vsque ad insignem meiendi difficultatem, aut sponte ef-
 fundi, cum vesica premeretur. Hæc utique omnibus conuulsionis gene-
 ribus communia: propria verò cuiusque hæc sunt, Tetani quidem in re-
 ctum totius distentio, nullam prorsus in partem detorta, neque decli-
 nans. recta quoque sunt crura & manus. Opisthotonus verò retrorsum
 incuruat hominem, ut reflexum caput inter scapulas locetur. guttur ex-
 tat: maxilla inferior plerumque dehiscit, & rarò cum superiore commit-
 titur. in respirando stertunt, venter & pectus prominent, lotium his mi-
 nus contineri potest. abdomen intentum est, & si percutias, resonans.
 manus retrorsum extentione detorquentur, crura inflectuntur. e contra-
 riò poplites vitiosè curuantur. At si in priorem partem contrahun-
 tur, conuexa quidem his terga sunt æqualiter cum parte pectori op-
 posita, quam Metaphrenon Græci appellant. coxendicibus extra pul-
 sis, dorsum totum rectum est: vertex, caputque in pectus vergunt: men-
 tum ossibus pectoris affigitur: manus confertæ sunt, & cohærentes: cru-
 ra extenta. Dolores omnium atroces, vox omnium flebilis. suspirant au-
 tem mussantes profundius. Si pectus & spiritum morbus occupauerit, fa-
 cile migrant è vita. Bonum quidem ægotanti, quod laboribus, distor-
 tione, turpitudineque liberatur. præsentibus quoque hominibus minus
 triste, seu filius, seu pater sit. Verum si in vita adhuc perdurent, spiritu li-
 cèt vitiato, nihilominus permanente, prorsum versus non arcus modo

instar, verum et orbis incuruantur: vt caput genibus adnexum habeant, eruraq; ac terga in priorem partem refracta sint adeo, vt genu articulus in poplitem depulsus esse videatur. Inhumana calamitas, iniucundus aspectus, triste intuenti spectaculum, et malum insanabile. ob inuersionem aut vel ab amicissimis hominibus non agnoscuntur. Votum quoq; illis, qui adsunt, prius impium, nunc honestum efficitur, ægrum vita defungi, quo vna cum vita doloribus et acerbis malis liberetur. Quinetiam neq; medicus præsens atq; aspiciens, ad vitam, aut ad doloris leuamen, aut ad figuræ emendationem quicquid operis afferre potest. Nam si membra dirigere velit, viuentem sanè hominem distraxerit discerpseritq;. Igitur victis à morbo nihil ultra subueniēs cōtristatur dūtaxat. Hæc verò est medici magna infelicitas.

De Angina.

Cap. VII.

A Ngina pacutus affectus est. spiritus enim compressio est. Duæ vero eius species sunt: aut enim instrumentorum spirandi phlegmone est, aut solius spiritus in seipso causam habetis affectus. Instrumentorum quidem, tonsillarum, epiglottidis, faucium, columellæ, summæ arteriæ. Quod si depascitur phlegmone, etiam linguæ & maxillarum interius: cum ob phlegmones excellentem magnitudinem linguam extradentes proferunt. oris enim cauernam implet, & ipsius quod abundat, extradentes exeritur. Hoc malum Synanche græce, Angina latine, & Cynanche, id est, Canina angina nominatur: aut quoniam huiusmodi animalia assidue hoc malo vexantur, aut quod etiam fana linguam exere confueuerunt. Alteri autem generi contraria eueniunt, instrumentorum collapsio, & singulorum naturæ insignis macies, et strangulatio vehemens: vt ipsismet in pectore, latentioribusq; partibus circum cor atq; pulmones abdita esse inflammatio videatur. Anginam hanc appellamus, quasi interius vrgentem, atque angentem. Ego vero existimo ipsius solius spiritus id vitium esse, praua conuersione ad calidissimum siccissimumq; conuersi, nulla corporis parte inflammatione laborante. Id autem mirandum non est: nam in * Charonœis strangulatus citra vllum corporis affectum acutissimi contingunt: immò vel vnica inspiratione prius, quam corpus aliquod maleficium contrahat, homines moriuntur. Quin etiam & à rabido cane, qui in faciem, dum spiritus adducitur, tantummodo inspirauerit, & nullo pacto momorderit, in rabiem homo agitur. Talem igitur respirationis mutationem interius fieri haud est ex his, quæ fieri nequeant: quando quidem & alia infinita eorum, quæ in homine sunt, eandem speciem cum exterioribus causis obtinent. succi perdentes intra corpus sunt, & exterius. morbi quoque medicamentis perniciosi assimiles. & à medicamentis talia vomunt, qua-

* Aliter
coronæ
is.

*Aliter
de canis rabie
rabie canis
rabie canis*

A R E T A E I

lia ob febres vomere solent. Quocircà neque à ratione alienum est in pestilentia, quæ Athenas afflixit, nonnullos existimasse in puteos Piræi à Peloponensibus venena fuisse coniecta. homines enim pestilentis morbi cū letalibus medicamētis similitudinem ignorabant. Adest sanè Canis angina laborantibus tonsillarū, faucium, totius oris inflā-matio: lingua extrà dentes & labia prominens: saliuā effunditur: pituita crassissima ac frigida defluit: facies rubicunda & inflata est: oculi exerti, patentes, valde rubent: potus in nares refunditur: dolores acerbi sunt, sed strāgulatione vexati eos obscurius sentiūt: pectus & cor ardēt: frigidi aeris desiderium adest, & admodum exiguum inspirant eousq; donec demum intercluso ad pectus aeris transitu strangulentur. Nempe quibusdam cum pulmone vitium facile communicatur: hi vero per mutationē moriuntur. febres ignauæ oriuntur, molles, nihil proficientes. At si alicui in bonum res vertitur, abscessus secundum aurem hinc atque inde exterius, aut interius in tonsillis fiunt. Quod si cū torpore non admodum tardē fiant, euadunt quidem, sed cum dolore atque discrimine. Sin autem morbo in abscessum mutato tumor maior subest, in acutum abscessu insurgente repente strangulantur. Hæ sunt planè caninæ anginæ species. Anginam autē collapsio, gracilitas, pallor comitantur; oculi caui, interius demersi; fauces & gurgulio retracti; tonsillæ multò magis subsidentes, vocisq; priuatio. Huiusce speciei strangulatus longè, quàm prioris, violentior. quippe cū in pectore malum sit, vbi spirandi initium ponitur: eodem die moriuntur, qui celerrime. nonnunquam & ante, quàm medicum accersuerint. nonnulli & accersito medico nihil profecerunt; mortuus est enim æger ante, quàm medicus arte vteretur. Quod autem in melius vertitur, inflammata omnia, quæcūque extrorsum phlegmone impulerit. quare ex cynanche, idest, angina, fit cynanche, idest, canis angina. Bonum quoque est, si in pectore magnū oedema oriatur, aut insigne erysipelas. Egregius vero medicus aut cucurbitula in pectus malū detrahit, aut sinapim ossibus pectoris, aut partibus iuxta maxillas imponens extrinsecus * vlcerat, difflationemque molitur. Quibusdam sanè breui tempore vitium his auxilijs exterius tractū fuit, absolutum vero subito recurrit, & * ad interiora reuersum est. Causæ vtique infinitæ sunt, refrigerationes magis, exustiones minus, plagæ, ab ossibus pisciū penetrationes in tonsillas, frigide potus, ebrietates, saturitates, & mala à respiratione pdeūtia.

* Alia les-
etio at-
trahit,

* Alia
suffoca-
uit,

De affectibus Columellæ. Cap. VIII.

COrpus solidum ex palato pendens, inter tonsillas positū, Colum-na et Gurgulio nominatur. Vua enim affectionis nomē est. Colu-

- A** mella natura nervus est, sed humidus. nam in humido loco situs est. Iste itaque Gurgulio pluribus incommodis afficitur. Etenim phlegmone crassescit, æqualisq; à basi vsque ad extremum terminum efficitur in lōgum protētus, ac rubore suffusus. Columna huiusce vitij appellatio est. Si in extrema tantum parte rotundatur, & increfcit, liuet, atq; subnigricat, Vua huiusmodi affectus cognominatur: omnia enī vūe similia sunt, & figura, & color, & magnitudo. Tertius affectus est mēbranarum ab vtraq; parte iacentium, quæ veluti squāmæ latæ, aut vesperilionum alæ cōspiciuntur. id genus morbi Lorum vocatur: loris enim similes sunt membranarum in latum explicationes. At si in tenuem &
- B** oblongam membranam Columella desinat, veluti vrinaculum in extremis habens, Craspedon Græci hunc affectum nominant. quod mōtis radicem vel pedem significat. latino caremus vocabulo. Prouenit autem & id ex fluore, quēadmodum & alia vitia. Fit verò & per abscissionem obliquè factam ab vno tantum latere membranam relinquentem medico. Sin autem bicornis Columella reddatur, geminis mēbranis hinc atq; inde pendentibus, nomen quidē nullum obtinuit, verum affectus ipse perspicuus est. omnia verò hæc facile fuerit introsipientē dignoscere. Omnibus ipsis strāgulatus accidit, & egrè cibum potumq; deuorant. tussis quoque omnibus adest, sed præcipuè Loro vexatis, &
- C** Craspedo. quædam enim arteriæ titillatio à membranis oritur: nonnunquā verò & aliquid humoris in arteriā clanculum instillatur, vnde ad tussim prouocantur. Vuam autē & Columnā maior spiritus difficultas sequitur, et magis impedita deuoratio. in his enim humor in nares repellitur, quoniā tonsillæ vnā malè habentur. Senibus Columna accidere consuevit: Iuuenibus autē ac viris Vua. siquidem hi sanguine referti sunt, & inflammationi magis obnoxij. Pubescentes & pueros membranarum vitia sæpius infestāt. Secari autem omnia citrà noxam queunt. sed in Vua adhuc rubentibus locis sanguinis effluuium, & dolores, & phlegmones incrementum superueniunt.

D De Tonsillarum vlceribus. Cap. IX.

Vlcera in Tonsillis fiunt aliqua mitia, familiaria, non lædentia: Aliqua aliena, pestifera, necantia. Mitia quidē sunt munda, exigua, non altè descendunt, non inflammata, dolorem non excitantia. Pestifera sunt lata, caua, pingua, quodā concreto humore albo, aut liuido, aut nigro sordentia. Id genus vlcera Aphthæ nuncupātur. Quod si concreta illa sordes altius descenderit, affectus ille Eschara est, atque ita græcè vocatur, latinè Crusta. Crustam verò circūueniunt rubor excellens, & inflāmatio, & venarum dolor, quemadmodum in carbun-

* Aliter
exterior.

culo; & exiguae raræq; pustulae, quas Graeci Exanthemata vocant, oriē- **E**
tes, hisq; aliae superuenientes in vnum coalescunt: atque inde latum vl-
cus efficitur. Id si intērius in os depascendo serpit, ad Columellam vsq;
peruenit, ipsamq; exedit, & linguam etiā occupat, & gingiuas, & fre-
na, id est, dentium alueolos, dentesque inde labefactantur, & denigre-
scunt. In collum etiam phlegmone erumpit. atque isti haud ita multis
diebus post phlegmone, febribus, foetore, inediaq; cōsumpti intereunt.
At si in pectus per arteriam id malum inuadat, illo eodem die strangu-
lat. pulmo enim & cor neque talem odoris foeditatem, neq; vlcera, ne-
que saniosos humores sustinent: sed tussis spirandiq; difficultas enasci-
tur. Causa maleficij tonsillarum est frigidorum, asperorum, calidorū, **F**
acidorum, adstringentiumq; deuoratio. quandoquidem hae partes pe-
ctori ad vocem spiritumq; ædendum inseruiunt: & ventri ad alimenti
transmissionē, & gulæ ad eiusdē deuorationem obsequio sunt. Inter-
nis verò partibus si quod contingat incōmodum, ventri videlicet, gu-
læ, & pectori, ad isthmum, & tonsillas, & loca ibi posita mali cōsensus
& eructationes perueniunt. Quapropter pueri vsque ad pubertatem
maximè hoc morbo tentantur: præcipuè nanque pueri multum frigi-
dumq; aerem inspirant. quoniam in his plurimū caloris inest, & ad ci-
bos intemperantes sunt, & varia concupiscunt, & frigidam potant, &
excandescunt ac ludentes altius vociferantur. Puellis quoque vsq; ad **G**
mensruæ purgationis tempora hae vitia vsitata sunt. Regio Aegypti
horum affectuum planè foecunda est. aer enim spirādo siccus adduci-
tur. varios præterea cibos suggerit. radices enim, herbae, atque olera ibi
largè proueniunt, & acria semina, & potio crassa, vtpotè Nili aqua. sibi
verò Aegyptij ex ordeo, & ex flocibus seu vinaceis potiones acres cōfi-
ciunt. Syria quoque, maximè illa, quæ Cœle, id est, caua nominatur, hu-
iusmodi morbos procreat. vnde ægyptia & syriaca vlcera id genus ap-
pellant. Modus verò mortis quā miserimus accidit. Dolor quidem
acer, & calidus, qualis in carbūculo, spiritus vitiat. exhalāt enim ma-
ximæ putredinis odorem, eūdemq; vehementer in pectus spirādo ad- **H**
ducunt. Immūdi adeo sunt, vt neq; suum ipsorum odorem ferre que-
ant. Pallida his seu liuida facies, febres acutæ, sitis, vt igne accēsi videā-
tur. Potum, veriti dolores, non admittunt. tristantur enim, cū tonsil-
læ comprimuntur, aut potus in nares refilit. cūque decumbunt, sur-
gunt, vt sedeant, decubitus non ferentes. quod si sedent, quiete caren-
tes, iterum decumbere coguntur. plerūque autem recti stantes obam-
bulant. nā quiescere nequeūt. solitudinē fugiunt dolorē tollere dolore
tentātes. Inspiratio magna est, frigidū enim aerem ad refrigerationem
desiderāt: expiratio verò parua. Nā veluti igne exusta vlcera cū sint,
a calido

A à calido præterea spiritu incenduntur. raucitas adest: vox nihil significat. Atq; hæc in peius ruūt, cum subito in terrā collapsis anima deficit.

De Pleuritide, id est, morbo, lateris. Cap. X.

S Vb costis, dorso, & internis pectoris ad iugula vsque tenuis membrana robustaq; ossibus inhærens substrata est, cui nomen succingens inditū est. In hac cum phlegmone suborta fuerit, ignis adest cum tussi & sputis varijs. Pleuritis morbus iste à Græcis appellatur. Opus est autem omnia hæc inter se cōsonare, atq; conspirare ab vna causa pendencia. Quotquot enim ex his sparsim alia ab alia causa proueniunt, & si omnia simul ingruunt, Pleuritis non vocatur. Hunc affectum comitatur dolor acutus ad iugula ascendens, ignis acer. Decubitus in latus inflāmatum facilis est. in sua enim ipsius sede collocatur. in oppositam verò partem decubitus dolorem cōcitāt. à pondere enim, & phlegmone, & suspensione in omnes membranæ continuas partes ad humeros vsque & iugula, quibusdam verò & in terga, & in dorfi scapulas dolor protenditur. Pleuritida veteres Græci appellarunt, Latini morbum lateris, vel costarū. Eam verò sequitur difficilis spiritus, vigilia, ciborum fastidium, malarum rubor hylaris, tussis arida: sputa egrè exeuntia, pituitosa, aut biliosa, aut abūdè cruenta, aut subflaua: & hæc ordinem nō seruantia, sed aliās alia aduenientia ac recedentia. Ex omnibus verò peius est, si cruentum sputū desit. Delirant autē: & nōnunquā comate occupantur: atq; in soporem grauem inclinantes mentis alienationē patiuntur. Itaq; si in malum vertatur morbus omnibus in peius vergētibus, intrā septimam isti in syncopam lapsi consumuntur. At si in secūda hebdomada educi sputa incipiant, & mala augescāt, decimoquarto die pereunt. Nonnunquā sanē intrā huius temporis spatium omnium in pulmonem transitus est. Trahit enim in seipsum pulmo rarus, & calidus, & ad p̄xima trahenda sese cōmouens. Tuncq; morbi trāsp̄ositione repente homo strangulatur. Cæterū si diem hūc ægrotus transierit, atq; intrā vicesimum non moriatur, in empycum, hoc est, pectore suppuratū euadit. Hæc p̄fectō, si morbus ad perniciē tendat, eueniunt. At si in melius vergat, sanguinis è naribus larga p̄fusio cū impetu succedit: tūcq; repente morbus discutitur. qñquidem et somnus oritur, & pituitæ reiectio aduenit, postea bilosorū tenuium, deinde multò tenuiorum, rursus verò cruentorū, crassorū, carnis formā referentiū. Quòd si post cruenta iterū exeat bilis, post ipsam pituita, secuta est hæc in pristinum restitutio. Hæc si tertio die incipiunt, & facilè extusciunt, lēuia, æqualia, humida, rotunda, septimo die liberantur. qñ & venter biliosa exturbat, spiratio cōquiescit, mēs ad se redit, febres decrescūt, ciborum

appetētes sunt. Si secūda verò hebdomada hęc inchoātur, decimo quar- E
 to die sanātur: sin minus, in empyema, hoc est, pectoris suppurationem
 morbus vertitur. Id verò rigores indicāt, doloresq; punctorij. sedere cu-
 piunt, spiritus deterius ducitur. tunc metus maior est, ne pulmo pus
 multum subito attrahens hominem suffocet: qui prima & maiora ma-
 la euaserat. Verū enim uerò si inter costas morbus irrepsit, easq; dis-
 iunxerit, & plegmones fastigium extrorsum deprompserit, aut ver-
 sū intestina eruperit, plerunque homo ad sanitatem redit. Inter anni
 tempora hyems maximè huius morbi ferax est: secundò autumnus:
 ver minus, nisi interdum frigidum sit: æstas verò minimè. Quantum
 ad ætates attinet, in primis senes pleuritidi sunt obnoxij: qui etiam sæ- F
 pius, quàm alij, liberantur. neque enim magna phlegmone in arido
 corpore excitari potest, neque in pulmonem transitus facilis est. quip-
 pe qui est in senectā, quàm in alia ætate frigidior. quando & spiratio
 parua est, & omnium attractio imbecilla. Iuuenes autem & viri haud
 ita frequenter in hunc morbum incidunt: verū neque admodum
 frequenter euadunt. nam neque ab exigua causā, neque ob exiguam
 phlegmonem ægrotant. In magnis autem maius inest pericu-
 lum. & pueri minimè pleuritide corripuntur, minusq; ab ea
 periclitantur. quando quidem puerilia corpora ra-
 ra, humida, fluxaq; sunt, ac multa est in eis dif- G
 flatio atque digestio. quocircā neq; ma-
 gna contrahitur phlegmone.
 ea est huius ætatis in hoc
 morbo fœli-
 citas.

ARETAEI CAPPADOCIS

DE CAUSIS ET SIGNIS

ACUTORVM MORBORVM,

Liber Secundus.

IUNIO PAVLO CRASSO PATAVINO

INTERPRETE.

Hæc insunt in secundo Libro.

De Pulmonaria.	Cap. I.
De Sanguinis reiectione.	Cap. II.
De Syncopa.	Cap. III.
De Ardoribus.	Cap. IIII.
De Cholera.	Cap. V.
De Voluulo.	Cap. VI.
De Iecinoris acutis morbis.	Cap. VII.
De Cauæ venæ acuto morbo.	Cap. VIII.
De Renum acutis affectibus.	Cap. IX.
De Vesicæ acutis affectibus.	Cap. X.
De Vteri strangulatu.	Cap. XI.
De Satyriasi.	Cap. XII.

De Pulmonaria, Cap. I.



B DVO potissimum viuunt animalia, escam videlicet & spiritum. ex his multo magis vitæ conducit spiratio. hanc enim si quispiam supprimat, non diu feret incolumis: sed protinus interibit. Huius instrumenta multa parata sunt. Initium sunt Nares: via est Arteria: locus continens Pulmo. Pectus autem pulmonis est vallum & conceptaculum. Verum cætera vt instrumenta solum animali subseruiunt, pulmo vero attrahendi causam in se continet. Næque in ipso medio calidum viscus sedet cor vitæ spirandiq; principium. Id pulmoni quoq; attrahendi frigidi aeris cupiditatem inijcit. si quidem ipsum incendit; verum cor est, quod attrahit. In primis igitur si cor affectum est, nō diuturna est mortis dilatio. Si pulmo male habet, pusillam quidem ob causam difficulter spirat, male vitā agit, mors tardissime aduenit, si q̄s medelam adhi-

A R E T A E I

bet. Si vitium infigne fuerit, qualis est phlegmone, strangulatus sequitur, vocis spiritusq; sublatio: subitanea pñicies imminet. Hæc est ægritudo ea, quam Græci Peripneumoniam Latini Pulmoniam dicunt. vomica scilicet pulmonis. Eam febris acuta comitatur, doloris carentia, si solus pulmo inflammatur. Quippe qui naturaliter dolore immunis sit, ob corporis raritatem lanis assimilis: Asperę arterię in ipso insertę sunt, cartilaginosaę, & ipsaę dolorem non sentientes. Musculorum pulmo ex pers est: nervos habet exiguos, graciles, ad motum ciendũ opportunos. his de causis pulmo dolorem non pcipit. At si quæpiam ex membranis eũ ambientibus & ad pectus deligantibus inflāmatur: adest tunc & dolor. spiritus est deprauatus, calidus: sedere volunt laborātes. ad spiritum ducendum corpus rectum statuitur: ad id enim hic est situs aptissimus. rubescit facies, sed malę præcipua. oculorum album nitidissimum ac pingue est. summa nares sima sunt. venę tēporum, vel etiam colli elatę apparent. cibos auersantur. arteriarum pulsatus initio magnos habent, inanes, creberrimos perinde, ac si festinare coacti sint. calor in exterioribus membris modicus humectusq; est: in interioribus ingens aridus. Inde fit spiritus calidus, sitis, linguę ficcitas, frigidi aeris auuiditas. mentis ambiguitas supuenit. tussis adest plerunq; sicca. si aliquod sputum mouet, id vel spumans pituita est, aut aliquid exquisite biliosum, aut cruentum, floreo colore valde perfusum. id vero cruentum alijs pñiciosius est. Quod si mortifera magis ægritudo redditur, vigilię augescunt, somnus paucus, torpidus, haud absimilis sopori, qui à Græcis Coma nominatur. cogitationes vanę insurgunt. mens alienatur. nō admodũ ecstasi corripitũtur. præsentia mala ignorāt. nam eos si de morbo interrogas, nihil periculi instare respondent. eorum algēt extrema: liuescunt vngues * curuanturq; . motus arteriarũ parui, frequētissimiq; sunt, et deficientes: quando ipsis proxima mors est. nam septimo die plerunque moriuntur. Porro si nonnũquam morbus subsistit, & aliquantulum in melius vergit, vehemens de naribus sanguinis eruptio conspicitur: aut per aluum cum pturbatione multorum biliosorum & spumatiũ succorum deiectio. qui ex pulmone in sacrum ventrem depulsi fuisse videri possunt, si multi liq̃diores & facile deijciũtur. Nōnũquā vero & per vrinarias semitas euocantur: Cæterum quibuscunq; hæc simul eueniunt, hi q̃primum ægritudine subleuantur. Quidam vtique sunt, quibus magna vis puris in pulmone procreatur: aut ex pleuritide fit permutatio, si maius bonũ suboritur. Quod si ad intestina aut vesicam ex lateris morbo sanies deriuata sit: tunc quidem continue pulmonis vomica liberantur: sed diuturnum vlcus, quod demum sanescet, in latere patiuntur. Quibus vero in pulmonem pus irrumpit: nōnulli ob

*Ailas
vigilant,

subitaneam & copiosam effusionem, & reijciendi infirmitatem suffocantur. At quicumq; suffocationis periculum ex tumoris eruptione subterfugiunt: hi longo tempore pulmonis vlcere cruciantur, & in phthisim prolabuntur. Verum ex abscessu & phthisi pauci admodum senes liberantur; sicut neq; à pulmonia iuuenes & florentem ætatem agētes.

De Sanguinis exitu ab ore. Cap. II.

Sanguis ab ore duobus modis emittitur. primo ex ipso ore, capite & vasculis, quæ ibi sunt. via est palatum & fauces, vbi est gulæ & arteriæ principium. screantes vero & cum parua tussi, vel etiam citatiore in os sanguinem eructant. nam cum ab ore fertur, neq; screatu opus est, tum expuere dicimur. cum vero paucissimus & guttatim sanguis exit, aut etiam si copiosus de capite, vel ab ore eruperit: nōdum reiectio est appellanda; sed idem vel sputum, vel sanguinis eruptio, græce hæmorrhagia dicitur. si ab inferioribus ascendat à pectore visceribusq; ibi latentibus, pulmone, aspera arteria, locisq; spinæ finitimis: huiusmodi nō sputum, sed reiectio latinè, græcè anagoge vocitatur, ascensionis, ac viæ, per quam fertur, nomen habēs. Signa vero vtriusq; communia exigua & pauca sunt, quantum & locus permittit, in quem reiectio & sputum conueniunt. Singulorum autem propria, magna, & multa, & periculosa sunt. quibus vtranq; effusionis sanguinis speciem internosse leue est. Igitur si a capite sanguis decurrit, vbi multus est, plura maioraq; aderunt: pauca minoraq; vbi raro paucusque expuitur. caput graue est, dolet. sonant aures. facies rubet. venæ distentæ sunt. vertigo infestat. Et ante hæc causa euidens fuit, pcussus, frigora, calores ingentes, vinum largius epotum. Quippe id subito ac valde caput implet, repenteq; multum sanguinis effracta vena profundit. modica ebrietas rarefacta vena sanguineum sputum mouet. Interdum per nares sanguinis consuetum profluuium sistitur: ad palatum vero conuersum reiectionis imaginem præbet. Igitur si de capite profluit, titillatio in palato gignitur. creber screatus fit. post quem sputum erumpit. inde irascuntur, tussi que magnopere agitantur. Si ex palato in arteriam defluit, tum per tussim sanguinem extrudunt: idq; multos falsos habuit ex profundis visceribus reiectionem fieri suspicantes. Nonnunquam & ex capite decurrit in gulam, sicq; cum nausea euomitur. falsoq; multis ita persuasit, vt ex gula ferri sanguinem crederēt. Qui expuitur sanguis, haud ita crassus est, colore ater, levis, æquabilis, alienæ materiæ non permixtus. screantibus enim confestim in linguam cadit rotundus, auulsioniq; obediens. Tu vero si palatum etiam introspicias, id sordidum, vlcerosum, & sæpius cruentum videbis. Huic simplex curatio brevisq; suffecerit, adstringen-

tia videlicet medicamenta palato adhibira, & ea frigida. siquidem calefacientia, & quæ rara faciunt corpora, & quæ dilatant, fluxum maiorem citant. Ea quæ sit à capite cadentis sanguinis coniectura. At caput quoque vel per venæ sectionem, vel per nares, vel per aliam diffusionem euacuandum est. & hæc mature facienda sunt. nam si diutius sanguis feratur, quædam erit eius cursui exercitatio, eiusque loci membra suscipiendo sanguini assuescent. vlceratur autem & arteria: vnde tussis, non scretus exoritur: atque inde fit corruptionis initium. Si vero à pectore inferioribusque visceribus sanguis effluerit: reiectio latine, græce anagoge nuncupatur. Vtique valde mortifera est, si ab aliquo principe membro effracto sanguis manauerit, aut à concaua cordis vena sanguinem ab iecore illi suggerente, aut à magna arteria secundum dorsi spinam discurrente. nam erumpente sanguine, perinde ac si iuguletur homo ac stranguletur, mors instat celerrima. Quibus autem ex pulmone, aut costa, aut aspera arteria profunditur, non æque cito intereunt; verum tamen in supuratione pectoris, græce empyema dicitur, & in phthisim incidunt. Minus periculi ab aspera arteria porteditur. Si gula aut ventriculus sanguinem vomunt, non ita terribile est: et si valde copiosi sanguinis vomitus est. neque longa curatio est, neque varia. Si à iecore aut liene prodeat, non facile id fit, neque continenter. namque in ventriculum & intestina expeditius hæc viscera sanguinem propellunt. haud ita tamen, quin credendum sit, hæc eadem ad superiora, videlicet, pulmonem & arteriam posse retrudere. Siquidem in febribus à liene & iecinore per narem illam sanguis erumpit, quæ è regione patienti visceri opponitur. Locos, vnde fit exitus, iam recensuimus: eorumque periculi vel mortis discrimina. Effusionis autem sanguinis tres sunt modi, vel rupta vena aliqua, vel exesa, vel rarefacta. Rumpitur quidem repente vel ictu, vel ferendo onere, aut tollendo, vel ab edito loco defiliendo, vel clamore, vel magna ex candescencia, aliaue id genus causa: cum subito in arteriam copiosus sanguis effunditur. Si ab erosa parte, hominem interrogare opus est, num prius tussierit, difficulter spirauerit, nausea vomitusue antea infestauerit? in his enim diuturnis affectibus copiosa & acri fluctione pseuerante vascula exeduntur. Vbi igitur detrite & attenuata, ad extremum consumptæ fuerint ambiantes membranae, hac atque illac sanguine perfluunt. At rarefactio citra rupturam est proinde non subitanea, neque cum multo aut crassi sanguinis exitu. nam cum rarescunt venarum corpora, tenuis pars excernitur. Quod si multus in aliquo inani spatio sanguis collectus rursus emittitur, crassior seipso redditur: non tamen multo crassior, neque ater, quale concrementum, aut grummus est: sed copiosior. ut potè qui vnum in locum prius confluerit. Id genus autem repetini exi-

A tus plerunq; foeminis, quibus menstrua nō respōdēt, euenire solet: idq; singulis mēsis euenit. ijsdēq; mēstruē purgatiōis circuitibus apparet: necnō ijsdē statis cessatiōis diebus supprimitur. ac nisi mulieri laborātū succurratur, per multos circuitus sāguinis emissio reuertetur. Nempe quibusdā vasa rupta sunt, sed multitudine reiectio euariat. Et ab arteria, an à vena feratur, interest. Qm̄ ater est sāguis, crassus, & facile spissescēs, qui à vena mittitur: prēterea minus discriminis affert, celeriusq; cōpescitur. Ab arteria flauus tenuisq; plabitur, haud ita cogitur, citius hominē perimit, & maiori negotio supprimitur. nam arteriæ agitatio sanguinis fluorē mouet, vulnusq; frequenti concussione dehiscit. Ero-

B sionis autē curatio magnam diligentiam postulat, cū sit longa, difficilis, & periculosa. Etenim parte mēbri deficiente, ad solidationem vlcus non ducitur. vlcus enim, non vulnus efficitur. Rupturæ verò facili-
 or solidatio, quia vulneris oræ se contingunt. & hæc secundo periculi ordine cōsistit. Minimus in rarefactione metus subest. spōte enim sanguis conquiescit, & adstrictio refrigeratioq; in medēdo satis est. Cæterum & sedes, vnde sanguis pficiscitur, obseruādæ sunt. Siquidem multa sunt communia indicia, & erroris occasio in promptu est, curatioq; diuersa. A' gula igitur haud ita sepe per rarefactionem solet sanguis effluere: cū ob cibos potionesq; refrigeratiō & adstrictio eius ptes cō-

C denset. Quinetiam rosiones haud frequenter fiunt, ac minùs, quàm rarefactio, gulam infestant. quippe fluctiones erodētes nō multum temporis in ea subsistūt: sed aut expuuntur, aut ad inferiora pelluntur. Frequentiùs gulæ incidit ruptio. itaque si interdum rupta est, nō tam magnæ, sicuti à pectore, sanguinis pfusiones fiunt. in causa est venularū, quę ibi sunt, arteriarumq; tenuitas. sanguis verò exiens nō magnoperè nigricat, subflauus est, non exactè, læuorem habet, aut saluæ pmixtus est. cum nausea et vomitu reijcitur. leuis tussicula citatur, modò humidum quippiam mouens, modò arida. id euenit, quoniā gulæ affectum arteria quoq; participat, secūdum illam extenta & adhærescens. mor-

D sus vel adstrictio vlceris inter deuorandum percipitur: idq; præsertim, si benè frigida, aut calida, aut acerba sint, quę deglutias. nonnullos autem & gulæ ipsius dolor inuadit ad interscapulum vsq; interdū pertinens. vomunt pituitosa. nōnunquam, si morbus producit & inuale-
 scit, cibum reijciunt, cibos summoperè fastidiunt. febres haud ita multum continuæ, sed erraticæ sunt. E' vētriculo niger cōcretusq; sanguis euomitur, etiam si ab arteria fluxerit. Si à vena, multò nigrior, compa-
 ctiorq; est. nausea multa adest: pituitosus, biliosusq; vomitus. si prius homo comedit, cum cibis mixtus sanguis eijcitur. in eodē enim loco cibus sanguisq; colligitur. ructus crebri fiunt, & virus olentes. quòd si

multa materia collecta est, angor animi vertigoq; sequitur. cum mate- E
 riam vomuerunt, subleuantur. resoluuntur tamen, penitus exæstuant,
 asidueq; dolet ventriculus. Ab aspera autem arteria paucus sanguis,
 vehemēter flauus, per tussimq; expellitur qui nisi expellitur, cōtinens
 tussis inhæret. sensus verò & dolor in gutture est, paulum suprà aut in-
 frà. vox rauca & obscura fit. Si à pulmone, repente vberiorque sanguis
 emanat: idq; magis, si erosio in causa sit, tussis permolesta est: sanguis
 verò exactè flauus, spumans, rotundus sic, vt pars eiecta à parte distin-
 cta sit. Cæterū & in communi vase corruptio eorum, quæ de pectore
 exeunt, alia est. comparatione autem permixta discernas: alioqui pecto- F
 ris partes specie carnosas pulmonis esse partes censueris. verū pecto-
 ris grauitas, indolētia, ruborq; in facie multò magis in pulmonis vitio
 reperitur. Si in pectore noxa sit, in parte priori, secundum os pecto-
 rale, quod vocant, dolor laceratam partem ostendit. ingens tussis ad-
 est, vix aliquid extrudens. sanguis non multum flauus est, modicè
 crassus, spuma carens. Quòd si & pulmone in trāsitu noxam impertiat,
 aliquid etiam spumæ consequitur. quandoquidem ex pectore in arte-
 riam per pulmonem iter datur. Si à membrana costas vestiēte, per tuf-
 fim quidem sanguis funditur: sed niger, leuis, tetri odoris virosiq;, qua-
 lis ex putridis rebus exhalat. dolor succingentis membranæ acutus ve-
 xat. multi ex his cum febre, vt pleuritici solent, intereunt. Tempus an- G
 ni humidum calidumq; sanguinis emissionem maximè procreat. tale
 est humidum & calidum. Verò secūdo loco Aestas, Autumnus minùs,
 Hyems minimè. Aestate maximè moriuntur ob sanguinis effluuium:
 quo tempore haud ita magnæ phlegmonæ oriuntur. Vere secundo
 phlegmonis & vrentibus febribus cōsumuntur. Autumno plurimum
 Tabes, quas Græci Phthoas dicunt, eueniunt. Vt semel autem dictum
 sit, omnem sanguinis reiectionem quantumuis modicam, quāuis iam
 rupta vasa coiuerint, comitatur mœror, diffidentia, vitæ desperatio.
 Quis enim est adeo firmo & cōstanti animo, qui se iugulationi simile
 quoddam passum esse conspiciens, non futuram mortem vereatur, & H
 perhorrescat? grandiora nanque animalia & robustiora, quales tauri
 sunt, sanguinis profusione celerrimè perduntur. Verū hoc haud ma-
 gnoperè mirandum est. Illud summa admiratione dignum, quòd in so-
 la ex pulmone reiectione, quæ omnium sauisima est, homines ani-
 mum non despondent, cum tamen in extremo discrimine versentur.
 Pulmonis indolētiam huiusce rei causam ego statuo. quilibet enim do-
 lor, quamuis exiguus, interitus metū inijcit, & plerūq; terribior est,
 quàm periculosior. contrà indolentia in plurimis vel magnis morbis à
 morte securitatem præstat: damnosiorque est, quàm terribior.

A De Syncopa. Cap. III.

R Ecce planè medicus & vulgus, recte, inquam, huic affectui nomen indiderūt. O Cyphon, cuius mali est nomen? Ecquid enim maius, ecquid celerius syncopæ facultate? ecquidnam aliud nomen ad hanc rem appellandam significantius? quid vero corde ad mortem vitæ potèntius? Neque syncopam cordis ægritudinem esse, aut vitalis in eo potestatis detrimentum, non credendum est. tanta est mortis celeritas, & talis morbi species. Quippe is affectus vinculorum potestatis vitam fouentis dissolutio est, hominis constitutioni aduersarius.

B hanc enim tenaciter corripit non dimittit, sed dissoluit ac dissipat. Neque id magnum est miraculum. Nā & alij affectus quorundam membrorum, quibus inhærescunt, indeq; accenduntur, proprij sunt & periculosi. Inguinum quidem tumores pestiferi & permaligni (Bubonas Græci nuncupant,) iecoris soboles sunt, nullaq; alia ex parte prodeūt. Tetanus autem neruorum labes est: Comitialis morbus caput obsidet. Pari igitur ratione & syncopa cordis & vitæ ægritudo est. Quicunque vero stomachi affectum syncopam esse opinantur; quoniam cibus vinoq; in nonnullis & frigida vires refectæ sunt, & ægritudo sublata: ijdem mihi videntur capillorum capitis, & cutis affectum esse phrenitici suspicari; quoniam capillorum detonsione, & cutis irrigatione phrenitici releuātur. Verum cordi stomachus vicinus perniciosus est: vnde in cor tam noxia, quàm vtilia deriuantur. Etenim per pulmonem etiam, vt spiret, aerem cor accersit: verum tamen pulmo haud ex æquo spirandi facultatis particeps est. cum facultates non in instrumētis, sed vbi est vitæ fons atque roboris, statuātur. At stomachus vitæ neq; principium, neq; sedes est: aliquis tamen ab eius imbecillitate lædi potest. Nam & cibi cordi nocentes non stomacho officiunt, sed cordi per eum noxam infligunt. Si quidem & ab illis moriētes cordis affecti notas representant, arteriarum motus paruos debilesque, cordis concussionem cum vehementi palpitatione, vertiginem, animi deliquium, torporem membrorum, resolutionemq; copiosum sudorem, qui supprimi nequeat, refrigerationem in toto corpore, sensus vocisq; priuationem. dicendum ne est hæc stomachum perpeti? Sed quæ nam ei propria? Nausea, vomitus, cibi fastidium, singultus, eructatio simplex, vel acida. Illi præterea, quibus cor laborat, sensus aciem exquisitiorem habent; vt videant, vt exaudiant plus, quàm antea. mente etiam sunt firmiore, & animo puriore. proinde non tantum præsentia declarant, verum etiam futura verissima diuinatione prædicunt. Num ne igitur & hæ stomachi potestates sunt? hercule minime, sed cordis, vbi & anima & eius natura inhabi-

tat, ad quod & virtutū ibi sitarum calamitas pertinet. Huius vero mor- **E**
bi est tenoris naturæ destructio autore frigido humidoq; quippe hoc
oppressi intus & in cute refrigescunt; non sitiunt: frigidum spirant; quā
uis magnis ac perurentibus febribus, vnde ipsa syncopa dependet, affli-
gantur. Natura enim robusta & probe temperata omnia superat, om-
nibus dominatur, ac per humorem & spiritum & solida, horumq; om-
nium conuenientem ordinem & modum hominis vitam administrat.
Quod si naturæ nexus, id est, Tenor dissolutus sit: tunc affectus oritur;
cuius prægrediens causa est comburens febris, quæ græce Causus dici-
tur. ea vero huiusmodi est.

De Causo, id est febre uistoria. Cap. IIII. **F**

* Alias
mobilis

Ignis passim & acer et tenuis est: sed intus maxime. Spiritus tāquam
ab igne, calidus. Aeris vehemēs attractio. Frigidi cupiditas. Lingua
arida. In labijs & cute squallor. Algent extrema. Lotium quāmbiliosif-
simum. Insomnietas. Arteriarum motus crebri, parui, imbecilli. Oculi
puri, * lucentes, subrubri. Facies bene colorata. Si morbus vltius cre-
scit, omnia maiora & sæuiora fiunt. Arteriæ minimis motibus et crebet-
rimis agitantur. Ignis aridissimus & acerrimus. Mens delirat; omnia
ignorat. Siticulosi fiūt. Omnia frigida attrectare cupiunt, parietem, ve-
stem, pauimentum, humorem. Manus frigent, sed palmæ perquā ca- **G**
lidæ. Ungues liuent. Spiratio crebra est. Roscidus humor circa frontem
& iugula. Cū ad summam ariditatem caloremq; corporis natura p-
uenerit, tum calidum in frigidum, squallor in imbrem conuertitur. Re-
rum nanque ad maximam molem incrementa in contrarium statum
prolabūtur. Vbi ergo naturæ nexus soluti fuerint, ea syncopa est. Tunc
sudor ingens toto corpore funditur, & nullo pacto compescitur. Spira-
tio frigida est. Vapor ē naribus multus exhalat. Siti non vexantur. cæte-
ra enim exaruerunt. quinetiam alia instrumenta sitiunt os & gula. Uri-
na tenuis & aquea redditur. Alius plurimum adstricta est: nonnun-
quam tamen pauca quædam biliosa descēdunt. Copiosa & aliena hu- **H**
miditas redūdat. Ossa quoq; tabescentia diffluunt: & vndique, vt in flu-
mine, ad exteriora omnia dilabuntur. Animus stabilis & constans est:
sensus omnis purus & integer: subtile ingenium. Mens vaticinādo ido-
nea. Primum quidem seiplos de vita migraturos præsentiant, deinde
præsentibus futura denunciant. Nonnulli vero interdum eorum dictis
fidem non habendam putāt, sed dictorum euentus homines in eorum
admirationem concitat. Aliqui præterea ex his cum quibusdam vita
defunctis sermonem habent: fortasse quidem ipsi soli præ sensus acu-
mine & puritate eos adesse cernentes: aut forte ipsorum animo viros,

A cum quibus versaturi sunt, prænoscere, atque enarrante. Quippe antea in lutulentis humoribus & caligine demersus erat: quos ubi morbus exhaustit, & ab oculis tenebras deterfit, quæ in aere fiunt, prædicant, exutoque sordibus animo veracissimi vates efficiuntur. Sed quorum succi & ingenium adeo extenuati sunt, hi non diu admodum solent esse superstites; cum eorum vitalis potentia iam in aerem cesserit, atque abierit.

De Cholera,

Cap. V.

B Cholera est materiæ à toto corpore in gulam, ventriculum & intestina retro fluens motio, vitium acutissimum. Supra enim per vomitum erumpunt, quæ in ore ventriculi & gula congesta fuerant. Infra deijciuntur humores in ventriculo intestinisque natantes. In primis quæ euomuntur, aquæ similia sunt: quæ anus effundit, stercorea, liquida, tetriq; odoris sentiuntur. Siquidem longa cruditas id malum excitauit. quod si per clysterem eluantur, primo pituitosa, mox biliosa feruntur. Initio quidem facilis morbus est, dolore vacans: postea vero tentiones in ore ventriculi & gula: tormina in ventre nascuntur. Si magis sæuiat morbus, & tormina augeſcunt, anima deficit, membra resoluuntur, cibos exhorrent, animus consternatur. Si quid acceperint, cum magno tumultu nausea & vomitus inuadit, tum sincere flaua bilis expellitur: deiectiones quoq; similes sunt; Nervi tenduntur, tibiæ brachiorumq; muscoli conuelluntur, digiti incuruantur. vertigo oboritur. singultiunt. ungues liuent. algent extrema. totum corpus rigore concutitur. Si malum ad vltimum venit, tunc vero egrotus sudore perfunditur. bilis atra supra infraq; prorumpit. conuulsione impedita vesica lotium cohibetur; quod tamen, cum in intestina humores deriuentur, abundare non potest. voce priuantur. arteriarum pulsatus minimi sunt ac frequentissimi: cuiusmodi in Syncopa proposuimus. conatus ad vomendum perpetui ac inanes fiunt. inclinatio ad deijciendum prompta, quam Tinesmon Græci vocant: sicca tamen, nihilque succi egerens. mors demum sequitur doloribus plena & miseranda, per conuulsionem, strangulatum, & inanem vomitum. Id genus maxime æstate grassari consuevit, secundo per autumnum, minus vere, hyberno tempore minime. Inter ætates autem iuuenta, & ea, quæ robustior est,

hoc ferè corripuntur: senectæ rarissime: pueri
magis, quàm senes, sed non
mortifere.

De Ilco græce vocato, latine Voluulo. Cap. VI. E

Phlegmone in intestinis gignitur perniciosum dolorem mouens: quippe innumeri torminibus acerbissimis necantur. In hisce & frigidus flatus & lentus colligitur; nec infra, nec supra facile penetrans. Commoratur autem diu, perq; superiorum intestinorum angustos anfractus reuoluitur. vnde & affectus llei græce, latine Voluuli nomen accepit. Quod si ad tormina compressio & remollitio intestinorum accesserit, id verò iam Chordapsus est. quod nomen vltima parte elixationem, remollitionem ue significat. Chorde autem intestinorum vocabulum est. Lactes enim Epicordida Græci veteres nominarunt nervos scilicet interiacentes, & vascula, & membranas: quæ intestinorum stabilimenta & fulcimina sunt. Voluuli causa est perpetua ciborum multorum, diuersorum, inusitatorumq; corruptio: & alia super aliam cruditas. præcipue ab esu ciborum, qui Voluulum excitare consueuerunt: quale est Sepiæ atramentum in ferculis sumptum. idem existimādum de plaga est, de frigore, de frigida potione: si, dum quis sudat, eam large abundeq; ingurgitauerit. Ad hæc his Voluulus accidit, quibus intestinum cum stercore in scrotum procidit; neq; in ventrem repulsum, sed per vim retentum fuit, his inferiora intestina, phlegmone vexari solita sunt. Pueros hic affectus crebro male habet: vtpotè quos sæpe cruditas infestat. hi tamen sæpius etiam sanescunt, cum ob consuetudinem, tum ob humiditatem intestinorum; lubrica enim sunt. Senes raro afficiuntur, sed multo perniciosius. Aestas magis, quàm Ver huius mali referta est: Autumnus, quàm Hyems: Aestas vtrunq; superat. Multi quidem vi torminum repente intereunt: alijs intestinum suppurat, deinde nigricans tunc, & putrefactum excidit; atq; ita deficiunt. Mediocrem Voluulum hæc symptomata comitantur, dolor oberrans in stomacho, humiditas superans, exolutio, mollitia, ructus inanes, nihil proficientes. alius flatibus perstrepens, qui ad podicem vsque properant, sed ibi exitus intercluditur. Sin autè ex toto Voluulus occupet: omnia sursum Hæpetunt flatus, pituita, bilis: hæc q; vomitu prodeunt. fiunt perpallidi: frigent toto corpore: acerbo dolore cruciantur: male spirant: sitiunt. Quibus vero iam iam mors instat, gelidus sudor emanat: vrina difficulter exit: anus tam arcte clausus est, vt neq; vel tenuem acum possis adigere: stercus per os redditur: vox aboletur. arteriæ raro inter initia & parum micant: instante morte minime, creberrime; tandem micare desinunt. Hæc sunt, quæ tenuibus intestinis affectis incidunt. Verum & in pleniore intestino, quod Græci Colon vocant, eidem affectus oriuntur, eademq; symptomata eandem formam retinentia. Sed nonnulli, quibus

Abus colon suppurat, huiusce morbi discrimen effugiunt. causa est huiusmodi affectus carnosae intestini crassitudo. Dolor autem in gracilibus quidem intestinis tenuis est et acutus: in pleniore vero intestino est redundans humiditas, & incumbens grauitas. dolorq; modo ad costas vsq; superiores ascendit, quando & speciem lateralis morbi præ se fert; siquidem & isti febricitant: modo sub spurias costas in dextram aut in leuam partem descendit sic, vt iecur aut lienis dolere videantur; item & ilia nonnunquam dolore torquentur. Colon nanq; prægrande est, & quoquo versum se circûuoluens. Quidam sunt etiam, quibus et in sacro osse dolor inhærescit, & in femoribus, & illis in locis, quibus testes appenduntur, Græci Cremasteras appellant. Qui hoc genere tentantur, vomitione plerunque inani laborant. quod si quid reiecerint, id est subtile, biliosum, olei simile. In hoc malo periculum tanto leuius est, quanto laxum intestinum tenuibus corpulentius, pinguius, & noxæ tolerantius est.

De acutis Iecoris affectibus. Cap. VII.

Quibus iecur male habet, hi non celerius, quàm qui corde egrotant, sed maiore cruciatu perimuntur. maxima enim iecoris pars sanguinis concrementum est. Si in huius autem visceris portis aliqua incidat causa mortifera; æque, ac si ex corde laborarent, celeriter consumuntur. Ratio in promptu est, quia videlicet hæ partes membranis, tonis gracilibus & magni ad vitam momenti, grandioribusq; venis contextuntur. præterea, vt sapientum quidam prodiderunt, hoc loco appetitricis animæ domicilium est. Sanguinis vtique profluvia è iecore omnium maxima fiunt: neque ab re; venarum enim radicatio iecur est. Itaq; in ipso magna vomica haud ita frequenter, neque in particulis magis præcipuis oritur. homo enim vita excedens præuenit. At exiguæ frequentius eueniunt. inde fit, vt mortem quidem euadant, sed longinquo morbo impliciti crucientur. Ipsius enim functionis, qua sanguinem condit, cessatio non conceditur, neq; dilatio: atque hinc ad cor & ad viscera infra septum sanguis diffunditur. At si qua magna iniuria, vt puta verberare, longa ciborum multorum vitiosorumque corruptione, ebrietate, vehementi refrigeratione phlegmone in portis iecoris excitatur, tunc egrotus celerrime iugulatur. Ignis enim in profundo corpore depascitur, obscurus, acer. Venarum motus torpēt. Doloris species variæ & diuersæ sunt. Nonnunquam enim dextra in parte defigitur adeo, vt acutum telum adaectum esse videatur. interdum torminibus similis est. rursum vero interdum dolor cum summa grauitate coniungitur: atq; inter dolendum virium debilitas vocisq; casus.

incidit: Transuersum septum, & interna costarum tunica inferius de **E**
trahuntur. quoniā inde iecur suspensum onere suo degrauat. Proinde ad
iugulū è regione oppositum vehemēs dolor peruenit. Tussicula quæ-
dam imperfecta, seu potius tantum ad tussim inclinatio est. si quando
vero tussiunt, nihil reddunt. vitiose spirant: neq; enim pulmoni trans-
uersum septum opitulatur, ei ad constringendum ac dilatandum mo-
rem gerens. paulum aeris adducunt, plus expirant. colore ex atro viri-
diq; permixto infecti sunt, plūbea scilicet specie. cibos oderūt. q; si quid
sumpserint, eis inflantur præcordia. ructus biliosi, acidi, graue olentes
exeunt, nauseant, vomere frustra conātur. venter solutus multa biliosa
excernit, viscida pauca: sed perpetuo augescūt mala. mens haud ita mul- **F**
tum delirat: torpida, suspensa, & attonita est. magna est in corpore se-
gnities. extrema frigent. tremor adest, horrores, singultus: inanis, con-
uulsioni similis, morbus regius: pura bilis. totumq; corpus bilioso colo-
re suffunditur. Quin morbus regius ante septimū diem si apparuerit,
plurimos sustulit. Quibus autem vel sanguinis profusio, vel per aluum
multorum biliosorum exturbatio, vel vrina syncera plurima effluens
mortem depulit: post tres septimanas iecur his suppurat. Quod si mul-
tum temporis circa abscessum prætereat, in hydropem, ineuitabilem
terminatur. hi siticulosi sunt, parum tamen bibūt. eorum corpus squal-
let, pinguedine carens. appetūt acida, sed gustatus sapores non percipit. **G**
Autumnus hoc malum fert, multorum variorumq; fructuum esum se-
quente cruditate. Inter ætates florens ei magis obnoxia est.

De Venæ Concauæ acuto morbo, Cap, VIII.

AB Iecoris portis inter eius extrema magna vena ingreditur: quæ
semper in tenues pluresq; dum scinditur, deniq; in tenuissimas
visumq; latentes toto iecore dispergitur. Istarum summis osculis aliæ
venarum extremitates committuntur: quæ ex gracilibus & pluribus ma-
iores amplitudine, sed numero pauciores constituuntur. Demum in me-
dio iecore in venam vnicam grandem coalescunt. Inde hæc in duas par- **H**
titur, quæ Iecoris extrema petunt. Harum altera superius primam fi-
bram penetrans, in eius conuexa egreditur: mox transuersum septum
perforans, in cor inferitur. Hæc vena Concaua nominatur. Altera vero
quintam fibram, quæ inferius iacet, traiciēs vsque in iecoris gibba * ad
spinam peruenit: & eo loco ad coxendices vsq; porrigitur. Ea quoque
eodem nomine Concaua nuncupatur: quoniam vna & eadem vena est
ab initio de iecore exoriens. Si quis enim aliquid de superiore vena Ca-
ua cordi infixam in eam, quæ iuxta spinam protenditur, aut à spina per ie-
cur ad cor velit impellere, eundem descensum ascensumq; inueniet.

* Alias
cōcaua.

A Hæc igitur vena, (vt arbitror,) vniuersa ægritudines & acutas & validas patitur. nam tota vna est atque continua. a nonnullis autem medicis ea pars duntaxat, quæ secundum dorsum discurrit, egrotare creditur. quoniam eius, quæ cor intrat, notæ obscuræ sunt. intra pectus enim rei nulli adherens, sed in pectore subleuata protenditur, donec transuersum septum egressa cordi inseritur. Igitur si quod ingens malum hanc venam corripit, pectore ambiente delitescit. In hac itaque vena Cedmata oriuntur, (Sunt autem Cedmata diuturni affectus ex defluxu materiæ prouenientes,) quando sanguis copiosius erumpens citissime vitam delet: Per superiora quidem per pulmones & arteriam effluens, si in pectore fiet effractio: Si iuxta principiū, in imum ventrem descendens in intestinis continetur, atq; adeo intestina replentur. cum prius, quàm deiectus sanguis in conspectum detur, homines intereunt; & ventriculus sanguine redundat. Nascitur & circa venam phlegmone, quæ & ipsa si magna sit, celeriter hominem tollit. ignis enim acer mordaxque in ambabus cavitatibus inclusus accenditur, paucusque duntaxat foris apparet, vt tangenti flamma tenuis esse videatur: æger vero sese comburi existimat. pulsatus arteriarum exigui sunt, creberrimi, ac veluti oppressi atque repulsi. frigus adest extremorum, sitis aspera, oris siccitas: facies decolor rubet: omne corpus subrubidum

C est: præcordia dura sunt atque reuulsa. dolor in dextra parte maior, & cum eo palpitatio in longitudinem ad ilia vsque perueniens. quibusdam & arteria secundum dorsum inflammatur: quod pulsatio in alteris præcordijs mani festat. nam & ipsa venæ caue morborum particeps efficitur iuxta illam in sinistro latere posita, vtpotè ea, quæ in omne corpus diducitur, nihil leuaminis afferente, neque cutim emolliente. cutis autem sic affectorum squallida, rugosa, atque aspera est: sed in partibus prominentibus atque osseis, vt in cubitis, genibus, digitorumque articulis magis talis conspicitur. somni tumultuosi fiunt. al-

D uos quibusdam nihil reddit, quibusdam exiguum, acre, biliosum. lotium * acre mordaxque est. mens vtique his constat, sed quadam segnitie torpet, & corpus tabe consumitur. tum quotquot hunc habitum viderunt, eum Causi, idest, ardoris speciem appellarunt. quando quidem quæ adsunt, sub ardoris genere collocantur. Per Autumnum hæc labes exoritur, cum ferum quiddam & immane sapit. Viros ac iuuenes occupat, quibus mala viuendi ratio, laboresque tenuem corporis habitum compararunt. Decimoquarto die hi plerunque moriuntur. quibus morbus diutius trahitur, duplo longiori tempore pereunt. Quotcunque autem aut ab initio pusillam phlegmonem habent, aut magnam paulatim remittentem; mortem quidem euadunt, sed non-

* Alias
flauum.

dum morbo liberantur. Hi longo sanè tempore causo laborāt, verum **E** omnia periculosa iam desinunt, dolores, præcordiorum distentiones, & pulsuum malitia, & mentis ignauia. adhuc tamen fastidiosi sunt, languentes, consilij inopes; simulque & ardor, & sitis, & linguæ orisq; siccitas egrum discruciant. multum diuq; trahentes spirant. & subito totum aerem vna spiratione refrigerandi causa adducunt. Verum si frigidam quamplurimam assatim bibunt, breui interuallo molestia leuantur. postmodum ipsis sitis accenditur: rursusq; vberime aquam ingurgitant. & hæc est mali successio & reciprocatio. At egregius medicus, frigidam liberaliter citra noxam propinare potest: vt in alijs ardoribus assolet. sed longe tutius ardore a vena caua oriente **F** laborantibus eam concesserit. Quod si ventriculus aut vesica potam aquam expellant, neque vomitione opus est: sin id facere nequeant, à multa frigida epota multum vomendum est. homo enim disrumperetur, si tanto bibito humore nihil aut per sudores, aut per vrinam, aut per ventrem effunderet.

De Renum acutis affectibus. Cap. IX.

Renes quantum ad corporis speciem attinet, haud ita multum periculis patent; tametsi in aliquod acutum vitium incidant: glandulosa enim ipsorum natura est. ad mortem vero inferendam bene habiles sunt: ipsorum enim actio peropportuna est, vrinæ videlicet à sanguine secretio, eiusdemq; expulsio. sed eam cohibet aut calculus, aut ingenita phlegmone, aut sanguineum concrementum, aut id genus. quando quidem ex consensu affectionis ob formam corporis prouenientis nulla creatur offensio. Vrinæ autem interclusio omnia sæua & acerba facit, ignem acrem & fastidium inferentem, dolorem grauem secundum lumbos in dorso, partium distentionem, sed magis circa præcordia. Suppressio autem lotij non ex toto fit, sed stillatim quidem meiunt, multum vero effundere cupiunt. redundantiam enim sentiunt. Quod si & acre mordaxq; lotium inest, frigent, **H** tremunt, conuelluntur, distenduntur præcordia & replentur. Hæc morbi forma perceptioq; doloris alui inflationi à ciborum multitudine corruptioneque prouenienti similis est. Pulsus initio rari sunt ac segnes: si malum plus vrgeat, parui fiunt, crebri, turbulenti, inordinati. somni tenues dolore vexati, non continui: sed repente à somno perinde ac si quis pupugerit, profiliunt: postea in soporem tanquā lassitudine oppressi delabuntur. mentis alienatio haud ita magna est: nugantur, facies liuet. At si quando rursus meiendi auiditas redeat, cum distentionibus magnisq; doloribus modicum quiddam, idq; stillatim

A latim eijciunt. tum paulum cruciatibus leuantur, postmodum in eadem relabuntur. Inter hos illi celerrime pereunt, qui nihil prorsus emittunt. Quicumque vero non moriuntur, (plures enim liberantur) hi aut calculo in vesicam per vrinae semitas delapso, aut phlegmone suppurante, paulatimue per difflationem exhalante discrimen euadunt. quam enim paulatim & auare effundatur vrina, mortem tamen facile effugiunt: at longo temporis curriculo eorum habitus contabescit, atque iure ista ægrotantes patiuntur, in peiusque labentes ad colliquationem deuoluuntur. Anni vero tempora, loca, ætates hunc morbum ferunt, quæ & in vena caua laborante ferebant. Nonnunquam è renibus sanguis multus subitaneus erupit, multisque diebus continentur effluxit: verum nemo ex huiusmodi profluuio moritur: sed phlegmones ratione, quæ simul cum profluuio nascitur, & sanguinem coercet. plerunque autem ex retentione, quam ingens phlegmone facit, moriuntur.

De Acutis in Vesica ægritudinibus. Cap. X.

Vesica difficiles in acutis morbis dolores patitur, & si ab alijs vitium participet: difficiliore, magisque mortiferos, si per se laborare inceperit. quandoquidem omni corpori & nervis & mentilabem communicare valentissime potest. Quippe vesica nervus frigidus calbusque est, & ab innato calido quamlongissime, quamproxime vero externo frigori posita. Nam in imo sacro ventre ad aures thoracis sita est. nobili quoque munere fungitur, vrinae videlicet emissionem. Hæc porro si tantum calculis, aut sanguinis grummi, aut qua alia propria, peregrinaue calamitate interclusa fuerit, perniciosum est. In mulieribus enim ipsis & vteri phlegmonas comprimit, in viris autem extremum rectum prelongumque intestinum. In plerisque vero ob inuoluntariam præ verecundia retentionem in coetibus hominum, aut in conuiujs repleta distenditur, constringereque non valens nihil amplius excernit. Igitur vbi vrina supprimitur, superiores quoque partes, renes videlicet, replentur: vrinae ductus, (græci Vreteras appellant,) distenduntur: ilia dolor ponderosus infestat: nerui conuelluntur: tremunt: horrent: desipiunt. Verum si ad hæc & vlceris accedat, & inflammatio, multa sanè damna eueniunt: Sed mors vlceribus sanè quamcelerius inuadit. Cæterum de ulceribus, abscessu, suppuratione, & id genus alijs, quæcunque non acutissima sunt, in libro de longinquis morbis tractabitur. Quæcunque vero peracuta sunt, & intra quatuordecim dies, aut paulo citius seriusve hominem perimunt, qualis phlegmone est, aut grummi sanguinei, aut calculus in ceruicem delapsus; de istis in præsentia sermonem faciam. Quapropter si quid horum inci-

derit, vrina retinetur: abdomen intumescit: dolor acutus totum ven- **E**
 trem occupat. vesica turget: decimo die luteus sudor exit: pituita vo-
 mitur primo, deinde bilis: vniuersum corpus friget, sed pedes vehe-
 mentius. Si malum vires maiores acquirat, tum febres cum singultu ho-
 minem corripunt: micant arteriæ inordinatis, frequentibus, ac pusil-
 lis motibus: rubida facies est: sitiunt: animo ancipites sunt: mens non
 constat: nerui contrahuntur. Medicamentis præterea venenosus, & can-
 tharidibus, aut bupreste & pneumatibus vesica deurit: & tota alius
 maiorem vim patitur: ac prorsus in peiorem statum delabatur: neq;
 longa mortis mora interponitur. Nonnunquam & sanguinem vesi- **F**
 ca effundit. flauus autem ac tenuis vesicæ sanguis est. Sed perraro hac
 de causa homines pereunt, quamuis haud facile sanguis supprimitur.
 Grūmi vero & phlegmonē minantur interitum. refrigeratio enim et
 extinctio caloris ingenti sequitur, quæ Necrosis græce dicitur, & gā-
 græna, & quæ eam comitantur mala. Id genus facile hominem tollit.
 Hæc vitia hyeme & Autumno grassantur. In ætate virili, magis etiā
 in senectā vigent. Reliqua anni tempora & ætates neque assidue hos
 morbos ferunt, minimeque mortiferi sunt. Pueri omnium maxime
 his calamitatibus vacant.

De Vuluæ strangulatu. Cap. XI.

IN medijs ilibus mulierum Vulua posita est, muliebre viscus, ani- **G**
 malis fermè naturam adeptum. Siquidem per se huc atque illuc ver-
 sus ilia mouetur: quin etiam ad superiora è regione pectoris cartilagi-
 nem subit: in latera quoque in dextram videlicet, aut leuam partem,
 aut ad iecur, aliavè intestina mouetur: & ad inferiora natura procliui-
 or est. vtque paucis absoluam, penitus errabunda est, & iucundis odo-
 ribus delectatur, ad ipsosque se recipit: contra foede olentibus contri-
 statur, & ab ipsis longius se proripit. ac prorsus est in homine vulua per
 inde, atq; in animali quoddam animal. Hæc itaque si repente superio-
 ra petierit, ac diutius ibi commoretur, visceribusque violenter incum- **H**
 bat; interdum homo veluti comitiali morbo correpta citra neruorum
 distentiones strangulatur. angustijs nanque iecur, transuersum septū,
 pulmones, cor celeriter opprimuntur. Qua de causa spiritus priuatio,
 imbecilitasque adesse videntur. Præterea & venæ somniferæ, (Caroti-
 das græci vocant,) cordis vitium participantes, affliguntur. vnde capi-
 tis grauitates & sensuum abolitio cum nouo quodam sopore adue-
 niunt. Incidit etiam ipsis aliud vitium proxime dicto non absimile: in
 quo spiritus & vox auferuntur: sed à vulua non prouenit. quippe & vi-
 ros infestat iustar morbi, quem Catochon nominant. At mulieribus

- A** à vulua malè habentibus tetra odora menta naribus subiecta, iucunda verò naturalibus apposita opitulantur. altero autè affectu laborantibus hæc frustra adhibentur: nihilq; opis afferunt. Præterea membra in vulua morbo agitantur, in altero affectu quiescunt. Amplius tremores spontini, & non spontini, sed ex ambrôthriæ subiectione excitantur. vuluæ refrigerationes vehementes, copiosæ sanguinis profusionis retentio, & id genus alia in causa sunt. Itaq; si in superiora subeunte vulua vexari mulier inceperit, ad obeunda negotia pigrior redditur: exoluitur: infirmatur: genua labant: vertigo infestat: extrema debilitantur: caput dolet, grauescitq; in venis ab utroq; nasi latere iacentibus dolorem mulier percipit: quòd si ceciderit, stomacho mordetur. iuxta præcordia ilia, vbi vuluæ domicilium est, inania sunt. motus arteriarum intermittunt, ordine carent, deficiunt. spiritus magnoperè angitur. vox intercipitur. sentiendi facultas impeditur. spiratio ignota obscuraque est. celerissima nec opinatò mors aduenit. nihil enim adest, quod mortem instare significet. color namq; viuidus est, ac multo post mortem tempore magis rubent. oculi parùm admodùm extantes fulgent, haud ita multum intenti, neq; tamen valde remissi & cõiuentes. Ceterùm si prius, quàm malum ad extremum venerit, aliquando vulua in sedem propriam migret; à strangulatione liberantur. quando alius submurmurat: humiditas adest locorum muliebrium: spiritus asperior manifestiorque redditur. nequaquam tamen ab affectu excitantur, aut subleuantur. imò quã celerrimè interitus aduenit. nam facilè superiora vulua petit: facilè quoque inde recedit. Quippe vulua suapte natura superfluitat: membranæ verò eam sustinentes humidæ sunt: humidus est & locus, vbi reconditur. Amplius fuga & apparentia tristium iucundorumque mouetur. quo circà labascit facilè, ac veluti arboris ramus huc & illuc, susque deque impellitur. Propterea & iuuenes foeminae id vitij patiuntur, seniores immunes sunt. Quibus enim ætas, & vita, & mens vaga magis & erratica est; his vulua quoque errabunda instabilisque sit necesse est: Quibus verò firma ac stabilis ætas, & vita, & mens fuerit; his & vulua similiter afficitur. Hæc vtique à vulua proueniens ægritudo (strangulatus videlicet) mulieribus duntaxat infesta esse potest. Verùm tamen cõmunes quoq; viris ægritudines in vulua oriri cõsueuerunt, phlegmone videlicet, & sanguinis profusio. communes etiam sunt, quæ comitantur, notæ. vtpotè febres, pulsus abolitio, refrigeratio, vocis amissio. In sanguinis autem profusione & maturius mors ingruit, quemadmodum cum quis animal iugulat.

De Satyriasi. Cap. XII.

Satyri Dionysio sacri, qui pictura, quiq; stâtuis exprimuntur, arre-
cto pene figurantur. quod diuinę rei signum est. Est verò & affe-
ctus species, qui laborantis penē excitat erigitq; atq; ob Dei figurę simi-
litudinem Satyriasis nūcupatur. Est autem inexplibilis coeundi appe-
titus. Verū neq; si ad veneris opus accedant, quicquā iuuantur: neque
multo assiduoq; cōcubitu sedatur arrectio. Conuulsiones autem om-
niū neruorū fiunt, & tendonū distētio, & inguinū, partisq; eius, q̄ inter
inguina & femora est, Plechada gręci nomināt, genitaliū p̄terea inflā-
matio & dolor. in facie rubor inest, & vapor quidā roscidę humiditati
similis. porrò ipsi egri sese incuruāt & cōprimunt: quiescunt tristes, de-
missi, vtpotē calamitatē suā grauatim ferētes. Quod si hoīs verecūdiā
id malū superet, turpiter admodū lingua intēperantes efficiūtur: Intē-
perantes quoq; in aluo exonerāda, in venerē lasciuientes, mēteq; inde-
center titubātes. nā se cōtinere nequeūt. siti laborāt. pituitā largiūs euo-
munt: qm̄ labris spuma, quēadmodū hircis in libidinē ruētibus, isidet.
q̄netiā haud absimilis odor est. lotiū post longā retentionē effunditur
album, crassum, geniturę simile. aluus resoluitur, costę & axillę spōte
pruriūt ac titillātur. cōuellūtur: à cibis abhorrēt: sed cū eos assumūt, ra-
paciter assumūt. cōturbātur. Sin ad interitū ægritudo spectat, inflātur,
venterq; in tumorē effertur. tendones & lacerti oēs cōtenduntur. ægrē
admodū corpus mouetur. membra cōtrahuntur. arteriæ paruo motu,
debili, inordinatoq; agitātur. Hęc omnia quādoq; discutiūtur, si aluus
perturbata multas pituitosas biliosasque humiditates eiecerit: easdem
quoq; vomitus nō absq; discrimine effuderit. Nempe medela nō vacat
discrimine, ea per somnū profundū longissimumq; pręstatur. Si quidē
refrigeratio & resolutio stuporq; neruorum multus somnus est: stupor
verò ac refrigeratio satyriasm medicatur. Id morbi genus vere potis-
simū atq; æstate fauere cōsuevit. Inter ætates autē adulescentia iuuen-
tusq; ei maximē patet: p̄cipueq; illi omnes, quorum natura in venerem
propensior est. Acutissimū id malū, triste fœdumq; est. nam plerūq; in
septima die hominē cōsumit. Memoriae proditum est mulieres etiā in
hanc labem incidere, & eundē in libidinē impetum, ac cætera oīa simi-
lia perpeti. Verū ego impudicū quendā libidinis ardorē mulieres inua-
dere mihi persuadeo, mulieres inquā humiditate affluētes, vt ipsius re-
dundātia pfundatur: sed satyriasm id esse minimē cōcesserim. Neque
enim ipsarū natura atq; tēperies, cū frigida sit, huic vitio habilis atq; ex-
posita est. p̄terea neq; partes ad arrectionē idoneas, quēadmodū Saty-
rus, vnde affectui nomē est inditū, mulier obtinet. Quandoquidē neq;
viri strangulatione ab vtero vexantur: qm̄ viro vterus datus non est.

ARETAEI CAPPADOCIS

DE CAUSIS ET NOTIS DIUTURORUM
NORVM AFFECTVVM

Liber Primus.

Iunio Paulo Crasso Patauino Interprete.

De Longis affectibus.	Cap. I.
De Cephalæa.	Cap. II.
De Vertiginosis.	Cap. III.
De Morbo comitiali.	Cap. IIII.
De Melancholia.	Cap. V.
De Furore.	Cap. VI.
De Resolutione neruorum.	Cap. VII.
De Phthisi.	Cap. VIII.
De Suppuratione in pectore.	Cap. IX.
De Vomica pulmonis.	Cap. X.
De Anhelitu.	Cap. XI.
De Pulmonarijs.	Cap. XII.
De Iecore.	Cap. XIII.
De Liene.	Cap. XIIIII.
De Morbo Regio.	Cap. XV.
De Cachexia, idest malo corporis habitu.	Cap. XVI.

De Diuturnis affectibus, Proœmium. Cap. I.

A



Diuturnarum egritudinũ dolor multus est, tempus colli-
quationis longum, & medicatio instabilis. vel enim
haud ex toto deleti sunt, vel ex qualibet leui offensa
morbi deleti reuertuntur. Nam laborantes æquo ani-
mo ferre vsq; in finem non audent. quin etiam si æquo
animo ferunt, in victus ratione nimis longa delinquunt. Si verò & do-
lor adest, laboriosa curatione per sitim, famem, amara medicamina, &
dolorem excitãtia, aut per sectionem, aut vstionem, quibus in diutur-
nis morbis egemus, miseri ægroti cruciantur: vt mortem, quã iam pri-
dem appetebant, effugiant. vbi me hercule in magna animi constantia

diu præstanda, auxilijs variandis, iucundis citrà noxam ægro conceden- E
dis, ipsoq; decipiēdo medici virtus atq; excellentia dignoscitur. Cate-
rùm & eger fortis sit, & cum medico aduersus morbum conspiret, ne-
cesse est. qui nō solum corpus tenaciter arripiens ipsum celeriter tabe-
facit & exedit: verùm etiam sensum magnoperè subuertit, animamq;
insanam reddit. Nanq; ab intemperie corporis id genus furorem, atq;
insaniam, quam græci Melancholiam vocant, proficisci nouimus. de
quibus in sequentibus dicam. in præsentia de Cephalæa, idest, de vete-
re capitis dolore sermonem institutam.

De Cephalæa. Cap. II.

F
SI caput repente obuia quaq; de causa, per plures etiam dies dolore
patitur; hic affectus Cephalalgia græcè nominatur: si multo tem-
pore dolor infestare aslueuit, & per longos, frequentesq; circuitus, ac
in dies maior violentiorq; insultat difficulter sanationem admittens;
id genus Cephalæam græco vocabulo appellamus. Eius formę infinite
sunt. quiquisdam enim perpetuus dolor inhæret, exiguus quidem, sed
non intermittens. nonnullis per circuitus reuertitur, vt his, qui quotti-
diana intermittente febricitant. nonnullis ab occasu solis vsq; in meri-
diem: & tunc ex toto remittitur. vel à meridie in vesperam, aut etiam
vlteriùs vsque in noctem permanet: sed non multùm hæc durat circui- G
tio. Præterea dolor modò est in toto capite, modò in dextra magis, mo-
dò in sinistra, modò circa frontem, aut synciput. hæcq; eodem die in-
certè & erraticè fieri solent. Quidam dextra tantùm parte dolent, qui-
dam leua: qua tempus, vel auris, vel supercilium unum, uel oculus ad
medium usque terminatur, uel qua nasus in æquas partes diuidit. ultra
quem terminum dolor non progreditur, dimidiũ tantùm capitis oc-
cupans. Id vitium solum Eterocrania dicitur, haud leue malum: quã-
uis intermittit, quãuis exiguum esse prima specie uidetur. nam si acu-
tè interdum impetum faciat, foeda atq; atrocia detrimenta affert. ner- H
ui distenduntur, facies obtorquetur. oculi uel contenti instar cornu ri-
gidi sunt: uel huç, atque illuc interius conuelluntur, ac uertiginosè agi-
tantur: in ipsisq; dolor profundus usque ad intimas tunicas descendit.
sudor extendonibus immodicus effluit repente: neque cohiberi po-
test: neque vlla causa præcessit, perinde ac, si quis ligno plagam inflixe-
rit. nausea & vomitus biliosus comitantur: homo consistere nequit,
sed in terram delabitur. Quòd si vitium quãdoq; increscit, de hominis
vita actum est. At si debilius est, & citrà vitæ periculum; diutiùs perma-
net: pigritia multa adest, & capitis grauitas: animi pendent vitam agrè
ferunt. fugiunt enim quodam modo lucem, tenebræque his ægritudi-

A nem solantur; neq; quicquam iucundi, aut intueri, aut audire sustinet. olfactorius in ijs sensus infectus est, neque quicquam eos bene olens oblectat; pariter quoq; graue olentia detestantur. vita ipsis inuisa est, mortemq; discipiunt. Harum calamitatum fons & origo est cum ariditate frigiditas. Si diu teneat, magisq; inualescat ægritudo; post id genus dolores vertigo subsequitur.

De Vertigine. Cap. III.

S I tenebrę oculis prætenduntur, & caput in turbinis modum circumduci videtur, & auribus murmur veluti delabentis cum strepitu fluminis insonat, aut tanquam ventus flatu vela percutiens, aut tibiæ fistularumq; cantus, aut veluti stridor plaustris currentis obstrepat; vertigo huic vitio vocabulum est. malum quidem, si capitis symptoma est; malum quoq; si cephalę successit, aut ex ea vetusta egritudine ortum est. Nam si priora vitia nõ recesserunt, sed remanet Scotodine, idest, tenebrę oculorum, & apparens motus in orbem, aut longiori tempore cum proprijs symptomatibus nulla adhibita curatione ad summum peruenit; vitium, quod à græcis Scotoma dicitur, à latinis Vertigo, procreatur. Causam habet frigidam & humidam: aliorumq; sæpe morborum, cum insanabilis euasit, initium est, vt furoris, melancholicę, morbi comitialis cuiq; suis symptomatibus accedentibus. Vertiginis autem forma ita se habet. grauitas adest capitis. splendida quędam oculis inter multas tenebras sese offerunt. suimet æger propinquorumque ignarus est. Cumq; morbus augefcit, tunc tibię soluuntur, atq; humi repunt. Nausea fit, atq; vomitus pituitę, bilisve tam atrę, quàm flauę. quando flaua per vomitum reiecta furor enascitur: atra vero, melancholia: ac pituita exeunte, morbus comitialis efficitur. Omnium quippe morborum talis conuersio est.

De Morbo comitali. Cap. IIII.

V Arium ac portentosum morbi genus est Epilepsia, quę dicitur à græcis, latine Comitialis morbus. terribilis vtq; in accessionibus, & peracutus, & perniciosus: quando quidem nonnunquam accessio vna hominem rapuit. At si diligenti cura vim morbi sustinet laborans; ægre tamen vitam ducit inter foeditates, ignominias atq; dolores. Morbus autem non facile recedit, sed ætatibus melioribus, & pulchriori tempore viget. vexat etiam pueros & adolescentes. interdum secunda fortuna euenit, vt per succedentem prouectiorem ætatem abigatur. quando simul cum ætatis flore euanescit: Sed & tum quosdam abiens deformes efficit, pueros quoq; pulchritudinis inuidia perdit, aut ma-

num inutilem reddens, aut faciem torquens, aut sensum aliquem pror **E**
 fus auferēs. Quòd si malum hoc penitus infederit, atque radices altius
 egerit; neque ipsum medicus, neque ætatis mutatio submouent, sed cū
 ægrotante viuit atq; commoritur. Interdum morbus iste membra ocu-
 losq; conuellens ac distorquens, dolores ciet: interdum & mentem in
 furorem adegit. Triste mediis fidius est ipsius inuasionis spectaculum:
 turpis & eius desinentia cum stercore, & lotio, & spontina ventris so-
 lutione. Ipsius quoq; morbi origo mirabilis, & præter hominum opi-
 nionem est: Quippe nonnulli flagitiosis hominibus à luna immitti exi-
 stimant: cuius rei causa & sacrum morbum hunc nominant. Verum &
 alijs rationibus id nomen ei fuit impositum: aut ob magnitudinem, oē **F**
 enim magnum, sacrum dici consuevit: aut quòd non humana ope tolli
 queat, sed diuina: aut quoniam demone correptus esse homo videatur:
 aut ob hæc simul omnia sacer morbus appellatus est. Quæcunq; sane
 huic tanquam acuto morbo symptomata eueniunt, superius memo-
 rauimus. At si diu permanet; neq; per intermissiones citra noxam de-
 gunt torpentes, abiecti animo, moesti, hominum aspectum consuetu-
 dinemq; vitantes; neq; ætate procedente mitiores fiunt. vigilant. per
 quietem multis formidolosis imaginibus terrentur. cibum sumere fa-
 stidiunt, sumptum male conficiunt. decolores, facieq; plúbea sunt. ob
 ingenij sensusq; tarditatem ægre discunt. auditus hebet. aures tinniūt. **G**
 capiti bombi veluti quidam insonant. Lingua in sermone perplexa est
 ac titubat, aut ex vi morbi, aut ob vulnera, quæ tépore exacerbationis
 accepit. tunc enim ob conuulsionis neruorum motū lingua in ore va-
 rijs modis torquetur. Rationem quoq; vsq; eo morbus conturbat ac
 deijcit, vt prorsus deniq; infatuentur. Atq; horum omnium causa est
 cum humiditate frigiditas.

De Melancholia. Cap. V.

A Tra bilis in acutis ægitudinibus si in superioribus apparet, op-
 pido quàm mortifera est: si ad inferiora descendens exijt, non **H**
 valde vacat discrimine. In tardis autem longisq; morbis, si ad aluū bilis
 atra decurrit, in tormina iecorisq; dolorē finitur: Mulieribus vero pur-
 gatio vice mensium aduenit, si in cæteris abest mortis periculum. At si
 superius, vt puta stomachum, septum'ue transuersum petit; insaniā pa-
 rit, quam græci Melancholiam nominant. flatum nanq; gignit, & ru-
 ctus foetidos piscium odorem exhalantes. infra vero & flatus cum cre-
 pitu transmittit: nec non & mentem simul alienat. Proinde melācholi-
 cos iuxta & flatuosos medici veteres sic affectos appellarūt. Porro qui-
 dam reperiuntur, in quibus neq; flatus, neq; bilis atra colligitur: sed ira
 immoderata,

- A** immoderata, & mœror, & ingens animi cōsternatio. hos quoq; nihilo minus Melācholicos nuucupamus. Bilem quidem in istis redundare iracundia significat; atram vero bilem, iracundiæ vehementia ac feritas. testis autem Homerus est, vbi inquit, Inter hos autem surrexit heros atrides late imperans Agamemnon tristis, furore autem valde præcordia atra circum oppleta erant. eiusq; oculi igni fulgenti similes erāt. Tales euadunt Melancholici, cū ab hoc malo interimuntur. Est autem animi angor in vna cogitatione defixus atque inhærens absque febre. Mihi profecto Melancholia Maniæ, (quæ latine Furor dicitur), initium atq; pars esse videtur. Siquidem furentibus animus modo ad excādescentiam, modo ad voluptatem cōuertitur: At melancholici in tristitia & animi angore duntaxat versantur. Furentes etiam plurimum vitæ sic transeunt desipientes, & fœda atrociasque committentes. Melancholici vero non vna tantum insanix specie laborant: sed aut venenum ne sibi detur, suspicantur: aut hominum cōsuetudinem perosi, in solitudinem aufugiunt: aut ad superstitiosam religionem conuertuntur: aut lucem hanc vitamque odio prosequuntur. Verum si quid interdum ex animi angore laxamenti habeant, exhilaratio voluptasque plurimis aduenit. Hi vero in furorem præcipitant. Sed quomodo quibusque sedibus affectis id vitium plerunque contrahitur, subiiciā. Porro si in præcordijs residet, causa circa septum transuersum immoratur, bilisq; supra infrave melancholicis prorumpit. Si caput etiam per consensum afficitur: & excādescentiæ delirium in risum hilaritatemq; per longum vitæ spatium commutatur: hi vero morbi potius magnitudine, quàm affectus dolore in furorem prolabuntur: In vtrisque nimirum ariditas accusanda. Viri sanè & furore & melancholia corripiuntur: rarius autem, quàm viri, sed deterius mulieres furijs agitātur. Actas, quæ prope statum est, & ipse status huic malo subiiciuntur. Aestatis tempus & autumnus hunc morbum procreant, ver autem iudicat. Inter notas euidentiores hæc sunt, quòd videlicet, quieti aut tristes, abiecti, torpentesq; sunt absq; ratione: nullaque de causâ melancholia initium sumit. præterea in iram facile incidunt, male sunt animati, vigilant, ex somnis tumultuose excitantur. ingenti quoque pauore trepidant, cū morbus cremētum suscipit. quando & insomnia vera sunt, terribilia atque euidentia. quotquot enim à naturali statu valde aliena sunt, ea non protinus huic malo insunt, sed per quietem sese offerunt: cū in aliquid impetu rapti sunt, postea facile eos poenitet. mutabiles sunt, turpes, de minimis quibusque solliciti, auari, sed non ita multo post simplices, prodigi, multa largientes, non virtute animi, sed morbi varietate. Quòd si malum exasperatur, homines oderunt, ab eisque fu-

* alias
tristitie.

giunt. de inanibus conqueruntur. vitæ maledicentes, mortem expectant. Atque istorum multis sensus ac mens usque eo stupore fatuitateque capiuntur, ut omnium ignari, sui que met immemores in morem bestiarum vitam degant. corporis quoque habitus in peius labitur: colore foedo, & ex atro viridi que commixto tinguntur: nisi inferius bilis descendat atque exeat, sed quoquo versum per corpus cum sanguine diffundatur. multi cibi capaces, nihilominus tamen extenuati sunt. quoniam somnus in eis neque potu, neque cibo membra confirmat, sed vigilia ad exterius mouet, ac dissipat. proinde & alius arida est, nihil deiciens. nonnunquam vero deicit sicca, rotunda, atro quodam bilioso que circumfusa. vrina pauca redditur, acris, biliosa. multum flatuosi spiritus in praecordiis est. ructus putidi feruntur, graue olentes perinde, ac si ex maris lacuna exhalarent. nonnunquam & humidum quoddam acrum cum bile reijciunt. arteriarum motus ferè parui sunt, pigri, inualidi, crebri, frigori similes. Fama est, ex his quempiam insanabiliter se habentem, cum puellam deperiret, medicis nihil proficientibus ab amore fuisse sanatum. Ego vero suspicor, eum ab initio in puellam exarsisse, inde tristem, & languenti animo, quod ea non potiretur, euasisse, suisque popularibus melancholicum visum esse. at iste ubi puellam amata se coniunxit, moestitia recessit: ira, & animi langor discussus est: gaudium tristitiam deleuit: & mens amore medico prorsum sanata est.

* Aliter
affectui.

De Furore. Cap. VI.

Furoris modi specie permulti sunt, genere tantum vnus. est enim ex toto mentis alienatio diuturna, vacans febris. Et enim si febris quandoque coniungitur, id non ratione furoris proprie, sed alio quouis casu incidit. Quippe & vinum mentem inflamat, & per ebrietatem delirare cogit. praeterea quaedam esculenta amentiam pariunt, ut mandragora & altercus. sed neutiquam hi inter furentes numerandi sunt. nam repente haec adueniunt, & celeriter conquiescunt: furor autem stabilis ac permanens est. Furori autem nihil simile delirium habet, quod senectæ calamitas est. Est enim sensus, mentis, rationisque marcor & ignauia ex refrigeratione proueniens. At furor ex calida siccaque causa exoritur, functionesque tumultuosas praestat. Deliramentum autem à senectute incipiens, nunquam per interualla desinit, simulque commoritur: Furor vero & intermittit, & diligenti curatione radicitus vellitur. Sed intermissio non sincera est, quando per se furor desinit: cum non congruenter aut medela, aut temporis anni clementia curatur. Nonnullos nanque, qui penitus soluti morbo videbantur, aut veris tempus, aut error in victu, aut ira casu aliquo prorritata denuo

Ad furorem reuocauit. Porro illi huic vitio facile patet, qui natura sunt iracundi, acriter excandescunt, negotiosi, faciles, hilares: qui iocosos, puerilibusque delectantur. Illi etiam, qui contrario his sunt ingenio, quicunque videlicet stupidi sunt, tristes, tardi in discendo, in laboribus perseverantes, et qui cum demum quid didicerunt, facile obliuioni tradunt; hi & melancholia promptius capiuntur, qui & antea in furorem procidunt. Verum & in ætatibus, quibus calor & sanguis multus est, hi furore exagitantur, ut puberes, iuuenes, & viri. In quibus autem calor ex atra bile accenditur, corporisque habitus ad ariditatem vergit; his in melancholiam cadere facillimum est. Item victus ratio, multi cibi

B assumptio, saturitas immodica, ebrietas, luxuria, veneris appetentia hanc egritudinem concitant. Nonnunquam & mulieres, nisi munde tur corpus, furor infestat: cum ipsarum vteri ad virilem congressum apti euaserunt. alia vero haud ita facile, sed admodum acerbe in furorem agitur. Cause tales sunt, vir nimirum furiosus fit, si consuetus sanguinis exitus, aut bilis, aut sudoris, aliqua de causa repressus est. Et quibus furor voluptati est, rident, ludunt, saltant die noctuque: irascuntur palam: nonnunquam coronati incedunt, ac si ex aliquo certamine victores redeant: quibus obuiam fiunt, non sunt infesti. ita se habet huiusmodi furoris species. Alij vero ab ira furentes nonnunquam sibi vestes prosciderunt, & seruos interfecerunt, & sibi ipsis manus intulerunt, & obuios quosque male habuerunt. Species utique infinite sunt. Ingeniosi nanque ac dociles Astronomiam callent sine doctore: Philosophiaque possident à nemine traditam: Poeticam quoque veluti à musis infusam norunt. Aliquid enim & in morbis emolumenti præbet docilitas. Rudes autem atque indocti homines hoc malo circumuenti grauium pondera ferunt: figulinam exercent, aut fabrilis: aut lapides celant. Præterea & monstrosa quedam cogitant. Timebat enim quispiam ne vasa olearia prociderent: Alius non bibebat, se laterem esse existimans, ne humore dissolueretur, pertimescens. Id etiam fama diuulgat, carpentarius quidam olim fuit, cum domi esset, prudens operator: ligna bene metiebatur, scindebat, complanabat, clauis iungebat, aptabatque: in domo extruenda sobrius cum exactoribus operum versabatur, paciscebatur, pro laboribus iustam mercedem poscebat. porro iste in loco, ubi arte sua fungebatur, mente constabat: at si in forum quandoque discederet, ad balneum, aut ad aliud quippiam necessarium; instrumenta deponens primo suspirabat, deinde egrediens humeros constringebat: postea cum è seruorum, fabricæ, locique illius conspectu abiisset, tum penitus insaniebat, & furore rapiebatur. quod si ad eundem locum celeriter recurisset, iterum ad se redibat. Hæc erat inter locum illum & viri

mentem cognatio. Causa morbi huius in capite præcordijsque continetur: modo utroque membro pariter laborare incipiente, modo alterum altero inuicem lædente. Verum præcipua furoris & melancholiæ sedes viscera sunt. quemadmodum caput & sensus in phreniticis plerumque laborant. in quibus vis sensoria oblata est; & quæ non adsunt, tamquam iam præsentia conspiciunt: & alijs non conspicua, ipsorum sese oculis repræsentant. At furentes tantummodo vident, quæ videre oportet; sed de illis non sentiunt, ut sentiendum est. Itaque si magnum est malum, promptiore ingenio sunt, sensibus acutiores fiunt, suspitiosi sunt, iracundi nulla de causa, moerentes præter rationem, cum in feuerum & tetricum furor vertitur. cum vero ad animi hilaritatem inclinatur, læti & alacres fiunt. prius dicti sine lædente causa vigilant. utrisque visio deprauata est. capitis dolor, aut saltem grauitas comitatur. auditu prompti sunt, mente tardissimi. in quibusdam sanè peculiariter sonant aures, & bombis adeo perstrepunt; ut tubarum fistularumque voces audire sese existiment. idque fit, cum morbus clementum accepit. multo vento inflantur, anxij sunt, in sumendo cibo voraces atque auidi. vigilant enim, & vigiliam famem suscitatur. verum neque, ut ægri solent, emaciantur: sed magis peculiaris melancholicis corpulentia est: item pallore quodam suffunduntur. Si quod autem viscerum phlegmone inuaserit, tunc appetentia nutritiove hebetatur. oculi caui fiunt, non conuenientes: ob quos cœruleæ atræque imagines sese obijciunt, si ad melancholiam affectus vergit: sed rubicundiora & punicea visa sunt, si ad furorem inclinatur. plerisque etiam tanquam fulgurans ignis apparet, pauidumque eos veluti instantis fulminis occupat. nonnullis vero & rubent oculi, & sanguine suffusi sunt. In summo ægritudinis impetu varijs secundum quietem visis perturbantur, immoderateque venerem concupiscunt. neque eos etiam in publico ventrem exonerare pudet. ad mutua & familiaria colloquia pigri sunt. commonefacti & increpiti ad iram excitantur, atque furore penitus insaniunt. Exinde alius alio modo furit, quidam immensum spatium decurrunt: & quo peruenturi sint, nescientes; eodem, unde discesserant, cursu feruntur: Alij per longum iter eos, quibus forte occurrerint, comitantur. Item nonnulli vociferantur, latrocinium, aut vim illatam querentes. Alij ab hominum conspectu in solitudines fugiunt: secumque tantummodo versantur. Cum vero iam inclinatus est morbus; stupidi, quieti, moesti que sunt: in notitiam enim morbi venientes, sua calamitate miseriaque tristantur. Alia reperitur furoris species, qua laborantes propria membra dilacerant, pia cogitatione Dijs suis tanquam id postulantibus gratificantes: Id furoris genus à persuasionem quadam duntaxat proficiscitur. in cæteris

A hi temperantes modestique sunt. excitantur autem tibiꝑ cantu, alioꝝ ue animi oblectamento, aut temulentia, aut præsentium hortatu. Deorũ afflatu hic furor prouenit: qui cum remittitur, hilares sunt & curis vacui, tãquam dijs initiati. præterea decolores & macie affecti sunt, diuq; ex vulnerum doloribus infirmum eorum corpus est.

De Neruorum resolutione. Cap. VII.

A Poplexia, Paraplegia, Paresis, Paralyfis, oĩa genere eadem sunt. aut enim motionis, aut tactus, aut vtriusque defectus est: interdum & mentis, interdum & reliquorum sensuum. Sed Apoplexia totius quidẽ corporis & sensus, & mentis, & motionis resolutio est. proinde Apoplexiam fortem soluere nulla facultas potest: debilem vero tollere non facile est. Paraplegia est tactus motusque remissio, sed in membro vno, vt puta manu crureve. Paralyfis autem motus tantum ferẽ est actionisque defectio. Quod si nonnunquam solus tactus defficiat, (raro autem id euenit,) potius Anæsthesia, idest, sensus abolitio, quàm Paresis, idest defectio nominatur. At si Hippocrates apoplectõ, idest, attonitum crus secundum rectum dicat; illud tanquam mortuo simile, inutile, & insanabile vult significare. quod enim in toto corpore est vehemẽs Apoplexia, illud in crure Paraplegiam vocat. Vrinæ autem in vesica aut suppressio, aut retinendi impotentia, Paresis proprie est. Palpebrarum vero & malarum, musculorumque in maxillis, & genæ in alterutram partem diductio, si per conuulsionem torqueantur; Canina cõuulsio nominatur. Genuum resolutionem, sensusq; per aliquantum temporis stuporem, & exanimationem, & casum Lipothymiam, idest animæ deliquium vocitamus. Verum nonnunquam membra singulatim resoluuntur: supercilium, exempli gratia, solum, aut digitus, aut maiora etiam, vt manus crusve: nonnunquam simul plura: & aliàs dextra tantum, aliàs sinistra; aut vnum post aliud omnia resoluuntur exquisitè, aut debiliter. neque tantum quæ distantia sunt, & quæ eodem censentur nomine, cõiugataque sunt; vt oculi, manus, crura: verum etiam coniuncta, cognataque; vt nares vsque ad medium, & lingua vsque ad fines, qui in ipsa media positi sunt. vna tonsilla, & isthmus, ipsaque gula dimidia resoluitur. Ego sanè stomachum etiam, & intestina, & vesicam, oblongumque intestinum vsque ad principium, idest, anum idem vitium pati existimo. Sed interiora membra resoluta latent, obscuraque sunt. imperfectæ vero sunt ac dimidiatæ eorum functiones. proinde mihi & membra dimidia pati videntur in duas partes à morbo diducta. Hæc res nimirum documento est, quo dextræ partis facultas & natura à sinistræ partis natura & facultate differat. Quippe

asidens causa æqualis est, & vtrique communes morbi occasiones: si- **E**
 ue frigiditas sit, siue cruditas. Sed vtraque haud æque pati idonea est.
 Natura vero æque valens est, vbi subiecta sunt æque valentia: idem au-
 tē inæqualibus inesse nullo modo potest. Igitur si infra caput aliquod
 principium affectum sit, qualis medullæ dorsi membrana est, quæ no-
 minis eiusdem sunt & contigua, dextra in dextris, & in sinistris leua re-
 soluuntur. Verum si caput primo in dextra patiatur, sinistra; si in leua,
 dextra neruorum resolutione laborant. Hoc ideo euenit, quòd ner-
 uorum initia permutata sunt. Neque enim dextri nerui in dextras par-
 tes secundum rectum vsque ad extremum progrediuntur: sed ab ini-
 tio enati protinus ad oppositos transeunt, se in vicem in figuram huius **F**
 literæ, X quam græci Chiasmon vocant, permutantes. Vtque semel di-
 cam, siue omne simul corpus resolutionem neruorum patiatur, siue
 aliqua membra, siue ab alterutra, siue ab vtraque parte; nerui de capite
 fluentes alia ratione patiuntur. Nam sensu quidem, vt paucis dicam, hi
 priuantur, non admodum autem facile ex se motum amittunt. Quòd
 si per communionem cum his, qui mouentur, aliquid vitij contraxe-
 rint; paulum & ipsi motus perdiderint. Nam & per se ipsi motum ta-
 met si minorem naturaliter possident. Nerui enim à musculis ad mu-
 sculos transeunt motionis principatum obtinent; & his, qui à capite
 manant, impertiunt. Nerui enim capitis ab illis plurimum motus par- **G**
 ticipant: tamen ex se quoque, licet minorem, vim mouendi habent. At
 que hi nimirum in motu noxam magis patiuntur. Raro autem vsu ve-
 nit, vt per se iacturam sensus faciant: neque tunc ex toto eam facere vi-
 dètur. At si qua copula neruorū ab osse quopiam enatorum, & ad ossa
 pertinentium, soluta, aut rupta sit; tum membra proprio situ non con-
 tinentur, luxantur, locoque dimouentur: non tamen sensu priuantur.
 Hæ sunt autem Paraplegiæ species. quandoque enim membra resolu-
 ta in longum porriguntur: neque, quando extrema longissima appa-
 rent, iterum possunt recuruari. nonnunquam in orbem flectuntur, neq;
 in longum extenduntur: Siquis autem ea, ceu ligna adaptans & poliēs, **H**
 violenter protrahere nititur, breuiora ea seipsis inueniet. Vtrunq; id vi-
 tium & in oculis pupilla sustinet. aut enim in amplitudinem magnam
 diffunditur; idque Platycorien, idest, pupillæ amplificationem appella-
 mus: aut hæc eadem in angustum contrahitur; idque Phthisis, aut etiā
 Mydriasis à nobis dicitur. Vesica etiam in suis obeundis muneribus de-
 prauatur, & Paresim quam vocant, patitur. aut enim per extentionem
 resoluitur, cum retinendi impotens lotium effundit: aut in se ipsam cō-
 uoluitur, cum vrine plena reddere nihil potest. Morbi huius, Paresis vi-
 delicet, causæ prægredientes sex numerantur; vulnus, percussio, refri-

- A** geratio, cruditas, venus, vinolentia. Cæterû & animi immodicæ perturbationes, vt repente incussi pauores, timores, animi cōsternatio, & mœror: præterea & in pueris terrores: interdum inopinatum atque ingens gaudium: item risus vsque ad mortem implacabilis neruos resolvere consueuerunt. Hęc vtique morbi prima initia sunt: Sed vltima atque potissima causa est ingenitæ caliditatis refrigeratio, quando ab humiditate aut siccitate iniuriam patitur. ab hac vero magis, quàm ab illa sanatu difficilis læsio est: nec non & à vulnere, neruique intercissione malum insanabile prouenit. Quantum ad ætates attinet, senes & ipsi curationem vix recipiunt: pueri facile ad sanitatem redeunt. Inter anni tempora hyems hanc ægritudinem gignit præcipue, secundo ver, tertio autumnus, æstas omnium minime. Habitus corporis pingues natura, humidi, defides, belluini, hoc vitio facile corripitur. Affectus hi iam perfecti talibus signis deprehenduntur, immobilitate, sensu sopito, qui neque calidum, neque frigidum, neque vellicantes aut scalpentes, aut aliter contingentes percipiat. Raro euenit, vt istis extremitates doleant: verum sanitati recuperandæ indolentia non leuiter prodest. Porro morbus hic repente inuadere solet. nonnunquam tamen etiam prælonga habet initia, grauitatem, motum difficilem, torporem, frigoris sensum, aliàs caloris excessum, somnos breues, cogitationes, siue apparitiones vehementiores, atque tunc subito resoluti sunt. Nempe in Canino vocato spasmo, idest, neruorum cōuulsione, omnes faciei partes conuelli, non magnopere vsitatum est. Sed ad dexteram partem leuam, ad leuam dextram feruntur: quando buccæ atque os huc aut illuc, tanquàm ex sede propria discedente maxilla longius detorquentur. Etenim quibusdam nonnunquam articulus luxatus est, cum valde hiantibus maxilla ad inferiora delapsa fuit. in læsa mala oculi inuersio & strabositas, (vt ita dicam) fit: in palpebra inferiore palpitatio. palpitat & superior aliàs quidem cum oculo, aliàs vero sola. Cōtenduntur & labia seorsum alterutrum: nonnunquam vero & ambo collapsa balbutiunt. quibusdam & exacte occluduntur, postea repente ac late dehiscunt, & solitum sputum cum strepitu eijciunt. conuellitur & lingua: siquidem & ipsa musculus est & nerui: quando ad palatum secundum latitudinem tota cohærens subito sese remouit, & concussione sonum reddidit. conuellitur & columella: ac si os, quæ interius sunt, in vnum cogat, inopinatus sonus redditur: si vero dehiscat, columellam intueberis nonnunquam palato secundum latitudinem adhærentem; nonnunquam violentia quadam in longum productam, ac descendente; fistulæ persimilem: quando quidem & ipsa sonum edit. Porro caninæ conuulsiones decipiunt, quippe integræ ac sanæ partes ægrotare spectantibus videntur:

Nam in omnem partem tentione, colore, oculi amplitudine, sanæ partes læsionem pati existimantur. Deprehenduntur vero & ridendo, & loquendo, & conuiuendo. Siquidem læsæ partes omnes cum violentia & strepitu quodam trahuntur: labium risu caret: inter loquendum non mouetur: palpebra non volubilis, oculus intentus ac rigens est: sensus tãgendi nihil percipit. At sana mēbra loquuntur, cōniunt, sentiunt, ridet.

De Phthisi. Cap. VIII.

S I ab externa causa abscessu in pulmonibus facto, aut à longinqua tussi aut à sanguinis reiectione & puris extusiant; Pye & Phthisis nominatur. Si pectus autem, costave suppurauerit, materiaq; per pulmones traducatur, id genus homines Empyi græce vocantur, Purulenti à latinis dici possent. Quod si et ab his pulmo exulceretur à præterlapso pure corrosus; hoc vitium non vltius empyma, idest, purulentia, sed Phthoem, idest corruptionem appellato. Simul autē adest & ignis assiduus, qui nunquam intermittere videatur interdium latens sudore atque corporis frigore. Hęc enim propria Phthoem sequuntur, quod videlicet caliditas excitatur, & in noctem emicat, interdium rursus in visceribus delitescit. patet autem istorum angor, & imbecillitas, & colliquatio. Nam si per diem corpus ignem euaderet, cur non fieret tunc homo carnosior, & robustior, & morbi tolerantior? vt enim recessit, grauius magis intenduntur: arteriarum motiones parue & imbecillæ fiunt: vigilant, color languet; & alia omnia patiuntur, quotquot febricitantes comitari solent. At species humorum prope infinite sunt, liuidorum, atrorum, purorum ac syncerorum, aut pallido alboque, aut albo & viridi mixtorum, latorum, rotundorum, durorum, glutinosorum, aut rorum diffluentium, aut odore carentium, aut fœde olentium. Omnes autem hæ puris forme ac species sunt. Quicunque vero aut igne, aut aqua humiditates explorant ac notant; hi haud ita multum phthoem mihi dignoscere videntur. Nanq; visio quolibet alio sensu certior est, non modo his, quæ reijciuntur, intuendis, sed etiam ægrotantis specie consideranda. Siquis enim vel plebeius hominem viderit pallentem, imbecillum, tussientem, macie confectum; hunc vera Phthoe laborare pronuntiat. Quinetiam quibuscunque quidem vlceratus pulmo non fuerit, nihilominus tamen diuturnis febribus consumpti sunt, sæpiusq; duriter, & absque effectu vlllo tussientes nihil reijciunt; hos quoque Phthificos haud ita multum improprie nominarunt. Simul vero & his adest pectoris grauitas: pulmo enim infirmus est: angor, intolerantia, cibi fastidium, vespertina extremorum frigiditas, & matutina caliditas: sudor vsque ad pectus caliditate molestior: per tussim varia, qualia

- A** lia memorauimus, extruduntur: vox rauescit: ceruix nonnihil tortuosa est, gracilis, non versatilis, sed veluti rigens atque intenta: digiti tenues, sed articuli crassi sunt: ossium duntaxat species remansit. si quidem & carnes extabescunt. ungues adunci fiunt: digitorum ventres rugosi & lati. nam præ macie neque fasciam ambientem, neque rotunditatem obtinent. quam ob rem & ungues adunci sunt. ea est enim ipsorum requies & fulcimen, quæ ipsorum extremitates replet: quoniã & ipsi laborem sustinent, vt pote qui solida membra sunt. Item nares ipsæ acuminatæ, graciles: malæ extantes & rubidæ: oculi caui, lucidi, micantes: tumida, excarnis, pallida, seu liuida facies est. buccarum tenuia dentibus inhærent: ridentibus assimulantur. in omnibus denique cadaueris speciem referunt. Hunc in modum & cætera sese habent: tenues enim & carnibus priuati sunt: brachiorum muscoli non apparēt: mammarum neque vestigia extant: solæ autem papillæ cernuntur. constas nō solum dinumerare perspicuè licet, verum etiam vbi desinant, intueri facile est. neque enim cum vertebris factæ articulationes occultantur. patent etiam in os pectorale costarum insertiones: quarum interstitia inania & caua sunt, Rhombi figuram secundum ossium circumductum ostendentia. præcordia vacua ad superiora conuulsa sunt. abdomen & ilia spinæ dorsi cohærescunt. artus conspiciui, prominentes, & macri sunt: perinde se habent & tibia, & coxendix, & brachiū. at spina vertebris superextat, à priori parte caua, vtrisque musculis per tabem dissipatis. scoptula operta tota sese conspectui offerunt, atque auium alas imitatur. Huiusmodi ægrotis si alius perturbetur, actum est: sin ad sanitatem vergant, perniciosius contraria signis adueniunt. Porro senes in hoc malum frequenter non incidunt, sed minime euadunt. Iuuenes autem vsque ad florentem consistentemque ætatē post sanguinis reiectionem in phthisim prolabuntur: inde sanescunt quidem, sed non facile. Pueri assidue tussi vsque ad phthisim nonnunquā diuexati facile ad sanitatem redeunt. Habitus verò in id vitium
- D** proni sunt graciles delicatique, sectilibus tabulis similes, alarum instar habentes, prominenti gutture, albidis, rariore pectore. Regionibus autē frigide atque humidæ huiusmodi affectus germanæ sunt.

F

A R E T A E I
De Purulentis, Cap. IX.

Q Vibus hominibus in cauis locis è regione pectoris, aut inferius sub transuerso septo puris abscessus fiunt; si per os id eijciūt, Empyi, hoc est, Purulenti vocitantur. Si per aluum pus deijcitur, Apostematique græco vocabulo dicuntur. Ac si in pectore quidē, cum est vlceratum, in pulmone verò, cum phthoe laborat, aut in subli-
nente costas mēbrana circa latus, aut os pectoris, quod græci Sternon-
vocant, aut inferius, vbi pulmo cum spina dorsi committitur, cohære-
scitque, aut si quo alio pectoris loco vitium sit, omnibus ad pus excer-
nendum via per pulmonem munita est. Sub intersepto verò in visceri-
bus, iecore, liene, renibus per vesicam; in mulieribus etiam per vterum
transitus datur. Nempe cuidam ego aliquando abscessum laxioris in-
testini dextra in parte propè iecur dissecui: multumque inde puris effu-
sum est. multum quoque per renes & vesicam ad plures dies emana-
uit. vnde & sanitatem homo adeptus est. Causæ verò communes om-
nium hæ sunt, plaga, cruditas, frigus, & id genus alia. Porrò & quibus-
dam in pectore diuturna tussis incumbens, & lateris inflammatio, &
vomica pulmonis, & fluctio longinqua, necnon & acuti morbi in ali-
quod istorum decubitus, purulentię originem præbent. At humor a-
liàs iners imbecillusque alij inhæret, aliàs acris & mordax, & ad mor-
tem vsque putrefaciens. Nam & species infinitæ sunt, quas suo loco po-
stea memorabimus. Sed magnum profectò miraculum est, quomodo
id fiat, vt ab exili tenuique membrana nihil crassitudinis habente, mē-
brana inquam costas interius obtegente, tanta copia puris effundatur.
multum enim colligi in multis deprehensum est. Huius rei causa est in-
flammatio ex sanguinis multitudine oriens, ob quam membrana cras-
fescit: verum ex multo sanguine multum in medio pus contrahitur. id
si ad interiora subeat, costarum ossa suam propriam sedem obtinent,
sed phthisis altera species superius à nobis memorata secundum natu-
ram eueniet: sin ad exteriora procurrat, ossa disiunguntur. in aliquod
enim inter costas medium spatium ipsius abscessus acies exeritur: quā-
do in hanc atque in illam partem costarum ossa pelluntur. Notarum
autem quædam omnium communes, quædam singulorum affectuum
proprie sunt: grauitas potius quàm dolor, commune signū est. Pulmo
enim dolorem non percipit. febres obscure, horrores vespertini, sudo-
res in remissione, vigilia, tumores in extremis pedibus, manuumque di-
gitis subinde consistentes, atque insurgentes: inquietas, cibi abominatio,
totius corporis macies. Quòd si & in longum mutatio producit, ha-
bitus phthisicus redditur: neque enim ultra in officio natura perseuc-

- A** rat: quoniam concoctio non fit, qualis antea. inde caro consumitur: color, qualis belluæ, efficitur. Spiratio cunctis quidem mala, sed illis peior, quibus ad superiorem ventrem morbus ascendit. quin etiam tussis ab initio tātisper vexat, donec inflammatio, quæ vrget, perseverat. quādo & dolores, & horrores augentur: & caliditas, & vigilia, & spiritus difficultas adhuc magis crescunt. Venarum motus parui, torpentes, imbecilli fiunt: mens delirat, pectus distenditur. Verum enimvero si ad suppurationem inflammatio veniat, omnia maxima fiunt: sed reiectio parua est cum maiore tussi, & [†] ex violento abscessu. in primis pituita fertur bile infecta, ad nigritiem vergens, tanquam admixta fuligine, adhuc tamen cruenta ac pinguis pituita est. Quod si proxime rumpenda inflammatio est, quæ reijciuntur speciem carnis habent, crassioraq; sunt. At si iam rupta sit, strangulatus discrimen impendet, si multum subitaneumque pus emanauit: si pedetentim verò emittatur, exactè sanitas aduenit. Porro si ad inferiora pus transire velit, partes quidem superiores, vbi erat abscessus, acutus dolor occupat: alius verò humida est, primum aquosa cum pituitosis deijciens, deinde cruenta quædam circumfluentia: rursusque carnosæ, cum iam effractus abscessus est. Hæc pus sequitur aut per aluum, aut per vrinæ vias elabens. Sed materiæ ad renes & vesicam transmutationes meliores omnibus sunt. At si pus infra supravæ feratur, eius color varius est, pallidus, aut albus, aut cinereus, aut liuidus, aut ater. pus item aut olidum est, aut odore vacans: crassissimū, aut mediocris corpulentia: aut læue æquale, aut asperum inæquale. Et frustra caruncularū similia in eo fluitantia rotunda, aut lata sunt, quæ facile abluantur, aut tenacia. Vtque in summa de pure dictum sit, quæcunque alba feruntur, concocta, inodora, læuia, rotunda, & celerius extussumuntur, aut per aluum deturbantur, hæc tuta & salutaria sunt: quæcunque autem perpallida, biliosa, & inæqualia sunt, ea praua esse scito: Sed multo his peiora, liuida & atra. putredinē enim et exedentia vlcera significant. Ad hæc & habitum simul animaduerte-
- D** re conuenit, & quæ morbum comitantur: nam si excretionem bene tolerat, febre vacat, recte concoquit, bene coloratus est, bene ad cibos se habet, si facile extussum sit, si articularum motus bonus est, si vires firmæ, egrotus perniciem euadit. At si febris superueniat, omniaq; in deterius conuertantur, de salute desperatum est. Præterea & loci abscessibus occupati simul noscendi sunt: quibuscunque enim in osse pectoris, quod Sternon vocant, empyema idest, purulentia fit, tarde abscedit. nudæ enim, & excarnes, & cartilagineæ partes illæ sunt: cuiusmodi verò non facile phlegmones redundantiam suscipiunt, & absque suppuratione multum temporis permanent. Siquidem res frigida cartilaginee sunt;

* Aliter
violenta
extētiōe

sed earum phlegmonæ minime nocent. Ipsius verò habitus colliquationes prauæ sunt, breui enim tempore suppurant. Lienis, iecur, & pulmo, & interseptum celerius quidem pus ducunt, sed periculosa & mortifera sunt. E

De Pulmonis abscessibus, Cap. X.

Q Vicunque pulmonia laborant, si pituita sit, nisi diffundatur, superstites erunt. hi verò morbi primum impetum euadentes purulenti fiunt. Futuri quidem, aut iam perfecti abscessus indicia in capite de purulenti exposuimus. Cum perfectus iam abscessus est, non vi ac laboribus ad eum rumpendum reiiciendumque, quemadmodum in alijs corporibus vsu venit, opus est: sed facile per superiora excernitur: cum magis in raritatibus, quàm in corporis habitu distentio fiat. Rarus enim ac foraminulentus pulmo est, spongiæ similis, humorem haud moleste ferens: qui aliam post aliam inanitatem eo vsque, donec ad asperam arteriam deueniat, permutare solet. Circuitus autem humori faciles sunt, quandoquidem flexile atque lubricum pus est. Respiratio etiam sursum spiritum efflat. Sæpius autem mortem effugiunt, nisi aliquando quispiam subitanea ac multi humidi attractione stranguletur: quod arteria puris multitudine obstructa aerem non recipiat. Horum nonnulli progressu temporis moriuntur, quemadmodum phthifici aut purulenti extingui solent. Spuita verò cædida sunt, spumantia, cum saliuâ permixta, aliàs cineracea, aut subnigrificantia. Et Bronchia, idest, asperæ arteriæ circuli nonnunquam expuuntur ob vlceris varietatem, si altè abscessus penetrat: quando & fragmenta visceris expelluntur. Rauescunt: breue spirant: grauem vocem edunt. ipforum pectora latefcunt, & latioribus humiditatis causa indigent. oculorum nigræ partes fulgent, albæ verò albissimæ fiunt, ac pingues: malæ rubent: venæ in facie elatæ ac tumidæ sunt. Mirum est autem in his, quòd tenor, quàm pro corpulentia, maior est, animi verò alacritas & constantia tenore potentior. F
G
H

De Asthmate, siue Anhelitu. Cap. XI.

SI à cursu, exercitationibus, & quolibet negotio spiritus ægre redditur; Asthma græce, Anhelitus latine vocatur. Morbus quoque ille, quem græci orthopnoeam dicunt, & ipse Asthma nominatur. in accessionibus enim & ipsi anhelant. Orthopnoeam verò appellant, quoniam erecto duntaxat corpore facile spiritum ducunt. decumbentes enim strangulantur. propter extentionem igitur, quæ in spirando adhibetur, affectui nomen Orthopnoea, idest, Recta spiratio inditum est.

- A** Erectus enim homo ad respirandum extenditur. at si supinus decubuerit, strangulationis instat periculum. Afficitur autem pulmo, simul etiam quæ spirationi conducunt, afficiuntur interseptum & pectus. At si cor vitiatum sit, nunquam diutius vita produci poterit: hoc enim loco spirandi viuendique initium situm est. Causa est frigiditas spiritus, atq; humiditas: materia verò, crassi interiusque abditum humores. Huic vitio mulieres opportunæ sunt magis, quam viri: quâdoquidem & humidae & frigidae sunt. Pueri facilius, quam hæ, liberantur: nam ipsorum natura in incremento est, quæ valentissime calefacere potest. Viri tamen nō facile hoc morbo capiuntur, citius tamen capti pereunt. Differtur autē interitus quibuscunque opere conficiendo, aut lanis elaborandis pulmo incalescit, & acceditur: quemadmodū calcis opificibus, aut ærarijs, aut ferrarijs fabris, aut ignis in balneis excitatoribus. Morbi verò incipientis notæ huiusmodi sunt, grauitas pectoris: tarditas ad opus solitum, & ad aliud quodlibet gerendum: in cursu, aut in accliuo itinere difficilis & egra spiratio: raucescunt, ac tussunt: flatus in præcordijs, atque eructationes præter rationem excitantur: vigilant: nocturnum, & obscure incalescunt: nares acutas, & ad spirationem paratas habent. Si malum in peius ruat, male rubent: oculi prominent, veluti in his, qui strangulantur: stertunt, dum vigilant, multo magis, cum dormiunt: humida, obscura, sonoque carens vox est: multum & frigidum aerem cupiunt: sub diuio ambulant: quælibet enim domus ipsis ad trahendum spiritum parua & angusta est. Erecti spirant, tanquam omni aere attracto potiri cupientes. præ aeris autem cupiditate & os aperiunt, patefaciuntque, tanquam eo ampliore indigentes. Ipsorum facies præter malas, quæ rubent, pallida est: sudor circa frōtem & iugula emanat: assidua & aspera tussis infestat: reiiciuntur pauca, tenuia, frigida, veluti quædam spumæ efflorescentia: inflante spiritu collum intumescit: præcordia reuulsa sunt: arteriarum pulsatus parui, crebri, atq; depressi: crura exilia: Quod si hæc vltius clementum acceperint, instar comitalis morbi nonnunquam hominem strangulant. At si vertatur in melius, tussis longior, & rarior fiet: plura excernentur saniosa sputa, & humidiora: multa per ventrem aquea exturbabuntur: vrina copiosa scaturiet, licet nondum quicquam in ea subsidat: vox sonantior, clariorque reddetur: somni longiores, quantum satis fuerit, efficientur: præcordia remittentur: dolor interdum ad scapulas in remissione transiit: anhelitus rarus, lenis, sed cum vocis asperitate fit. Ita sanè morum effugiunt: Sed in morbi cessationibus, licet ipsi non decumbentes obambulent, secum tamen morbi signa circumferunt.

* aliter
minor

Anhelitus species Pulmonarium est, quod græci Pneumodes vocant. Et à pulmone vitium, quemadmodum & anhelitus, oritur. Quæ insunt enim, vtrique communia sunt, & exigua differentia est. Nam spirandi angustia, & tussis, & vigilia, & caliditas vtrunque vitium comitantur. item in cibos odium, & totius corporis extenuatio. Id enim malum cum foedum sit, producitur, neque tamen anni spatium excedit. Nam si autumnî tēpore egrotare quis inceperit, vere, aut æstate futura vitam finiet: si in hyeme, sequenti autumno moriturus est. Interdum & senes in hanc labem facile incidunt, & exterriti. Ea correptis leui momento ad perniciem opus est. omnes simillime spiratione priuantur. arteriarum motus parui, crebri, infirmi sunt. Sed hæc & in anhelitu reperiuntur. Priuatim verò hi tussunt, tanquam aliquid expulsuri, cum tamen irritus eorum labor sit, nihil enim reiiciunt. verum si quid ex pulmone vi extruditur, illud exiguum, album, rotundum, grandinosumque est. Pectus in his latius vtrique est, non obtortum, non ulceratum. Tametsi autem pulmo non suppuret, humorum tamē veluti concretorum plenus est. Temporis intercapedines inter huiusce morbi accessiones longiores sunt. Nonnulli ex his celerius suffocati sunt, quàm aliquid deterius omne corpus inuaserit. nonnullis vero in **G** Hydropem circa ilia, aut in eū, qui Anasarca dicitur, morbus iste mutatur ac desinit.

De Iecore. Cap. XIII.

Iecur lieni in generationem equilibre est. dextram enim leuamque partem hæc viscera occupant, naturaliter paria numero, sed facultate tam in sanitate, quàm in morbis imparia. In sanitate quidem, quoniam principatum alimenti iecur obtinet. si quidem venarum radicatione iecur est. Quinetiam in morbis ad sanitatem consequendam multo, quàm mors, valentiolem causam habet. Igitur quāto ad sanitatem **H** iecur melius est, tanto & deterius à morbis afficitur. Etenim celerius et violentius inflammatur: & frequentius perniciosiusque abscessum patitur. At duro tumore, qui Scirrhus græce nuncupatur, affectum velocius, atque dolentius, quàm lienis, interficit. Quæ ad inflammationem attinent, in libro de acutis morbis proposui. Quod si in pus conuertitur, dolor acutus ad iugulum vsque, aut & ad summum humerum pertinet. Nam præ onere interseptum, vnde iecur suspensum est, detrahit: interseptum verò membranam costis substratā degrauat: ipsum enim illa consequitur: quæ planè ad iugulum vsque & ad summum hume-

- A**rum extenta est, atque hæc omnia simul ad inferiora detrahuntur. Ignis acer cum horroribus in suppuratione exoritur: tussis arida non admodum crebra diuexat: colore herbaceo ægri tinguntur: si largius colorantur, in auriginem incidunt in albidum vergentes: somni haud ita visis imaginibusque vacant. Prudentes verò cum sint in omnibus, in aliquo tamen ad tempus oblato repente delirant, ad seque protinus reuertuntur. Tumor sub mammis, aut sub costis oritur: multi autem membranæ Peritonæi tumorem esse falso crediderunt. Verum si tumor sub spurijs costis fiat, cum premitur, dolor excitatur: iecur intumescit. humiditate nanque refertum est. At si non sub ossè remaneant, inflatur
- B** membranæ signum Et ipsius quidem circumscriptio & fines patent: post enim fibrarum circumductum in vacuum abdomen comprimēs manus descendit, ac subsidet. Peritonæi verò interminata duritia est: & extremitatis processus nequaquam cernitur. Porro si ad interiora subit abscessus, longè medico natura præstat: aut enim ad intestina, aut ad vesicam pus conuertet. verum multo innocentior est in vesicæ via. At si extra feratur abscessus, ipsum non secare utique malum est: nam si prætermittatur incisio, à pure iecur eroditur, nullaque mortis dilatio est. Si secare autem malis, profluvij sanguinis periculum instat, statimque hominem perdi contingit. nam sanguinis è iecore profusio coerceri nullo modo potest. Igitur si aliquando necessario ad sectionem venire cogeris, vltorium ferramentum candens perspicuumque ab igne accipito, & vsque ad puris locum intrudito. idem enim tibi & secat & comburit. Quòd si homo periculum euadit, tum pus album effluet, concoctum, læue, olidum, quoniã crassum est. istis febres & acerbæ remittunt, omniaque facile mulcebuntur. Verum si in intestinum pus effunditur, ex aluo primum aquea feruntur, postea humori, in quo sint lotæ carnes, similia: item qualia in torminibus, vbi vlcerata intestina sunt, exire solent. interdum cruentum virus, interdum concretus sanguis effunditur. fertur & bilis flaua, syncera, aut porracea, & postrema interitum afferens nigra bilis. Si non suppurat vlcus, & mali odoris quædam veluti putredinem venter expellit; crudum alimentum præterfluit ob ventriculi intestinorumque intemperiem: neque enim bene se habens iecur iterum ea concoquit. postea ignis acer suboritur, omniaque in malum prolabantur. carnes colliquatione tabescunt, motus arteriarum parui sunt, & egra spiratio. vbi haud ita multo post vitæ finis imponitur. Ceterum quibusdam difficultas quidem intestinorum vlcusque sanata sunt, morbus tamē in aquam intercutem desijt. Quòd si omnia remittantur, pus album sit, læue, equale, inodorum: venter deijciat, & cibaria concoquat; homo in bona spe est. Optimum vero est

per lotium crifim fieri: hac enim fecurior est, minusque maleficus puris transitus. Verum si à phlegmone iecur non suppurat, nemini dubium fuerit, tumorem durum subsidientem in scirrhum mutari ac stabiliri: quando continuus dolor non infestat: cumque adest, obtusus intersque sentitur: rara verò et caliditas: à cibis alienatio, ab amaris delectatio, à dulcibus contristatio: horrore afficiuntur: subalbicant, virēt: lumbi ac pedes tument: facies corrugatur: venter squallet: deiectiones crebrę fiunt. malorum autem colophon aqua intercus. Post aquam intercutem si multa vrina & crassa feratur, multumque in ea limosi subsideat, & cum impetu erumpat, humorem illum intercutaneum effluere posse sperandum est: si tenuis autem, subsidentia carens, paucaque vrina exeat, aquam intercutem auget fouetque. Quòd si pristinas vires natura recipiat, & quandoque per ventrem cum impetu materiam deturbet; post multorum, crassorum, aquosorumque depulsionem & ipsum hydropicum morbum tollere consuevit. Verum id genus auxilij cum periculo est: post enim subitas & copiosas inanitiones, extremosque casus prostratis interdum viribus, quemadmodum in sanguinis profluvio accidere solet, egri interierunt. cum minori autem noxa morbum sudor, si liberalius effluat, dissolvit. Hydropici nanque haud ita multum in summa cute humectari solent. atque morborum iecoris hic finis est. Quando in iecore pus nascitur. * Adolescentes, & qui usque ad confidentem ætatem peruenierunt, his vexantur morbis: mulieres minus his patiendis expositę sunt. Huiusmodi vitiorum causę numerantur victus intemperantia, & longa valetudo. præsertim post difficultatem intestinorum, & colliquationes. quandoquidem & eos Syntecticos, idest, colliquatos nominarunt, qui post vlcera iecoris tabefacti moriuntur.

De Liene. Cap. XIII.

* aliter
dolore

Lieni familiaris longus morbus est, quem Scirrhum nominant. Purulentia verò haud ita facile, quandoque tamen efficitur: cum dolor non asper, tumor autem ingens spiratione maior exoritur. Siqui dem in dextram partem ad iecur usque tota communione increfcere visus est. vnde multi vt fallerentur in causa fuit: tanquam non lienis, sed membrana affecta esset. nam peritoneon, quod græci vocant, inflammatione occupari isti existimant. contumax autem atque indomitus instar lapidis tumor est. talis plerunque à Scirrho lienis efficitur: quando & ambiguitas difficultasque maxima simul adest. Verum si forte suppuret, tractabilis est utique: & in parte summa, vbi puris quoque creatio est, tactui cedit. quando verò pus non ducit, tactui omnino resistit. Porro nonnunquam scirrhus totus super ventrem suspensus est, in hanc,

- A** in hanc, atque in illam partem, prout impellitur, delabens: donec, pusillus cum sit, locum ad fluitandum habet. Adest nausea & anxietas: maxime cum instat eruptio. Incrementi autem notæ sunt febres, dolores, & horrores. multoties enim horrent: nonnunquam verò non horrent cum breui caliditate, & dolore vacāt. hac de causa interdum & in splene abscessus oriens latuit. rarum enim, & sensu carēs in sanitate quoque viscus est. Turgent isti, atque humoris, tanquam Hydropici, pleni sunt, atro colore viridi admixto suffusi, egre omnia patientes, pectore veluti pondere oppresso grauitè spirantes. euident enim malum est. vsq; ad superiora spiritu venter impletur crasso, caliginoso, humido quidem.
- B** ad speciem, cum tamen non sit humidus. tussis adest, multumque irritantur, sed pauca sicca extruduntur. Venter si quæ infra depellit aquosa, primò paulum subleuat, deinde si largius deijcit, hominem quidem tabefacit, sed nihilominus iuuat. At si & abscessus ruptus fuerit; pus utique purum & concoctum nunquam excernitur, sed subalbidum & cinereum, quandoque feculentum, aut liuidum. quòd si & profundior abscessus fuerit, nigra etiam fertur humiditas: quando & aliqua succi lienis, qui simul tabescit, particula exprimitur. Quibusdam præterea & integræ lienis partes exierunt: siquidem & natura dissolubilis lienis est. Cæterum si morbus vlcere non substitit, sed in longum tempus extrahitur; cibos auersantur, malo sunt habitu, tumidi, aspectu fœdi, multis vlceribus toto corpore, sed maximè in cruribus scatent. rotunda, liuida, concaua, sordida, egre sanabilia vlcera sunt. sicque demum tabefacti interiire. At in exiguo tumore cum duritia et renixu indolentia est. vnde fit, vt isti longiorem vitam ducant. Verum si ab affectu superentur, aqua intercus, aut phthisis necessariò sequitur: & corporis eliquatio superuenit. atque iste sanè perniciæ modus ipsos è vita migrare compellit. Pueri ac iuuenes faciliè calamitatem hanc patiuntur, facileq; inde liberantur: senes verò non faciliè utique leduntur, sed affecti euadere interitum nequeunt. Quinetiam seniores quidam nescientes ipsi
- D** vitio lienis absumpti sunt: nam & pusillus tumor ipsis causa interitus fuit. Longa quoque ægritudo tabidos facit: & iuuenibus ocium maximè nocet, quicunque à certaminibus exercitationibusque corpus quieti desidièque tradunt: loca palustria, aque exuberantes, salse, virose: inter anni tempora ferinus autumnus.

De Morbo regio. Cap. XV.

Sibile flaua, vitellina, aut crocina, aut nigra cum viridi mixta omne corpus à viscere suffusum sit; affectus hic à græcis Icterus, à lati-

nis Regius morbus, siue Arquatus, siue Aurigo dicitur. Difficile utiq; **E**
 in acutis malum est: quia non solum ante septimum apparens, sed etiā
 post septimum infinitos necauit. rarò autem ad extremum febrem be-
 ne iudicauit: ipse verò haud facillè discutitur. Neque vitio iecoris tantū-
 modo prouenit, ut nonnulli medicorum existimant: sed & ventricu-
 lus, & lienis, & renes, & laxum intestinum in causa sunt. & ab iecinore
 quidem nascitur, si phlegmone, aut scirrho viscus illud opprimitur, à
 solito tamen munere non impeditur. creatur enim in iecinore bilis,
 eamque in iecinore posita vesica fecernit. Verum si meatus ad intesti-
 num bilem deferentes phlegmone, aut scirrho interclusi fuerint, vesi-
 ca autem exundauerit, bilis retrò labitur. Cum sanguine igitur misce- **F**
 tur, qui per totum corpus discurrens, secumque bilem vehens in om-
 nia membra diffundit: atque ita corporis species bile tingitur. Stercora
 verò albida sunt & argillam referentia. neque enim bile colorantur,
 quoniam humoris eius affluxu carent. iccirco & vèter valde ficcus est:
 siquidem bile nec madet, neque stimulatur. color autem ad albedinem
 vergit. Si morbus regius ab liene ortum habeat, color est ater cum vi-
 ridi mixtus. ipsius enim atra bilis alimentum est: cum sanguinis atri ef-
 figies quædam ac simulacrum sit. cuius purgamenta non suscipit, neq;
 elaborat lienis ægrotans. inde fit ut per omne corpus cum sanguine di-
 labantur. Propterea lienis arquato laborantes cum viriditate quadam **G**
 nigricant. ipsorum quoque consueta stercore nigriore colore imbuta
 sunt. nam quod alimenti in splene abundat, ad vias exitus tanquā re-
 crementum propellitur. A' laxo etiam intestino & ventriculo arquatus
 prouenit. vbi concoquendi facultas in ventriculo & laxo intestino,
 quod græci Colon nominant, læsa fuerit. nam & in colo concoctio ef-
 ficitur, & ab ipso alimentum in iecur digeritur. Igitur si aliud alimen-
 tum crudius iecur susceperit, proprium quidem elaborat, & conficit,
 alienum verò dimittit. sanguis enim, qui distribuitur, coli cessationem
 atque inertiam retinens, in omnem partem labens eam disseminat. in
 colo autem cruditas ipsius bilis effectrix est. Hunc sanè in modum ab **H**
 omnibus visceribus arquatus oriri poterit, non modo ab ijs, quæ ieco-
 ri escam suggerunt, sed etiam ab ijs, quæ à iecore suscipiunt. Neq; enim
 per canales duntaxat sensiles, sed multo copiosius per halitus natura in
 omne corpus alimenta distribuit. qui à toto in totum natura ipsos per
 solidas ac densas partes dirigente discurrere facillè queunt. gignuntur
 itaque halitus bile infecti, & corpus, vbi infederint, colorant. Nempè
 per aluum laborante colo non fit albida excretio: iecur enim creandis
 succis nullam noxam patitur, exitumque bilis ad intestina patetem ha-

* Aliter
 albū cū
 viridi mi-
 xtum.

A bet. *Habitus quoque totius corporis ad morbum regium citandū sum moperere efficax est. habet enim & in toto causam, quæ huiusmodi est. In omnibus corporis partibus calor ad concoquendum insitus est: in oībus item humorum est creatio ac separatio. sed aliorum alia, singulis autem propria. vt puta in carne sudor, in oculis lachryma, in articulis & naribus mucus, in auribus Cypselis græcè dicta, Latini auriū Marmorata, seu Cerumina vocant. Itaq; si ad singula obeunda munera calidum fatigatum lassatumque fuerit, ipsum quidem in acre atq; igneū vertitur, humiditates autem omnes in bilem abeunt. ignis enim opera amara & bile infecta sunt. quod si & in sanguine cruditas incidat, sanguis biliosus efficitur, & quoquo versus nutriens dispergitur. Propterea & vbiq; bilis conspicitur. Planè acerbum id malum est, color vero specie horribilis. etenim colore aurum repræsentant: sed non hominem decet, quod in lapide pulchrum fuerit. At superuacuum mihi videtur, vnde id nomen Icterus tractum fuerit, explicare: præterquàm à terrestribus feris quadrupedibus; quas græci Ictidas, latini Vierras, aliqui Martes vocant. & Sylvestris mustellæ species est. his enim bestiis oculi huiuscemodi colore tincti sunt. Dux sunt huiusce labis species: aut enim in flauum croceumque vergit, simulq; albicat & virescit: aut in liuidum nigrumque declinat. atque adeo istorum causa & ipsius bilis causa est. Aliqua enim bilis flaua est subtilis, perspicua, tenuioris generis: aliqua magis colore saturata, vt crocum, aut vitellum eiusdem speciei quis affirmet. Secūda bilis species nigrioris coloris est, porri, aut isfatidis herbæ colorem referens, atra. inter hæc extrema infinitæ sunt colorum varietates. penes autem calorem atque humiditates istarum mutatio fit. Quin etiam viscera huiusce varietatis causæ sunt: vt puta si flauum viscus sit, quale iecur est: aut liuidū, qualis lienis. Quo circa si ab aliquo viscere arquatus oritur: à iecore quidem, iecoris notæ sunt: a liene, lienis: singulorumque, vnde oritur, membrorum indicia apparent. Si nullius membri signa videantur, vniuersi habitus ægritudo est. Perspicua verò sunt & ea, quæ in albissimis oculis cernuntur. Frontis autem secundum tempora, in corporibus naturaliter albis præcipuè, & in paruo arquato color exquisitior efflorescit. Porro quicumque nigro arquato laborant, in his ater color viridi commixtus apparet. iidem frigent: imbecilli, desides, tristes, atque demissi animo sunt. tetrum odorem exhalant: gustatum amarum habent: spiritus non facile ducunt: in ventriculo morsum percipiunt: alui excrementa porracia, subnigra, arida sunt, ægreque descendunt. vrina bene colorata est, ad nigrius vergens. ad hæc cruditate laborant, cibum detestantur, vigilant, moerent.*

melancholia agitantur. At in albiore arquato color est ex albo & vi- **B**
 ridi temperatus: mente sunt hilariores: cibos accipere primò eos piget;
 sed vbi coeperunt, nauiter comedunt: facilius, quàm priores, conco-
 quant: alui purgamenta alba sunt, arida, cretacea. lotium reddunt fla-
 uum, pallidum, crocinum. In vtrisque corpus omne pruriginosum
 est: calor in naribus exiguus quidem, sed mordax percipitur: nam bilio-
 sum distrahit laníatque: Gustatus amarorum quidē non amarus, quod
 mirum est, non tamen dulcis: dulcium verò amarus. in ore nanque bi-
 lis in lingua residens, & prius cibis occurrens sensum hūc ludificatur,
 ac decipit. Lingua enim bile suffusa cibos non sentit. atque antea qui-
 dem ieiunij tempore bilis quiescit: neque iccirco lingua propter consue- **F**
 tudinem egre fert: verum si cibis excitata bilis efferbuerit, ipsa cibis ob-
 iecta prius linguam mouet ac stimulat. Itaque siue amara sit esca, ama-
 ri sensus est, siue dulcis, biliosi perceptio. bilis enim sensio præuertit.
 Falluntur autem, qui amara videri dulcia existimāt. res enim haud ita
 se habet: sed quoniam membrum amaro aliquo delibutum duntaxat
 propter morbi consuetudinem amaritiem non percipit, ideo speciem
 dulcescentis representat. verum in dulcibus & amaris cibarijs idem sta-
 tus reperitur. fallacium igitur ciborum velamentum bilis est. Vtrique
 si nullius visceris calefactio euidentis fuerit, plerunque sine noxa ar-
 quatus est, sed diuturnior. si perseuerauerit, atque insuper viscus in- **G**
 flammatione vexatum fuerit; in aquam intercutem, & malum cor-
 poris habitum vt plurimum definit. Plerique & sine aqua intercute
 colliquati interiire. Id malum adolescentulis iuuenibusque familiare
 est: quibus & minus officit. Pueris autem, non admodum inusitatum,
 non omnino tamen innoxium est.

De Cachexia, siue malo corporis habitu. Cap. XVI.

OMnium simul vitiorum malus habitus conuersio est. Siquidem
 ab omnibus morbis propagatur & emanat. Verum & ipse so- **H**
 lus citra alios morbos materiam multam lutulentam nactus, à princi-
 pio noua ægritudo gignitur. Et habitus quidem malus simplex cōmu-
 nis est, & symptomata multa comitātur: nomenq; ipsum significanter
 inditū est. Gracilitas verò, aut pallor, aut tumor, et siquid aliud insit, ad
 tempus durans in corpore exoritur: Malus autem habitus vniū ingen-
 tis affectus species est. eique nomen tale fuit impositum. Nam homi-
 nis ad omnia bonus habitus est: & ad concoctionem, aut ad distribu-
 tionem sanguinis creatio, atque omnis naturæ functio inde prouenit.
 hæc consequitur facilis spiratio, valide vires, floridus color, sed pri-

Ama omnium sanitas. Quòd si ad imbecillitatem vitiosorum corporis humorum, quæ Cacochymia à græcis dicitur, natura conuersa fuerit; id iam malus habitus est, quem græci Cachexiam nominant. Valetudo hæc vix sanabilis est, malumq; longissimum. longo enim tempore acquiritur, neque ab vno corporis vitio, neque ab vno viscere prodiens. Sed omnium est in deterius conuersio. Quocirca ab hac enascentes morbi ineuitabiles sunt, vt puta aqua intercus, aut phthisis, aut eliquatio. Siquidem & mali habitus causæ colliquationis germanæ sunt. Morbus autem in multum tempus extrahitur: intestinorum difficultas adest continua: quibusdam morborum reuersiones eueniunt. bene vtique cibos appetunt, tametsi multos ingerant, ac repleantur: crudi verò, & non confecti digeruntur. quoniam alimenti elaboratio ad coctionem pertinens, debilis admodum atque inualida est. Labis huius causæ sunt & ab hæmorrhoidibus, quas vocant, venis effluuij suppressio, & vsitatorum vomituum retentio, & ab exercitationibus quies, & sudorum exiccatio, & ab ingentibus laboribus ocium. quando enim horum singula, quæ aderant, non amplius reuertuntur; tunc sequitur corporis grauitas, pallor subinde repetens, venter flatibus refertus, oculi concaui, somni graues torporem afferentes. Verū enim uerò hæc si erraticæ, & non statis temporibus fiant; morbi inconstantiam infirmitatemque significant. sin altius exactis radicibus maneant, neque desistere velint; ingentis mali nuncia sunt. Stantibus pedes tibiæque intumescunt, decumbentibus autem partes decliues atque iacentes. Quòd si decubitum mutauerint, tumor in illas decumbentes partes deuoluitur: humidique aut frigidi in grauitatem fit circuitus. nam si calor humidum euaporet, id verò non effundatur, postea delabetur. Multos vtique cibos appetunt, edaces admodum sunt: celerior concoctione distributio fit crudiorum magis, quàm inconcoctorum. nutritio non perficitur. Sed hoc inde prouenit, quoniam in toto alimentum à natura non concoquitur. in ventre enim atque in omni corpore caloris imbecillitas eadem est. quapropter neque optimus, neque boni coloris sanguis procreatur. cumque crudorum succorum omne corpus refertum fuerit, & ciborum appetentia euanescat; sic malo habitu vsque ad ventriculum grassante, & affectu iam summam potentiam obtinente, tunc sanè tumidi fiunt, imbecilli, & ad omne opus abiecto postratoque animo. Aluus sicciior est: plerunque recrementa bile priuata, alba, aspera, crudaque deijciunt: corpore squalent, sudore carentes & pruriginosi. somnus nequaquam firmus est, sed decumbentes conuiuent: tarde spiritum du-

cunt: arteriarum motus languidi sunt, debiles, frequentes: post quā- **E**
libet autem vel exiguam actionem frequentissimi fiunt. Post hæc re-
spiratio cum anhelitu fit: venæ in temporibus elatæ apparent: partes
enim, quæ circumiacent, emacruerunt: verum & in brachialibus
longe grandiores inflatione venæ redditæ sunt: sanguis atro colore
viridi admixto infectus est. Ab his phthisis, aut colliquatio hydro-
dem anasarca vocatam, aut ascitem adducit: istorumque procreatio
inevitabilis est. Aetates huius morbi feraces sunt in primis senectus,
neque mortem euadunt. Pueri & celeriter pati idonei sunt, & libe-
rantur facilius. Florentes ætate haud ita valde huic malo patent,
non tamen penitus facile sanantur. Tempus anni non **F**
vnum hanc fert egritudinem, neq; vno tempore fini-
tur: verum autumnus concipit, hyems alit,
ver ad vltimam vehementiam per-
ducit, æstas verò
interficit.

ARETAEI CAPPADOCIS

DE SIGNIS ET CAUSIS

DIUTURNORVM MORBORVM.

Liber Secundus.

Iunio Paulo Crasso Patauino Interprete.

Hæc insunt in hoc libro.

De Hydrope.	Cap. I.
De Diabete.	Cap. II.
De Affectibus renum.	Cap. III.
De Vitijs vesicæ.	Cap. IIII.
De Seminis effluuio.	Cap. V.
De Stomachi vitijs.	Cap. VI.
De Ventris affectu.	Cap. VII.
De Dolore intestini coli.	Cap. VIII.
De Difficultate intestinorum.	Cap. IX.
De Leuitate intestinorum.	Cap. X.
De Affectibus vteri.	Cap. XI.
De Articulorum et coxendicis modis.	Cap. XII.
De Elephantiasi.	Cap. XIII.

De Hydrope, hoc est, Aqua inter cutem. Cap. I.

A



Qua inter cutem, quam Græci Hydropa vocant, iniucundum aspectu vitium est, & toleratu difficile. ab ipso enim perpauci liberantur: idque foelicitate quadam, ac Deorum potius, quàm artis auxilio. Maiora enim omnia vitia soli Dij medicantur. Nam aut in viscere primario morbus delitescens totum in malum habitum conuertit, aut omne corpus ingruente pestilentia in malum succum viscera permutauit. quando sibi vtraque vicissim ad perniciem suffragantur: nullaque est pars noxa carens, quæ vel modicam naturæ opem asserre possit. Est autem ad humectationem fluctio frigida, crassa, qualis est nebula vniuerso: aut conuersio ab humida & frigida causa in talem habitum hominem permutante. Neque enim in inferiori ventre fluctuans humidum Hydropa nuncupamus: quandoquidem neque ibi vitium est: sed cum

A R E T A E I

morbum consequitur tumor, inflatio, coloris foeditas; iste in aqua ha- **E**
 bitus colliquescent hydrops & est, & appellatur. Nam tametsi nonnun-
 quam foras sponte aqua prorumpit, aut aliquis præcordia rescindens ef-
 fundit; adhuc in sede sua permanent hydropici. Princeps itaque causa
 malus habitus est, species autem plures. verum & eius nomen aliud, atq;
 aliud. nam si sit humida suffusio, quæ in ilibus fluitet, & præ inflatio-
 ne, cum verberantur, tympanum quodammodo referant; Tympanias
 nominatur: at si aqua copiosa in peritoneo continetur, natantq; in hu-
 more intestina; Ascitem eam cognominarunt. si autem ilia nihil isto-
 rum habeant, sed omne corpus intumescat, si ex alba pituita crassa, &
 frigida; Phlegmatias ei nomen est: si in humorem sanguineum, aquo- **F**
 sum, tenuem, carnes liquatae fuerint, Hydrops anasarca generatur. pra-
 ua quidem est harum singularum constitutio, peior autem multo ip-
 sarum permixtio. Nam earum, quæ in ilibus fiunt, una vni earum, quæ
 totum corpus inflant, sociari nonnunquam consuevit. Difficillimus est
 autem tympanias cum anasarca vocato copulatus. Ex occupantibus
 enim ilia tympanias ascite improbior est: ex infestantibus verò totum
 corpus leuco phlegmatias, quam anasarca benignior. Mitis quidem ut
 in desperatis morbus est, si minor species cum minori pariter coniun-
 gatur: peior verò, si aliqua ex minoribus cum altera ex maioribus admi-
 sceatur. Quod si duarum maiorum mixtio exactè facta fuerit, grauius **G**
 inde malum exoritur. Notæ autem maxime sunt, & visu, & tactu, &
 auditu facillime. In ascite nanque in ilibus tumorem, in pedibus infla-
 tionem videre licet: facies, brachia, & reliqua gracilia cernuntur, intu-
 mescent testes, præputium, & totus colis ob inequalitatem tumoris tor-
 tuosus est. tangito verò, & aliquam in partem manum imprimens in-
 trò moderate pellito. ad alias enim partes humiditas transluet. Verum
 etiam in corporis ad alterutrum latus conversionibus humor in locum
 decliuem & tumorem & fluctuationem facit, fluctuantisque liquoris
 sonitus exauditur. quinetiam sicubi digitum impeggeris, locus cauus ef-
 ficitur, & multum temporis cauus perseverat. Hæc utique ascitem si- **H**
 gna declarant. Tympanias autem ultra tumoris spectaculum, etiam au-
 ditu sonorus est. nam ad palmæ percussum abdomen sonum edit: neq;
 ad corporis conuersionem spiritus locum mutat. & si enim locus am-
 biens aliquorsum inclinat, spiritus tamen equalis supra & infra ubique
 permanet. Ceterum si in nebulam & aquam spiritus vertatur, (nam
 ascites ex tympania gignitur) si non perfectè mutatus aliquando fue-
 rit, ex dimidio factus in ventre fluitat. Cæterum anasarca & leuco
 phlegmatias ilia inania occupant: tumidam faciem & brachia reddunt
 & quæcunque in alijs vacua sunt, in huiusmodi ægrotis opplentur.
 Quandoquidem

- A** Quandoquidem in leucophlegmatia alba pituita, frigida, & craffa redundat: hac omne corpus impletur: facies, collum, brachiaque tumescunt: abdomenq; ex inflatione crascescit. mammae quoque in tumorem excitantur illis scilicet, qui iuuenes robusti in etatis prospera fortuna consistunt. At in hydrope anasarca vocato carnis liquamentum fit in succum speciem carnis referentem: saniesque cruenta, qualis ab intestinorum vlceribus emanat. talis verò & à membris aliquo graui, quod superinciderit, contusis, si paulum superficiem secueris, humor effunditur. Ex duabus quidem speciebus permixtio ambarum indicia obtinebit. Omnibus verò simul inest pallor, spirationis difficultas, tussis. diuersis temporibus segnes sunt: pigritia multa, à cibo alienatio. quòd si aliquid assumant quanuis modicum, & flatu carens; nihilominus valde inflantur: distentiones patiuntur, quales ex saturitate fiunt. citra madorem eorum corpus est: iccirco neque in balneis sudore madescent. præterea albidi sunt, & effoeminati. Anasarca laborantes colore ex atro, viridique permixto infecti sunt: obscurasque & nigras venas habent: In ascite atque tympania conspicuae, atque admodum euidenter sunt in brachialibus atque in abdomine. In anasarca verò atq; phlegmatia tumore omnia delitescunt: somni sunt graues, torpentes, breues: animæ deliquium, circa minima queq; sollicitudo, viuendi cupiditas. tolerantia non ex animi alacritate, ac bona spe, vt in ijs est, qui prospera fortuna vtuntur: sed ex ipsa morbi natura. neq; causa dici potest, sed mirari tantum id licet, quod me hercule magnum est. nanque in alijs haud omnino perniciosis affectibus ægrotantes abiecto sunt animo, tristes, mortis amatores; in his verò & bene sperant, & vitæ cupidi sunt. Ambo hæc contraria morbi efficiunt. Aqua inter cutem nonnunquam à copioso frigida potu continuo provenit, cum præ nimia siti ad saturitatem quispiam multam aquam gelidam ingurgitauerit; postea humidum in peritonæum delatum sit, atque inde in ventribus insitus calor refrigeratus fuerit. deinde in ilia guttae effluunt, quæ prius in aerem versæ per transpirationem digerebantur. Id igitur si incidit, facilius est huius morbi curatio, antequam viscus aliquod, aut totus homo affectus sit. Cæterum & ventosus cibus, & cruditas, & buprestes aquam inter cutem pepererunt. Est hæc omnibus communis calamitas viris, mulieribus, cuicunque ætati; præterquam quòd alij in aliâ speciem sunt propensiores. In vocatam anasarcam, & leucophlegmatiam pueri: Iuuenes autem ad consistentem usq; ætatem inundationi ilium obnoxij sunt. At senes omnibus quidem generibus sunt expositi, cum inopes sint caloris: frigida enim senectus est. verum ad humoris multitudinem contrahendam apti non sunt, ipsis igitur tympanias accide-

re consuevit. Omnes quidem species prauæ: hydrops enim morborum **E**
 omnium vitium est: Sed inter ipsas leucophlegmatias mitior habetur:
 nam multæ, & variæ sunt eius tollendæ prosperæ occasiones, sudoris,
 aut lotij excretionem, aut alui nonnunquam in huiusmodi ægrotantibus
 copioso effluuio, iam abeunte aquæ inter cutem habitu. Difficilis autē
 tympanias est; adhuc tympania difficilior anasarca. Oportet enim
 medicum hoc in morbo totū hominem permutare. Quod per Iouem
 neque Dijs ipsis facile fuerit. Nonnunquam & exigua in parte homo
 aquam inter cutem patitur: vt secundū caput in eo morbo, qui Hydro
 cephalus nuncupatur, aut in pulmone solo, aut iecinore, aut liene, aut
 in mulierum vtero. & ceteris hæc species sanabilior. Nam si eius ostio- **F**
 lum à priori conclusione hiare cœperit; humorem quidem si habeat,
 effundit; si spiritum, efflat. quod si vterus anasarca labore, plurimū
 tota mulier aquam inter cutem patitur. Alia quædam hydropici mor
 bi species talis agnoscitur: in ea vesiculæ quædam pusillæ, crebræ, hu
 moris plenæ in loco, vbi Ascites fieri solet, excitantur. Cæterum, quod
 humore multo refertæ sint; illud indicio est, si abdomen perforaueris,
 parum admodum humoris effundes. Ab interiori nanque parte vesica
 occlusit: at si in vesicam instrumentum impuleris, iterum succus ema
 nabit. Hæc utique aquæ inter cutem species haud levis est: vnde enim
 id genus vesiculæ eruperint, via haud facilè reperitur. Alij nanque affir- **G**
 mant huiusmodi ampullas per intestina transisse. Ego verò id nunquā
 vidi: iccirco, neque non scribendo affirmo. nam siue ex intestino colo,
 siue ex ventre ferantur; qualis sit ipsarum generationis modus, quid di
 cam nihil certi habeo. iter enim ad omnium excretionē per sedem lu
 bricum, ac patens est. at ipsius humoris in ilibus collecti per intestino
 rum rupturam egressio credi non potest: neque enim innoxium, neq;
 citra perniciem intestini vulnus est.

De Diabete, siue vrinæ profluuiio.

Cap. II.

Diabetes qui vocatur affectus, miraculum quoddam est, haud ita **H**
 sæpe hominibus vsitatus, carniū, ac membrorum in vrinam
 colliquatio. Frigida atq; humida, vt in aqua inter cutem, causa est. Trā
 situs autem consuetus renes & vesica. Neque enim cum intermissione
 lotium reddunt: sed perinde atq; canales laxati sint, indefinens est pro
 fusio. Diuturna est huius morbi creatio, & longo tempore parturit. **B**
 Brevis erit autem hominis vita, in quo affectus iste perfectus fuerit: ve
 lox enim est colliquatio, & festina interdum mors aduenit, & vita fœ
 da est, ac vexata doloribus. Sitis intoleranda est, potus copiosus, multi
 tudini tamen lotij non respondens. copiosius enim lotium redditur:

- A** neque eos quisquam neque à potu, neq; à mictu inhibere potest. Quòd si vel punctum temporis inhibeatur; si quidem à potu, os ficcatur, corpus arefcit, viscera ipsi sua conflagrare opinantur, omnia fastidiunt, de omnibus dubitant, haud multo post mortem obeunt, ardentissima fitis adest. Mictum verò quæ ratio suppresserit. aut quæ verecundia dolore potetior? Sin autem vel parum temporis à meiando abstinuerint, intumescunt lumbi, testes & ilia: cumque remiserint, lotium quidem calefactione profundunt, tumidæ verò partes detumescunt: in vesicam enim confluit exundatio. Cùm morbus iste iam perfectus est, facile omnes eum depræhendunt. Sed cùm futurus est, os humore priuatur: salua est albida, spumans, perinde atque in siti: nondum tamen sitiunt. præcordia graua sunt: calorem, aut frigus à ventre in vesicam tendere sentiunt, prout aduentantis morbi processus est. quinetiam paulò plus lotij, quàm moris erat, effunditur. fitis adest, sed nondum vehemens. Cumque amplius clementū accipit, calefactio parua quidem, sed mordax visceribus inhærens exoritur. abdomen habent rugosum, venas extantes, totum corporis habitum gracilem, quando & vrinæ profluvium, & fitis iam aucte insigniter sunt. cumque ad extremum colem vitij consensus peruenerit, protinus vrinam reddunt: atque inde mihi huic morbo Diabetes appellatio indita fuisse videtur, perinde ac si pertranseuntem dixeris, quòd in corpore humor non remanet: Sed vbi-
C cunque in homine collectus stagnauerit, ad exitum labitur. Durant sane aliquod tempus, licet non admodum diu: nam cum dolore meiunt, atque atrox fit liquefactio. neque enim ex potu aliqua insignis portio in corpus absumitur, & carniū magna copia in vrinam eliquatur. Huiusce languoris causa aliquis acutus morbus esse potest, qui hanc in partem impetum fecerit, & in crisi aliquod malignū virus latenter morbi reliquerūt. Haud incredibile est etiam aliquod perniciosum venenū ex his, quæ vesicam & renes infestant, huic affectui causam præbuisse. Quinetiā si quis à Dipśade morsus sit, talis morsum affectus sequitur.
D Dipśas autem reptilis fera si quem percusserit, sitim non ferendam accendit, isque copiose bibit; neque siti medetur, sed ventrem obruit humore: adeo inexplibilis est bibendi cupiditas. At si quis ob ventris distentionem doleat, graueturque humoris copia, & ideo paulum temporis à potu abstineat; iterum sitiens largissime bibit. Atq; hæc est malorum vicissitudo: se nanque mutuò fitis & potus adiuuant. Alij præterea sunt, qui lotium non reddunt: neque vlla est alia eius, quod bibunt, transpiratio. itaq; potius insatiabili auuiditate, humoris inundatione, ventris distentione, repente ac penitus disrupti sunt.

Renes substantia glandulas, quas græci Adenas vocant, referunt. colore autem rubidiores sunt, quale est iecur potius, quàm mē, aut testes. nam & hi adenes sunt, verum albiores. Figura testibus similes, lati magis sunt, iuxta & retorti. Sinus habent exiguos ad lotium excolandum cribrorum instar foraminibus peruios. Ex utroque nervosi canaliculi tanquam fistulæ expullulant, qui in vesicæ terga utrinque sese inferunt. æqualis est autem lotij à renibus in vesicam via. Huiusce viæ multi atque varij affectus renes, prædictosque meatus male habet: aliqui acuti sanguinis profluuium, & febribus, & inflammationibus iugulantes; hi vero sunt, quotquot ego enumeraui: aliqui diuturni hominem colliquatione dissoluentes, haud lætales quidem, sed insanabiles, & una cum ægroto commorientes. Diuturni itaque sunt abscessus, ulcera, calculorum exortus, hæmorrhoides vocatæ. Ulcera quidem hominis ex abscessu facta omnia planè diuturnissima sunt, atque ægre sanationem recipientia. Calculorum verò diuturna est creatio, cum dolore obstructiones: haud enim facillimus est exitus. ad hæc difficilis est & lotij suppressio. At si multi sint, & exigui calculi, sese mutuò impediētes, remorantur: aut si vnus sit magnus, locorum angustijs intrusus inhærescit. Atque si utroque in rene hæc fieri usu veniat, interclusa vrina, distentisque locis, paucis diebus superstites ægri moriuntur. Rectè sanè natura renum ventrem oblongum, & vrinæ canalibus magnitudine equalem fabricauit, exiguis quidem calculis ampliorem, quò superius concretus calculus expeditissimum in vesicam iter inueniat. atque ideo lapilli oblongi generantur. Plerumque enim propè vrinæ fistulas id genus lapilli concrescunt: & quotquot eo loco fiunt, inæqualis crassitudinis sunt. priori in parte ob canalium angustiam gracilescent, posteriori autem crassiores fiunt: quoniam renes deorsum vergunt. in solis autem renibus oriuntur, hisque igneo calore feruentibus. neque enim sedem in fistulis vrinæ calculi obtinent, sed arenulæ cum lotio per eas fistulas inferius delabuntur, quæ & indicia & materia huiusce affectus sunt. Quòd si aliquando grandior effectus lapis concauo renis inhæserit, tunc dolores lumborum circa musculos, quos Psoas Græci appellant, excitantur, & ad medias vsque costas perueniunt. Multis sanè dolor iste, perinde ac si morbi lateralis esset, imposuit. præterea grauitas adest coxendicis: dorsum ægre incuruatur: difficulter annuunt: tormina dolores inferunt grauia, perseuerantia: intestinum enim sinuosum est. cumque exundat vrina, & distentiones increscunt, ad meiendum, ut in parturiginibus, proritantur: flatuosi sunt, sed flatus excerni ne-

- A** queūt. febres adsunt mordaces, præaride. squalida quidem lingua, sicca verò est aluus. macrescunt. à cibo abhorrent: quòd si quid assumant, neque concoquere, neque distribuere facile possunt. Sin autem in lotij canaliculum lapis inciderit, concussio corporis fit, vt in rigore. calculi progressus sentitur † còmunì simul violento. } Quòd si in vesicam delapsus fuerit, lotium aquosum vberius effunditur: aluus deijcit: flatus inde exhalant: extentus stomachus est: ructus eduntur: à prioribus malis quies datur. interdum quoque vlcerato canali præter lotium cruor emanat. Secunda porrò calamitas est, cùm per colem calculus transmittitur. Nam si amplior sit, quàm vrinæ iter, (Græci Vrethram vocant,) capere possit, in eo multum temporis hësitat, atque vesica multitudi-
B ne vrinæ completur: tumque eius maiore cum dolore suppressio fit. nã cum vesica & canales vretes vocati veluti incenduntur. Aegerrime autem tortuosi calculi exeunt: quosdam enim & hamatos vidi, in meatibusque adnatas quasdam callosas duritias. Plerunque autem oblongi propter canalium rectitudinem figurantur. At colore nonnulli albicant argillam referentes, talesque sæpius in pueris generantur: alij flauì sunt instar croci, hi verò in senibus reperiuntur, quibus & in renibus creari solent: crebrius enim pueris in vesica lapilli oboriuntur. Concretionis autem causæ geminæ sunt: In senibus frigidum corpus, & crassus sanguis. frigidum verò crassas materias celerius cogit. indicio sunt aquarum natura calidarum fontes: hæ nanque refrigeratæ in tophaceum lapidē condensantur. At in pueris multum sanguinis limum elixatum generandi calculi veluti sedem ignis habet. Igitur in calculi creatione talis est affectio. Cæterum nonnulli sunt, qui per quosdam circuitus sanguinem meiunt, huiusmodi affectus hæmorrhoidum profluuiò similis est, similis est quoque corporis constitutio. nam valde pallescunt, torpent, ignaui sunt, cibum fastidiunt, cruditate laborant: & cùm excretus est sanguis, languidi fiunt, membra resoluuntur, caput verò leuius & agilius redditur. At si per circuitum nihil sanguinis effluerit, capitis dolore vexantur, oculorum acies hebet, tenebræ eis obuersantur, vertiginem patiuntur. Inde alij infiniti in comitiales morbum incidunt, tumidi, veluti caligine perfusi, aquam inter cutem patientibus similes: alij morbo atræ bilis, aut neruorum resolutione tentantur. Nam ex còsueti profluuij sanguinis retentione huiusmodi mala proueniunt. Si quidem à renibus defluat sanguis mundus, lotio non permixtus, plerunque tamen cum vesicæ vrina confusus emanat. Nonnunquam & ex renum disruptione sanguis fertur multus collectim. verum cogitur, & in grummos densatur: vtque in sanguine extra corpus effuso fieri assolet, interdum vtique & in vesica congelatur: quando atrociter

† Hec verba abunde dant viam dentur.

vrina supprimitur. Ruptionem verò vlcera diuturna, atque vix sanabilia sequuntur. indicia sunt ramentum, aut membranula araneæ instar rubida egrediens; aut pus album meiendo profusum, modo purum & sincerum, modo cum vrina permixtum. Ab iisdem & abscessus dignoscendi sunt, si vesperi febres accesserint & rigores: dolores circa lumbos, & pruritus. At si ruptus fuerit, grummi purulenti carnisque formam repræsentantes eijciuntur: quin etiam & albida sanies excernitur. Vlcers verò mordacia sunt, modo repurgata, modo sordentia: id pus manifestat: vrina quoque aut olida, aut nihil olens. Ver sanguinis profluvia & abscessus parit: hyems autem, autumnusque calculos. Quòd si à calculis vlcera facta sint, insanabiles inde morbi nascuntur, cito colliquatio, morsque adueniunt. E
F

De Vesicæ affectibus. Cap. III.

Vesicæ morborum nullus placidus est. quippe acuti inflammatione, vulneribus, conuulsione, febribusque acutis interficiunt. Vlcus verò & abscessus, aut resolutio, aut lapis magnus tolli nequit: neque enim potione, aut medicamento frangitur, aut circumteritur; neque præter noxam exciditur. opus est enim & tenues vesicæ partes simul cedere. id verò aut eodem die hominem perdit, aut paucis diebus conuulsionibus, febribusque consumit. Nisi excidatur autem præter G vrinæ conclusionem doloribus, febribusque, aut liquationibus homo contabescit. sin haud ita magnus sit calculus, frequentius lotium cohibetur: nam facilè in ceruicem delapsus lotij transitum obstruit. securius autem quàm grandiores exciditur, sed vesica quoque necessario sauciatur. cumque mortis periculum euaserint, in fistulam Græci Rhœada vocant, prolabuntur. quod licet periculo vacet, ingenuis tamen hominibus non est tolerandum, perpetuum scilicet vrinæ profluum, siue quis ambulet, siue dormiat, ambulantis verò maximè iniucundum. Valde parui autem plerunque citra noxam exciduntur. Quòd si vesicæ inhaerit calculus, ex colliquationibus patefiet: sed neque dolorum, neque H grauitatis expertes sunt, licet vrinam expeditè reddant; sin minus, & vrinæ difficultas accedet. Omnes verò calculos ex fabulosis vrinæ subfidentijs depræhendes: & quòd istis virilia sæpius arriguntur. quando enim meiunt, subestque calculus, dolent, tractant, attrahuntque pudenda, tanquam calculum cum vesica exempturi. Anus quoque vitij particeps redditur pruritu laborans. Prominet verò et rectum intestinum vi, contentione, imaginatione perinde, ac si iam lapis excernatur. Ambo enim inter se copulantur anus & vesica: quorum vno affecto, & alterum afficiatur necesse est. propterea inflammato podice vrinæ

A exitus clauditur:& vesica exacerbata sedes non deijcit, licet aluus admodum sicca non sit. Tales utique sunt ex calculis labores. At sanguinis effluuium tametsi non admodum cito enecet, tempore tamē procedente infinitos iugulauit. Ab eo verò grummi creantur, lotij suppressio,& matura mors non secus, atq; à calculis fieri compertum est. quanuis enim sanguis tenuis flauusque est, neque valde crassus, neque concretus; vesica tamen longo tempore congregat, ac eadem calefaciens & elixans cogit conspissatq; atque ita grummus efficitur, & vrinae interclusio, quam græci Ischuriam vocant, inferendæ morti potentissima. His accedit dolor acutus, ignis acer, lingua arida & ab his delirantes moriuntur. Sin autem à vulnere dolor excitetur; vulnus utique mortiferum est: vlcus verò & si nō protinus interficit, febribus tamen, aut inflammatione insanabile redditur. Tenuis quidem est crassitudine vesica, neruus autem substantia. quocirca neque carnem contrahit, neque facilè ad cicatricem ducitur. Accedit & vrina biliosa, acris, mordax vlceris, communis victus. Vesica enim cūm repletur, distenditur: cūm inanis est, subsidit. in extensione igitur & contractione eundem, quem & articulus, affectum patitur. In articulo verò nullum vlcus benè sanescit: suppurationem autem ex abscessu contrahit. Vesicæ signa eadem sunt, quæ & in alijs membris inflammatis: Nam etsi febribus rigoribusque succedat abscessus, eadem pericula impendent. Verū si pus crassum, album, non tetri odoris eijciat; ab his orta vlcera benigna sunt. At si depascantur, feculentam, mucidam, graueolentem vrinam reddunt. Huiusmodi ægrotantibus non tarda mors aduenit. Mordax quidem vrina est, & cum dolore est eius emissio: Ad summum vsque colem dolor peruenit. Ipsos utique omnia etiam contraria lædunt, & saturitas, & inanitio, & otium, & exercitatio, & lauatio, & illuuiæ, & saturitas, & ieiunitas, & dulcia, & acida: cūm alia alios lædant, alios iuuent, in vnum autem conuenire non possint.

D De Seminis profluuiō. Cap. V.

MOrtis quidem periculo vacat Genituræ profluuium, iniucundum tamen est, & vel auditu insuaue. Nam si intemperies & resolutio humida occupat, genitaliaque membra, (ut à frigidis contingere solet,) profluit semen: neque ipsum vel insomnis cohibere possumus. verū seu quis dormiat, seu vigilet, continens profusio est. neque id, quod fit, sensu percipitur. Aegrotant quoque & tali morbo mulieres, sed partibus illis prurientibus, & cum voluptate nonnullis genitura profunditur: quinetiam virilem coitum impudenter appetunt. Viri autem nequaquam pruriunt: nam quod effluit, humidum, tenue, frigi-

dumque est, sine colore, infœcundum. Quî enim genitale semen refri- E
 gerata natura emisit? Quòd si iuuenes hoc vitio laborent, omnes fe-
 nilem corporis habitum induant necesse est: quippe qui segnes fiant, re-
 soluti, exanimes, torpentes, hebetes, imbecilli, recurui, ignaui, pallen-
 tes, albidî, effœminati, à cibis abhorrentes, frigidi, membris graues &
 stupidi, cruribus impotentes, & ad omnia remissi & languidi. Multis
 sanè id genus ægrotatio ad neruorum resolutionem (Paralyfim græci
 vocant) viam strauit. Quomodo enim neruorum facultas non afficia-
 tur, cum natura ad vitæ generationem faciens refrigerata sit? Atqui &
 genitura vitalitatem impartiens nos viros efficit, calidos, articulatos,
 hirsutos, vocales, animosos, ad intelligendum operandumque valen- F
 tes: id viri testantur. Contrà verò quibus non inest vitalis genitura, ru-
 gosi sunt, debiles, acutæ vocis, glabri, imberbes, effœminati: eunuchi id
 manifestant. Siquis autem vir & seminis profundendi abstinens fuerit,
 robustus est, audax, neque vel feras expauescens: testimonio sunt ex
 athletis temperantes. Nam & illi, qui natura quibusdam præstant, ob
 intemperantiam deterioribus multo peiores fiunt: contrà natura dete-
 riores ex temperantia præstantioribus longè meliores euadunt. Neq;
 sanè ab alio quopiam, quàm à genitura robustum animal generatur.
 Vitalis itaq; genitura ad sanitatem, ad robur, ad animi fortitudinem,
 & ad generandum mirificè confert. A Satyriasi in feminis profluuium G
 corporis status deuoluitur.

De Stomachi affectibus.

Cap. VI.

S Tomachus delectationis, tristitiæque princeps est, cordi periculo-
 sa vicinia, ad tenorem, animiq; alacritatem, siue abiectiōem ob
 animæ consensum præcipue stomachi facultas confert. Hæc mihi alio
 loco dicta sunt. Delectationis quidem hi fructus sunt, bona concoctio,
 carnis conueniens incrementum, floridus corporis color. Tristitiæ ve-
 rò istorum cōtraria. nonnunquam & animi abiectiōem cum alimen- H
 to caret inducit, atra bile vexatur, cibum refugit. Cum itaque stoma-
 chus ægrotat; escas odit, & abominatur, non modo cum offeruntur,
 verum etiam si non in conspectum dentur, sed eas memoria repetant,
 aut anxietate, aut madore stomachi, aut eius ostioli dolore perciti. &
 saliuam effundunt quidam, & vomitibus lancinantur, corpusq; simul
 ab his vexatur. Quòd si ventriculus istorum vacuus est; dolorē, quàm
 cibi sumptionem, facilius tolerat. Sin autem interdum ad alimentum
 capiendum accedere cogitur, id multo peius est. Labor quidem famis
 est, ore cōterere, in deuorando dolor, & maior conflictatio. Ceterum
 non erga ysitata quidem ita se habet, erga aliena verò optimè; sed que
 naturaliter

- A** naturaliter habent, in contrarium mutata sunt: & omnia grauatim ferre: fugaque adest, & odium alimentorum. In interscapulis præterea dolor inheret: sed longè maior si edant, deuorentque. fastidiunt: animi pendunt: visus hebetatur: aures sonant: caput grauatur: membra torpent: crura, brachiaque resoluuntur: palpitant præcordia: dorsum imaginantur versus crura moueri: aliàs aliò, huc atque illuc sese ferri existimant, seu stent, seu iaceant: quæadmodum à ventorū flatu harūdines, aut arbores agitantur: pituitam frigidam, aqueam reijciunt. Quando verò & in biliosis redundat bilis; istorum oculi tenebris caligant: siticulosi non sunt, etsi à cibis sitire videntur: vigilant; tardi sunt: dormitant non
- B** vero tamen somno: ijs, qui sopore graui (Coma græci appellant) occupantur, similia patiuntur, macie confecti, valde pallentes, debiles, resoluti, animæ deliquium patientes, animo consternati, meticulosi, quæti, repente tamen irascentes, valde melancholici: nonnunquam enim in atram bilem, quam Melancholiam græci nuncupant, id genus ægrotautes inciderunt. Talem utique stomacho impartiente animæ affectum esse oportet. Verum homines compatibilium membrorum ignari, in quibus hæc grauissima vitia fiunt, stomachum esse causam opinantur. magnum autem ad ea, quæ dico, probanda testimonium cordis contiguitas est, vbi omnium principatus collocatur. in medio enim pulmone cor sedet: horum autem medium stomachum coniungit: ambo verò dorso inserta sunt. propter hanc itaque cordis viciniam & dolor ille excitatur, quem Cardialgiam græci nominant, & resolutio, & morbi melancholici. Nempe morbi causæ & aliæ sunt plurimæ: præcipua verò pus multum à ventre per stomachum effusum. Familiare est etiam id vitium illis, qui tenui victu, & durior coacti sunt uti: quinetiā illis, qui, ut erudiantur, laborant, & eius causa multa perferunt. quibus inest diuinæ scientiæ cupiditas: qui cibi parsimonia, & vigilijs macerantur: qui doctos sermones, & res graues meditantur: qui victum pleniorē & varium contemnunt: sed famem pro alimentis habent, pro potu aquam, & in somnis vigilant: quibus molle cubile est nuda humus, stragula vestis ignobilis, tunica lacera: ipsorum verò tectum est communis aer: diuitiæ autem adeptio, atque vsus diuinæ sapientiæ. Hæc utique ipsis eruditionis amore bona comparantur. Cumque cibum, & illum quidem ignobilem accipiunt; id vitæ tantum, non salutaris famis, neque potum vini causa assumunt. non eos abstrahit voluptas, non vagatio & peregrinatio, non corporum exercitatio, nec carnum circumpositio. à quo enim disciplinæ amor non auocet? à patria, à parentibus, à fratribus, à se ipsis usque ad mortem. His igitur corporis macies adest, decolor facies, & in iuuenta senescunt: & ob cōtemplationem stu-

pidi habentur . animo autem seueri, non ridētes, immites sunt . Atqui **E**
 ob stomachum erga cibos male affectum citò satiantur cibo vſitato, vi
 li & ad manum. varijs autem dapibus non sunt assueti , & erga omnes
 cibos pigri sunt. quòd si aliquem inuſitatum cibum acceperint, lædun-
 tur, omnes alios protinus auerſantes. Iſte eſt ſtomachi longus morbus.
 Inflammationes verò, deſtillationes, oris ventriculi morſus, (Cardiog-
 mon græci vocant) aut dolor, ſtomachalis affectus non dicitur. Hunc
 morbum æſtas affert: quando & concoctionis, & appetitus, & omniū
 eſt impotentia: Inter ætates verò ſenectà, quibus & abſq; morbo ob vi-
 tæ finem & appetentia ad extremum peruenit.

De Affectu ventriculi. **Cap. VII.** **F**

Ventriculus concoctioni deſtinatum viſcus in concoquendo la-
 borat, cū alui profluuium, quem græci Diarrhæā vocant, ho-
 minem premit. & eſt liquidi alimenti inconcocti profluuium: niſi à re-
 centi & proxima cauſa vnum aut alterum tantum diem permanente
 oriatur. præterea & totus homo debilis redditur, quia corpus non ali-
 tur, vnde lōgus morbus, Coeliacum quem vocant, efficitur, latinè ven-
 tricularis dici poteſt, ob concoquentis caloris. imbecillitatem, frigusq;
 ventriculi: cū liqueſcit quidem à calore alimentum, ſed non conco-
 quit calor, neque in ſuccum proprium vertit, ſemicoctum imperfectū **G**
 que relinquens, cū perfectionem aſſequi non poſſit. id verò conco-
 ctione deſtitutum ad prauum commutatur & colore & odore & cōſi-
 ſtentia. albus eſt enim bilē priuatus color: olida excernuntur, & lutu-
 lenta; liquida & inconfiſtens ob proſtigatam actionem ſubſtantia eſt,
 virtutem modo atque principium coctionis præſeferens . Hac de cau-
 ſa venter flatuoſus eſt, ructus aſſidui, tetri odoris. Quòd ſi deorſum pe-
 netrent; ſtrident inteſtina; flatus erūpunt aſperi, humidi, argilloſi. vide-
 tur autem ipsis tanquam humidum quoddam effluere . Dolor ventri-
 culi grauis eſt, aut ſubinde punctiones referens. gracilis verò, & ema-
 ciatus homo redditur, pallidus, iners, nihil ex negocijs vſitatis valenter **H**
 efficiens: ſed cū ambulat, membra labāſcunt, temporū venæ exertæ
 ſunt. ſiquidem ob alimenti penuriam tempora habent concaua : atque
 in omni corpore venę inſignes apparent. non modo enim morbus iſte
 non concoquit, verum ſtatim neque in molem corporis diſtribuit: Nā
 haud ſolum concoctionis, ſed etiam digeſtionis vitium mihi eſſe vide-
 tur. Porro ſi in incremento morbus ſit, materias ab omni corpore in
 ventriculum rurfus adducit : tunc ea iam eſt corporis eliquatio, os eſt
 aridum, ſuperficies ſquallida, nihil ſudant : ventriculus nonnunquam
 vt ab ardenti carbone peruritur, aliàs tanquam à cryſtallo congelacia-

A tur. interdum verò sanguis in extremo vitæ discrimine constitutis in deiectionibus flauus defluxit, purus, non permixtus: vt venæ ostiolum patefactum esse videatur. acredo nanque venas exedit. Longissimum & difficulter curabile vitium est. Etenim si absque manifesta causa defixisse videtur; iterum inuadit, vbi & ex leui errore iam denuo suboritur. Per circuitum igitur morbus iste reuertitur. Senibus hoc malum familiare est, & mulieribus magis quàm viris. Pueris autem ventris effluuium assiduum est ob quottidianam cibi intemperantiam, sed non ventriculi debilitate morbus aduenit. Ex anni temporibus æstas hoc malum sæpius affert, secundo autumnus: deinde hyems frigidissima, si proximè ad extinctionem calor deueniat. Diuturnum quoque morbum & affectus iste, & difficultas, & leuitas intestinorum consequuntur. Verum & largissimus frigida potus interdum hanc labem progenerit.

De Colicis idest intestini plenioris morbo laborantibus. Cap. VIII.

C Olici sanè voluulo & stropho, idest, torminibus celeriter necantur. longè plurimæ sunt huiusce morbi causæ. Signa verò hæc sunt, grauitas in ieiuno, vbi affectus maximè vrget: pigritia multa adest, tardi sunt, cibos refugiunt, graciles, vigiles, facie tumidi. Quod si propè splenem agrotet colon, idest, laxius intestinum; colorem habet nigrum cum viridi mixtum: album verò cum viridi, si propè iecur. ab his enim proximis visceribus malum communicatur. Sin autem cibum acceperint quatumuis paucum, & flatu vacantem; mirum in modum tum inflantur, & distlandi quidem cupiditas eos incessit, sed inferius exitus intercluditur: superius verò ructus violenter tentati neque ipsi finem assequuntur. Siqua verò parte flatus vi erumpunt, virosi planè odoris sunt sursum petentes, & acidos ructus excitantes. Renes & vesica in partem huius doloris adducuntur: & vrina cohibetur. istis alia pro alijs accedunt. Miraculum autem his maius est, quod in testes & cremasteras, idest, suspensores inopinatus dolor inuadit. Nō paucis medicorum hæc morbi communicatio in occulto est: siquidem nonnunquam & suspensores execuerunt, propriam morbi causam eos continere opinati. quocirca & his pro alijs alia fiunt. Ab hoc quoque vitio alia prodeunt, abscessus, & vlcera non mitia, aqua intercus, & phthisis morbi insanabiles. nam à frigore & crassis humoribus, & longè glutinosa pituita propositi intestini dolor exoritur. Quinetiam & ætate, & tempore, & regione frigida, & aspera hyeme prouenit.

De Dysenteria, idest, difficultate intestinorū. Cap. IX.

Superiora intestina ad cœcum vsq; tenuia & biliosa sunt. atq; inde **E** græcè Cholades nominantur. post hæc inferiora vsq; ad intestini recti initium crassa & carnosæ sunt. In oïbus vlceræ fiunt. dysenteria verò est horum vlcerum species: iccirco & varij existunt morbi. Aliqua etenim superficietenus intestina radunt, excoriationem tantum facientia, & innoxia sunt: sed longè innocentiora, si in inferioribus intestinis consistant: alia paulò etiam profundiora vlceræ. verum neque hæc immitia sunt. Alia profunda non vno loco manentia, sed exedentia, glandulosa, serpentia, & sphacelum inferentia, mortifera sunt. Venulæ quoq; in **F** hisce vlcerum passionibus circumrosæ apparent: & in his vlceribus stillationes sanguinis largiores cernuntur. Alia est species vlcerum, quæ oris tumentibus aspera sunt, inæqualia, callosa, vt in ligno Gemmâ dicimus. id genus vlceræ vix medicabilia sunt: neque enim cicatricem facile contrahunt, & facilius aperiuntur. Dysenteriaæ causæ plurimæ sunt: principes autem cruditates, refrigerationes assiduæ, acrium ciborum assumptio, obsonij, quod græci Myttoton vocant, latini Moretū dicerent: cœpæ ipsius, allij, carniū vetustarum, acrium esus: à quibus postea cruditas superuenit. Super hæc humidum aliquod inusitatum, vt mixtura illa, quæ Cyceon græcè dicitur: aut potio RYTEON appellata: **G** aut qualia in singulis regionibus loco vini fiunt contra sitim remedia. plaga præterea, & refrigeratio, & frigida potus intestina exulcerant. Excrementa verò, & quæ cum vlceribus sunt, alia atque alia in alijs atque alijs reperiuntur. Nam si in superficie sint; ex superioribus quidem tenuia, biliosa, inodora, præter eum, qui ab intestinis fit, odorem: ieiuni autem intestini excrementa puriora, crocea, mali odoris. Aliqua verò & cum alimento liquato quidem, sed aspero exeunt. at modo grauis odor ab vlcerum putredine fit, modo vt à solo stercore prouenit. Ab inferiorum autem intestinorum vlceribus aquosa, tenuia, sine odore feruntur. Sin profundiora vlceræ sint, saniosa effluunt, subrubida, **H** vinosa, aut instar aquæ, in qua caro lota sit: & hæc modo sola, modo cum stercore. hocque liquidum est circumfuso humore dissolutum, non infectum bile, inodorum: aut compactum, siccumque, sed ob humorem circumfluentem lubricum deijcitur. Cæterum si maiora, leuioraque vlceræ sint, & in superioribus intestinis; eorum ratione, à quibus, & per quæ transeunt, biliosa effunduntur. sedem enim vellicant: nam bilis acris est, eoque magis si ab vlceribus effluat. bilis verò & instar vnguinis pinguis est. Ex profundioribus autem vlceribus, sed inferioribus cruenta manant, crassa, pituitosa, carnosæ, non valde pinguis, ramentosa: vt

- A** potè quæ ab intestinis abstrahantur. quinetiam & integræ intestinorū partes commixtę sunt. Excernuntur quoque & albida, crassa, mucosa, adipis concisæ similia, humore circumfusa. Hæc utique à recto oblongo intestino feruntur. Nonnunquam sanè mucosa tantum, vellicantia, parua, teretia, mordaciaque egeruntur; crebro surgere cogentia, & deijciendi cupiditatem cum voluptate afferentia; sed quæ deijciuntur valde pauca sunt. Tenesmus huic vitio nomen est. A' cæco autem carnes longè rubicundæ, & grandes excernuntur, circumscriptionē multò maiorem habentes: in ipso enim maiora fiunt vlcera, cruor etiā crassus, feculentusque emanat: & hæc omnia multò quàm antedicta foediùs olent. Cæterum postquam serpunt, & exedunt vlcera, & nullo remedio vlllo in loco coerceri possunt; à superioribus quidem non solum exquisite biliosa, sed & crocina, spumea fecem vini referētia, & nigra, isatidis, & porri succum repræsentantia, antedictis crassiora, atque instar putredinis graueolentia deijciuntur. Alimentum nunc minus concoctum est, solum ut à dentibus voracius contritum. At si inferiora intestina vlceribus erodentur; guttæ cruoris atræ, crassa, carnosæ, rubida, grummosa, nonnunquam nigra, multis modis variantia, olida, non ferenda per sedem expelluntur: humiditatumque exitus inuoluntarij fiunt. Nonnunquam oblongum quiddam in pluribus non discretum, instar sani intestini deijcitur: & ignaris rei suspicionem præbuit intestini. At negocium ita se habet, intestinorum tunicæ perinde ac ventriculi geminę sunt, & altera alteri obliquè superiniecta est. Igitur cum earum connexio dissoluitur, interior tunica secundum longitudinem ab sistens foras egreditur: exterior sola intus remanet, & carnosæ efficitur, & cicatrice solidatur: sanescuntque homines, & viuunt. id verò inferius intestinum solum patitur. in causâ est tunicarum carnosæ substantia. Quod si ex quopiam vasculo cruor emanet flauus, aut niger; purus, non cum cibo aut stercore mixtus effunditur: verum concretum quiddam latis araneolis simile extenditur. in grumum enim, cum refrigit, obduratur: neque sanguinem excretum esse credideris. ob sonū autem multum cum spiritu maior quàm pro effectu, excretionis est apparentia. Interdum & in pleniore intestino purulentus abscessus efficitur, nulla nouitate ab alijs internis vlceribus differēs: etenim signa, & pus, & vlcerum medicatio penitus eadem sunt. Si res duræ, carnosæ contritis asperisque corporibus similes excernantur; abscessus non benigni moris significatur. Nonnunquam ex laxo intestino aqua multa dysentericæ modo profluit, idque plurimos ab hydropico morbo liberauit. Vlcerata quidem intestinorū (ut paucis dixerim) huiusmodi sunt. Cæterum & ipsorum formæ, & ab ipsis purgamenta tot sunt, quot su-

pra comprehendimus. Quæ singulis quoque ægrotantibus accidunt, E
 explicabimus; seu placida, seu noxia vlcera sint. Itaque collectim dictū
 esto. si exulceratio superficietenus fuerit siue supra, siue infra; febrem
 non habent, nec dolorem: ac sine decubitu tenui victus ratione diuer-
 sis modis sanescunt. Sin vlcus altius descenderit, in superioribus qui-
 dem mordacia tormina & acria sunt tanquam à pauca calida bile. alijs,
 atque alijs temporibus suppurant intestina: plerunque verò suppurāt,
 aut coctiones dimidiatę sunt, cibos tamen non horrent. Si inferiora vl-
 cerata sint, longe superioribus sunt salubriora. hæc enim humiliora in
 testina multò carnosiora sunt alijs. Sin caua & depascentia vlcera in su-
 perioribus grassentur; febres acutę concitantur, non emicantes, in vi- F
 sceribus demersę: extrema refrigerantur: cibis fastiditur: vigilia adest:
 ructus male olent: nauseabundi sunt: bilis vomitus, vertigo. cumq; mul-
 ta expellantur, (ea verò biliosiora sunt,) tormina, atque alij dolores ma-
 gis perseverant. His accedit virium consumptio, genuumq; resolutio:
 ardore estuant: sitibundi sunt & anxij: atra per nauseam reijciunt: lin-
 gua est arida: pulsus pusilli, debiles. atque his germana sunt, quotquot,
 de perniciosis vlceribus mortifera exposui. oris etiam ventriculi dolo-
 re vsque ad animę deliquium torquentur. Quidam verò neque ex eo
 deliquio in pristinum restituti sunt, sed in tali affectu vitam finierunt.
 Huiusmodi calamitates & inferiorum intestinorum corrosionibus cō G
 munes sunt, si depascantur vlcera, neque eorum depastionem compe-
 scere valemus præterquàm quòd tormina doloresque sub vmbilico in-
 ferius, vbi vlcera sunt, percipiuntur. Formę autem excrementorum ta-
 les sunt, quales supra posuimus. Verùm si inter initia parua vlcera sint,
 in longumque tempus depastio producat; alia alijs vlcera superue-
 niunt, aliquibus mitescentibus, aliquibus in summum excrescentibus.
 quales enim sunt in mari fluctus, talis est in vlceribus tempestas. Cæte-
 rum si quando natura resistere potens fuerit, simulque & medicus sub-
 uenerit; depascentia compescitur, mortisque timor remouetur: intesti-
 na tamen dura, tumida, cicatricosaque remanent, & nō nisi longo post H
 tempore sanescunt. Verùm enimuerò cū ab intestinis cruor erūpit,
 si ex magna vena, aut arteria exeat, matura mors aduenit: neque enim
 aut manum intromittere, doloremque attingere, aut medicamentum
 ipsi vlceri adhibere possumus. Quinetiam si medicamento sanguinis
 profluuium coercetur, non propterea tuta est, ac vera mortis euasio:
 quādoquidem nonnullis magna crusta, (Escharam græci vocant,) de-
 cidens, venę ostiolum patentius efficit. Vbi verò & grummi intus con-
 crescunt, intusque remanent, ineuitabilis morbus est. Incipientibus igi-
 tur sanguinis eruptionibus succurrere oportet. plerunque autem cū

- A** futurae sunt, licet non admodum clavis signis, tamen sese indicant. anxietas enim adest, & animi ambiguitas: grauitas ea in parte est, quae rumpitur: & facies rubet, si nondum ruptura facta est. Sin autem vena proximè rescissa est, plurimum venter mollitur omnino: si satis temporis præterijt, difficilius, atque tardius soluitur. Huiusce qualitatis sunt intestinorum vlcerata. Præcipuè nascuntur æstatis tempore, secundo autumni, minus vere, minimè hyeme Pueris quidem, & adulescentibus ventris profluvia contingunt: difficultas autem intestinorum viris & iuuenibus. Senectæ verò ægrè medicabilis est, & ad ducendam cicatricem longum tempus requirit. At vlcerata exedentia senibus inusitata, sanguinis verò profusio senectæ est conueniens.

De Læuitate intestinorum. Cap. X.

- S**I à torminibus, & ab latis, valdeque profundis superiorum intestinorum vlceribus cicatrices crebrae, crassae, solidaeque contrahantur; stercora ex his deorsum liquida, ab alibili indiscreta prolabuntur. Intestinorum enim raritas, per quam sursum versus alimonia discurrit, à cicatrice interclusa est. Homo igitur nutritionis inopia laborat: & pallor adest, & infirmitas. Affectus iste qui ab cicatrice fit, Lienterie cognomè accepit, ab intestinis scilicet, quæ Græci Entera vocant: & nunc
- C** quidem à cicatricibus morbus exoritur. Aliàs verò intestina cicatricis expertia sunt, sed consuetudo & exercitatio intestina profluuium pati edocent. In istis enim calidum quandoque refrigeratum est: vt neque concoctionem, neque digestionem moliatur: sed præ imbecillitate retinere non potest, omnemque elaborationem alimentum subterfugit. Quod si ex tempore, & non stabilis, sed levis mouenti purgatio fiat, simplex à cibis vomitus morbum soluit. Sin autem aliquo tempore prorogetur, et in sede firma istorum causa permaneat, nihil opis vomitus affert. Morbus quoque longus, & malus habitus, qui decumbere non cogit, lienteriam peperit. Aqua intercus nonnunquam in hanc ægritudinem foeliciter commutata est, in malum scilicet ex malo. sed melior est successio.
- D**

De Vteri morbis. Cap. XI.

MVlieribus vterus ad purgationem & partum bonus est, sed morborum infinitorum, malorumque aceruum congerit. neque enim vlceribus tantum, & inflammationi, & fluori obnoxius est; verum etiam si totus repetè sursum versus moueatur, celerem interitum affert. Alibi quidem scriptum est, qui nam ipsius morbi perniciosi acuti sint. Diuturni verò hi: fluor duplex, duritia, vlcerata aliqua innoxia, ali

qua maligna, exitus totius aut partis. Fluor sanè ruber, aut albus est, for-
ma declarat. Ruber quidem, si sanguis flauus emanet, & huius species:
vel liuidus, vel niger & tenuis, vel crassus et concretus, vt grummi. Al-
bus, vt aqua, aut flauus cum pallido mixtus vt bilis; crassus verò aut sub
tenuis, aut tenuis liquor, quem græci Ichora vocant, & male olens. al-
bus item, vt pus. sed exquisitè albus, vt album serum. quin etiam gutta
cruenta nonnunquam cum pure simul effluit: mille aliæ sunt secun-
dum rationem maioris & minoris istorum species. Circuitus verò mo-
do est menstrua purgatio, sed non ad pristinum præscriptum diem re-
uertitur. non multus quidem sanguis, sed per multos dies effluit. pau-
corum autem dierum fit interpositio, sed omnino pura. Alter est cir-
cuitus modus, sed ad certum diem: neq; plurimi sanguinis est plerunq;
prima purgatio, bis autem ac ter purgantur per totum mensem. Tertia
est quoque fluoris species, indefinens quidem effluuium est, & singulis
diebus modicum: sed in totum mensem summa fit non admodum mo-
dica; neque enim vterus ostium claudit, sed hiat, ad effluxum humidi-
tatis relaxationem patiens. Verum si neque intermittatur, neque pa-
rum effluat, ob sanguinis effusionem moriuntur. Signa utiq; hæc sunt,
præter humiditatis effluētis colores, ipsius hominis color, peruigilant,
cibos oderunt, anxietate vexantur, dissoluuntur in rubro profluuio
magis, & dolore torquentur, & in ambobus quod effluit, mali odoris
est; sed modo magis modo minus. Albū enim profluuium peius olet,
si quando maior adest putredo. Aliàs autem rubrum, cum sæuius de-
bacchatur erosio. Breuib; sanè dictum esto, ater fluor omnium pessi-
mus est, deinde liuidus. Pallidus, albus et purulentus, diuturniores qui-
dem sunt, sed minus periculosi. Ex his ipsis pallidus deterior quidem
est, sed longe melior est ille, qui cum v̄sitato colore mixtus est: v̄situs
autem est ruber, eiusque species. Quin etiam & ipsis minus noxij sunt
v̄sitati: sed re vera senioribus infestiores sunt rubri fluxus, minimè au-
tem puellis, quibus magis albi nocent. Item altera est albi fluoris spe-
cies, menstrua purgatio, exalbida, acris, & pruriginem cum voluptate
afferens. In istis verò humor albus, crassus, genituræ similis prouoca-
tur; hanc speciem Gonorrhœam, idest, fluxum seminarium muliebrem
appellauimus. Est autē vuluę refrigeratio: quam ob rem humorum te-
nax esse non potest: quin etiam sanguinem in albidum colorem trans-
mutat: vim enim ignis rubrificam non habet. Id genus vitij & stom-
achus patitur, ideo & pituitam euomit. Simili affectu & intestina labo-
rant, cum profluuio græce Diarrhœa vocato, ægrotant. In vtero præte-
rea vlcera suboriuntur, aliqua lata, pruriginosa, tanquam sale inspersa:
hæc sunt quædam superficiei excoꝛiatio. pus habet crassum, inodorum,
paucum.

A paucum. Vlcera huiusmodi mitia sunt. His cauiora sunt vlcera & deteriora, quibus dolores parui accidunt, pus paulo plus, grauius olent: nihilominus tamen hæc quoq; placida sunt. Quòd si altius penetrent, & labia dura aspera que fuerint, & sanies quædam olida exeat, & quàm in superioribus, dolor sit maior; exedit vuluam vlcus, & nonnunquam caruncula quædam separata egreditur. neque ad cicatricem vlcus id ducitur, sed longissimo tempore hominem tollit: nam maxime diuturnum est. huiusmodi græco vocabulo Phagedæna nuncupatur. Nempè mortifera vlcera sunt, si præter ipsa dolor exacerbat, & mulier valde contristatur: & res putrida ab vlcere neq; ipsis ægrotis tolerabilis emanat, efferaturque manuum attrectatione et medicamentis, & quolibet genere medelæ exasperatur. venæ autem in vtero turgent, & proxime simul partes distenduntur. id verò perspicacibus medicis tactu depræhenditur: neque enim aliter liquet. cæterum ignis & anxietas totius, & duritia simul, vt in feris vlceribus insunt, quæ & ipsa mortifera sunt, necnon & Cancri appellationem obtinent. At cæcer neutiquam vlcus est, sed tumor durus & indomitus, qui vnà totum vterum distendit: dolores quoque, & reliqua omnia, quæ in vlcere insunt, cancerum comitantur. Hæc eadem vero cancerosa vtraque sunt, et diuturna, & perniciofa. Vlceratus autem cancer non vlcerato longè improbior est, & odore, & doloribus, & vita, & morte. Nonnunquam integra vulua de sede sua egreditur, & mulieris feminibus infidet. incredibilis calamitas: Sed neque inaspectabilis est vterus, neque ingenerabilis causa. relaxantur enim membranæ ilibus appensæ: quæ vteri sunt ligamenta nervosa: quæ in fundo sunt iuxta lumbos gracilia, quæ in ceruice hinc atq; inde iuxta ilia, maxime nervosa, lataque sunt: qualia nauigiorum vela cernuntur. Omnes igitur hæ membranæ remittuntur, cùm vulua foras procidit. plerunque sanè huius exitus mortem affert. Accidit enim ex abortu, & magnis concussionibus, & violento partu. At si non interficit, diu hæ vitam producant, non visibilia videntes, extra alentes vterum, atq; fouentes. Videtur autem nonnunquam duplicitatis vteri interius succingens tunica, quando à contiguo diuellitur. Geminæ nanque membranæ tantum sunt differentes à tunica. hæc verò abscedit & fluctione, & abortu, & violento partu quando ipsa secundis inhærescit. Nam cùm ipsæ vi extrahuntur, simul & vteri tunica extrahitur. verùm nisi pereat mulier, reuertens eadem tunica vtero adamussim connectitur, aut paulum extra prominet: contigit autem feminibus mulier. Nonnunquam vteri osculum solum ad ceruicem vsque procidit, sed rursus intrò se recipit, si vterus suffimenta mali odoris olfaciat. ipsum quoque mulier attrahit, si grata odoramenta naribus

subijciat. Quinetiam obstetricis manibus paulatim intrò recurrit, si **E**
 placidè & sensim prematur; & prius remedia mitigatoria, quæ græci
 Hysterica vocant, id est Vterina ei adhibita fuerint.

De Arthritide & Ischiade, id est, Articulorum &
 Coxendicis dolore. Cap. XII.

Communis omnium articulorū dolor est Arthritis: sed pedum
 dolorem Podagram vocamus, coxendicum Ischiada, manuum
 verò Chiragram. Nempè aut ex tempore dolor est, si ex aliqua parum
 durante causa consurgat: aut latenter meditationibus longo tempore
 contractus est morbus, cum ab exigua occasione dolor & morbus ac- **F**
 cenduntur. Est autem omnium simul neruorum affectus, si auctū ma-
 lum omnibus ingruat. Initio verò nerui articulorum vincula, & quæ-
 cunque ex ossibus exorta sunt, & in ossa inseruntur; dolere incipiunt.
 At istorum magnum est miraculum: non dolent quidem vel minimū,
 etiam si quis secet, aut collidat: at si quis ab ipsis doleat, nihil aliud est
 eis ad dolorem citandum potentius, non ferramenta adstringentia, nō
 vincula, non vulnerans gladius, non exurens ignis. nam & hæc assu-
 muntur tanquam maiorum dolorum remedia. Quòd si quis ipsa dolē
 tia ossa præciderit, sectionis dolor, vt exiguus à maiore obscuratur. Sin
 autem iste præualeat, eos voluptas capit priorum malorum obliuionē **G**
 afferens. id sanè patiuntur dētes et ossa. Causam quidem veram soli Dij
 nouerunt, probabilem verò & apparentem etiam homines. Est autem
 (vt simpliciter dicam) huiusmodi. Quod prædensum est, contactū, vul-
 nerationemque non sentit: iccirco & ex tactu vulnerationeque nō do-
 let. Dolor enim est res aspera sensui: densum autem non exasperabile,
 ideo quoque est indolens. At rarum bono sensu præditum est, & vul-
 nere exasperatur. Cæterum quoniam & densa ingenito calore viuunt,
 per hunc eundem calorem etiam sentire possunt. Siquidē efficiens cau-
 sa substantialis fit, vt gladius, aut lapis, substantialis patientis corporis
 pars non dolet: natura enim densa est. Sed si caliditatis insitæ intempe- **H**
 ratura corripiatur, sensus fit permutatio. cumque ipsorum ex se ipsa do-
 let caliditas, ab interna sensus pulsione excitatur. natura autem in ma-
 ius excedente, vel ex abundantia dolores proueniunt. At aliàs in alios
 articulos morbus articularis inuadit, quibusdam in coxendices, (eaque
 parte plerunque claudus remanet:) & in alia quædam membra nonnū
 quam exiguus. quandoque nec in paruas particulas transit pedes et ma-
 nus, nam si maiora membra occupauerit morbum ipsum capere valen-
 tia, instrumenta illa non supergreditur. Sed si ab exiguo membro ini-
 tiū coeperit, mitis est, & inopinata inuasio. Ischiadis quidem à femore

A posterius, aut poplite, aut tibia initium est. Aliàs verò in coxæ cauo (Cotylam græci vocant latini Acetabulum) dolor apparet, rursus in clunē, aut lumbos impetum facit; & omnia potius esse videtur, quàm coxendicis morbus. Verum etiā articuli ita ferè dolere incipiunt, magnum pedis digitum dolor occupat: rursus calcem in priori parte, qua nitimur; deinde in concavam subit: Malleolus autem postremus intumescit. Doloris causam non legitimam afferunt, aliqui nouæ cræpidæ attritum, aliqui longam obambulationem, alius plagam, aut calcationē, nullus intestinā domesticamque causam explicabit. Quin etiam egrotis verum audientibus incredibile esse videtur. quam ob rem in infanabilem affectum inciderunt. quoniā principijs, cum debilissimus morbus est, medicus non resistit. qui vt temporis spatio vires acquisiuit, nihil medici diligentia proficitur. Quibusdam in pedum articulis vsque ad mortem residet morbus, quibusdam in omnis corporis ambitū vagatur, plerunque à pedibus in manus profilit. neq; enim multum interest in pedibus ne, an fiat in manibus: cum vtriq; eiusdem nature sint, graciles, excarnes, externo frigori proximi, à calore interno remotissimi. Item cubiti flexura, & genu conueniunt. post hæc coxarum cavitates, quas Cotylas græci vocāt, et vocatus Peristrophus. Transitus quoq; in dorsi, thoracisque musculos fit: incredibileque est, quàm late malū serpat. Vertebrae dorsi, ceruicisque dolent; & in summo sacri ossis dolor inhærescit. simulque omnium bos, asinus. & proprius cuiusque dolor. Verum etiam tendones & musculi cum distentione dolorem patiuntur; necnon maxillarum, & temporum musculi. Item communicatur renibus & vesicæ. O ré admirabilem. Post omnia nares, et aures, et labia afficiuntur. Nam quoquo versus nerui & musculi in capite feruntur. dolent capitis futura, & quid doleat ægrotus ignorans indicat futurarum species obliquam, rectam, transuersam, posterius, ac prius. Tenuem autem dolorem & in ossibus defixum conqueritur. Vniuersam enim ossium compagem morbus populatus haud secus, atque pedis, aut manus articulum. In articulis quoque tofacea quædam coalescunt. ab initio quidem veluti abscessus occupant: postquam verò magis spissantur, etiam concreto humore difficiles fiunt inflexiones: demum tofi solidi albi consistunt. in toto autem membro tubercula exigua, quales sunt Ionthi à græcis appellati, Vari à latinis, & maiora exurgunt. humiditas verò crassa, albicans, grandinosa est: nam & totius morbus frigidus instar grandinis est. Videtur autem caloris, aut frigoris differentiā præ se ferre. siquidem modo ex calore, modo ex frigore voluptas percipitur. At mihi placet vnicam esse morbi causam insitam frigiditatē, vnicumque esse affectum, verum si protinus increseat, & caliditas ap-

paruerit, refrigeratione opus est: ac talibus delectatur: & huiusmodi affectum calidum vocant. Quod si dolor in intimis nervis demoretur, & articulus non calens collapsus sit, neque extumeat; frigidum hunc esse dixerim: in quo ad caloris reuocationem medicamenta calida requiruntur. multis autem valde acribus opus est. Caliditas enim collapsas partes in tumorem excitat, & internum calorem ad superficiem euocat. quo tempore frigida medicamina proficient. Huic rei fidem id facit, quod iisdem eadem non conducunt. nam quod modo profuit, id aliàs noxium fuit. atque (vt compendio dicam,) calore in principio, frigidityte in fine opus est. Haud facile quidem continua podagra gignitur: sed nonnunquam longo interuallo temporis intermittitur. tenuis enim est. Et in ludis olympicis podagricus morbo sedato cursu victoriam adeptus est. Viri facilius in hunc morbum incidunt, & ex mulieribus agiliores. Mulieres autem, licet rarius, quàm viri, difficilius tamen hoc vitio laborant. Quod enim neque vsitatum, neque familiare est, id si aliqua vrgente causa potentius euaserit; violentum cum sit, maiorem calamitatem infert. Aetas autem huic morbo subiecta est à quinque annis, supra triginta. celerius quoque, aut tardius, pro vt cuiusque natura, aut victus ratio postulat. Atroces sanè dolores sunt, sed dolores comitantia atrociora: defectus animæ, ad manuum contactum immobilitas, ciborum auersatio, sitis, vigilia. Si discrimen euaserint; tanquam ab inferis elapsi laxiorem vitam degunt, incontinentes, simplices, hilares, auari, & in victu molles, ac delicati. Iccirco verò tanquam mortem rursus subituri licentiosè præsentī vita fruuntur. Multis in hydropicum morbum podagra concessit, quibusdam in deprauatam spirationem, Asthma greci vocant, latini Anhelitum. Hæc verò successio medicabilis, atque ineuitabilis est.

De Elephantiasi. Cap. XIII.

Elephanti morbo & feræ elephanti communia multa sunt & specie, & colore, & magnitudine, & victu. Verum neque vlli alij similia sunt, neque affectus affectui, neque animal animali. Nā Elephas fera longè ab alijs differt. primum quidem ingentissima crassissimaque est. Magnitudo enim tanta est, vt magnum animal super aliud animal turris instar imponere queas. Crassitudo quoque tanta quātam plura crassissima animalia inter se coniuncta vix æquare valeant. Ceterum neque specie cuiuspiam admodum similem inuenias: siquidem omnes exquisitè nigro colore toto corpore obscurantur. Nam equorum alius candidissimus est, quales Rhesi equi thracij: alij albis pedibus, qualis Menelai Podargus: alij flauī, quales cētum & quinquaginta: alij cœ-

- A** rulei, vt illud Homeri, factus equo similis concubuit Cœruleos habens crines. ita boues se habent, ita & canes, ita quælibet reptilia, & animalia, quæ super terram depascuntur. Elephantes autem soli nigri, tenebricoso colore, nocti & morti similes. Specie verò tali sunt. capita quidem & facies fœdas habent, figura non euidenti, super breui ceruice, vt caput in humeris confidere videatur: atque ideo non euidens est. aures enim grandes sunt, latæ, alarum similes, ad iugula vsque & pectoris ossa. Hæ ceruicem armosque tegunt, sicut nauigia velis conteguntur. Cornua verò mirandum in modum candida nigriori colori internitenti possidet Elephas. alij hæc dentes appellant. Hęc sola autem candidissima sunt, quale nihil in vlllo alio quauis candido animali reperitur. & hęc ipsa non super frontem & tempora, qualis cornigeris natura est, sed in ore superiori que maxilla sita sunt, prorsum versus spectantia, recta non admodum, sed paulum in superiora retorta, quo à recto detorqueri liceret, & in simis dentibus pondus extollere. Grandia utique cornua sunt, longitudinem extenti brachij, Orgyiam græci vocant, æquat mediocria. alia his multo longiora duplo longiora sunt. prominentiam habet superior maxilla à labro enascentem, lōgam, exossem, tortuosam, serpentis similem. Duo verò in summa prominentia foramina sunt: & hęc in pulmones vsque pertinentia natura terebrauit duplicis tibiæ imaginem referentia. Hac sanè fistula tanquam nare ad respirationem, necnon & vice manuum id animal vtitur. poculum etenim, cum velit, hoc processu corripit, compelectiturque, & valide retinet: neque ab eo quispiam vi eripere posset, nisi alius sit potentior Elephas. herbam etiam ad pabulum hoc quærit: neque ore minoribusque dentibus carnes edendo vitam ducit. prælongi enim pedes longe à terra distans animal sustinent. quinetiam breue (vt diximus) collum est. ore igitur humi pabulari non potest. Nōnunquam & cornuum ab ore processus herbam os tangere prohibet. Itaque hac prominentia magnum pondus haurit: deinde quotcunque venatur, hac complexus ventri futura alimentū in os detrudit. Ritè igitur primi illi Proboscida hanc vocauerūt, nam, pro, idest, ante se animal, hac boscetę, idest, pabulatur. Verū enim uerò neque ex palude aut flumine ore bibere ei licet. Eadem. n. causa est, quod si sitiatur, proboscidis extremā narē in aquā demergit: deinde tāquā respirās, vice aeris, multū aque attrahit: ubi verò impleuit, narē ceu poculū in os fluminis instar effundit: deinde iterū attrahit, iterumque effundit, quoad ventrē tanquam onerariam nauem compleuerit. Corium habet asperum, crassissimumque, tumoribus inæquale, fissuras habens, ceu semitas prælongas, aliàs diuisuras concavas transuersas, aliàs verò obliquas valde profundas. Totū Tripodonio persimi-

le est. Pili autē alijs quidem animalibus natura, aut setæ sunt, Elephan- **E**
 ti verò fordida lanugo est. Infinitæ sunt & aliæ differentiæ inter ele-
 phantem & cetera animalia. Etenim retro versus quandoq; secundum
 genu flectitur, quemadmodum & homo, & mammæ propè axillas ha-
 bet, vt mulieres. Cæterum non in præsentia mihi opus est de animalis
 huius natura tractare, nisi quatenus ex eo & morbus Elephas vocatus
 patefiat; quotque ægrotantis forma huius animalis naturæ similia obti-
 neat, agnoscatur. Morbum quoque hunc Leonem vocauerunt, ob ex-
 tremarum frontis rugarum similitudinem: quam partem græci Episce-
 nium nominant. De ea posterius suo loco dicetur. Satyriasis etiam ap-
 pellatur ob malarum ruborem, atque inexplibilem impudentemque **F**
 coeundi libidinem. Necnon & Herculeus dicitur, quoniam eo nullus
 maior est, neque valentior. Magnus est quidem potentia morbus. ad
 mortem enim inferendam est omnium longè efficacissimus. est etiam
 visu foedus, & in omnibus terribilis, quemadmodum & elephas belua.
 Inevitabilem quoque affert interitum: quandoquidem à mortis causa
 ducit originem. Ea ingeniti caloris frigiditas est non exigua, vel potius
 congelatio, ceu quædam sæua hyems: cum aquam in niuem, aut etiam
 grandinem, aut crystallum, aut glaciem conuertit. Hæc est communis
 mortis ac morbi causa. Verumtamen neque vllam insignem coniectu-
 ram morbi principium obtinet: neque vlla noua, atque inusitata labes **Q**
 hominem incesit: neque in corporis summis partibus repræsentatur,
 vt protinus videre quis possit, & incipienti malo resistere. sed in visce-
 ribus tanquam domo Plutonis delitescens ignis iam succeditur, inter-
 norumque victor rursus in superficie aliquando exardescit. Plerunq;
 sanè à facie hæc pestis incipiens tanquam ignis de specula procul con-
 spicius effulget: Nonnullis verò ab extrema cubiti curuatura, à genu,
 à manuum, pedumque articulis. Idcirco autem huiusmodi hominum
 salus desperata est: quoniam medicus ad morbi debilissima initia artē
 non adhibet negligens, & ægrotantiū calamitatis ignarus. Tardi enim
 sunt, vt ab aliquo leui & vulgari causa, somniculosi, quieti, sicca aluo. **H**
 Hæc etiam sanis haud valde inusitata sunt. In morbi autem crementis
 respiratio graue olet ob interni spiritus exhalationem. Huiusce rei aer,
 aut quippiam aliud extrinsecum causam præbere videtur. Lotium cras-
 sum est, album, turbidum, quale iumentum reddit. venerem appetunt,
 {crudorum & inconcoctorum distributio fit:} neque istorum est sen-
 sus & meditatio. neque enim concoxerint necne, percipiunt: & crudi-
 tas hæc concoctioni similis est. nam ipsis haud frequens est in optimum
 aut familiare concoctio. Digestio verò facile fit, tanquam in suum ip-
 sius alimentum raptim morbo attrahente: propterea valde siccitate in-

* Aliter
 intrinsecū.

* Aliter
 feminis
 crudi &
 incocti
 emissio
 fit.

- A** ferioris ventris laborant. Tumores alij iuxta alios exurgunt, nondum quidem continui, sed crassi & asperi: & interstitium tumorum discissum est, vt elephantis corium. Venæ latæ sunt, non sanguinis redundantia, sed cutis crassitudine. Non multo post autem & sedes declarat vniuerso corpore in æqualem tumore distento. Pili in omni corpore præmoriuntur in manibus, femoribus, tibijs: Item in pube, in mento rari sunt: rara quoque in capite cæsaries. quod verò maius est, intempestiui cani, & caluitium affatim subitoque ingruunt. non multo post autem pubes & mentum glabrescunt. Quod si qui pauci pili remaneant; hi magis dedecent, quam qui defluerunt. Capitis cutis altius rescissa est: rimæ
- B** autem frequentes, profundæ, asperæ sunt. Tumores in facie duri, acuti: nonnunquam fastidio albedo, basi viridior. Pulsus pusilli, graues, tardi, tanquam per cœnum vix se mouentes. Venæ temporum distentæ sunt, & sub lingua ventres biliosi. Lingua grandinosis varis exasperatur. Neque inopinabile est & omne corpus talibus scatere tuberculis: quandoquidē & in victimis prauos humores habentibus carnes grandinis plenæ sunt. Sin autem valde ab intimis partibus erumpet morbus, & in extremitatibus apparebit; impetigines summos digitos infestabunt, genua prurient, pruritusque cum voluptate scalpetur. Ambit verò impetigo & mentum nonnunquam in orbem: rubent male cum tumore
- C** more haud ita magno: oculi caliginosi, ænei coloris sunt: supercilia prominentia, crassa, glabra, deorsum versus pondere vergentia: contractis glabellis eminens tumor insurgit: color liuidus, aut ater est. Episcenium vehementer contrahitur, vt oculos contegat, quemadmodum irascen tibus, aut leonibus accidit: vnde & Leonina hæc egritudo vocatur. Igitur neque leoni, neque elephanto solum, verum etiam nocti tenebrose æquales sunt. Hypopia, id est, sub oculis insurgentia ossa, & nares cum atris tumoribus salebrosæ, extantesque sunt. labiorum prominentia crassa est, pars autem inferior liuescit, nāsus tumet: dentes non albi sunt, sed nigricare videntur. Aures rubent admixta nigritia, obstructæ, elephantice, vt grandiores consueto esse videantur. Vlcera in basi aurium sunt: sanies defluit: pruriunt. Totum corpus rugis asperis exaratur: necnon & altè descendunt scissuræ veluti nigri in corio sulci. propterea & Elephas huic morbo nomen est. Plantarum et calcaneorum vsque ad medios digitos fissuræ sunt. Quod si plus augescat malum, tumores malorum, menti, digitorum, genuumque vlcerosi fiunt. vlcera foetida sunt, & insanabilia: alia enim super alia exurgunt, super alia alia nitescunt: siquidem membra hominem diu morte præueniunt, quoad de corpore excidant nāsus, digiti, pedes, genitalia, atque totæ manus. Neque enim hæc labes prius perimit, à turpi vita, seuisque cruciatibus liberās, quam

* Aliter
atque extat

membratim dilaceratus homo sit. At longæua est, quemadmodum & Elephas animal. Sin autem membrorum recens dolor sit, longè acerbius affligit. Aliter atque aliter paratorum ciborum appetentia est non obtusa, sed gustatus qualitatis expers est: nullaque edendi ac potandi delectatio. omnia verò ob doloris cruciatum oderunt: alimento priuatur corpus: rabiosa inest cupiditas: spontinæ sunt lassitudines; singulorum membrorum species hominem grauitate inusitata premit, quantumlibet exigua membra sint. quinetiam corpus omnia grauatim fert: non balneis delectatur, non illuue, non cibo, non ieiunio, non motu, non quiete: ab omnibus enim morbus alienus est. somnus tenuis, vigilia peior mala sua cogitans. spirandi vehemens difficultas: suffocationes fiunt, ac si laqueo strangulentur. Hoc igitur pacto nonnulli vitam perdiderunt, inexcitabilem somnum in mortem dormientes. Itaque tales, cum sint, quis non aufugiat? aut quis non auerfetur, licet filius, aut pater, aut etiam germanus frater sit? cum metus est, ne morbus comunicetur. Propterea multi in solitudines & montes sibi charissimos abduxerunt; aliqui eorum egestati, quoad viuerent, subuenientes, aliqui verò minime: cum eos vita defungi mallent. Fama est eorum quendam, qui in solitudinem expositi erant, ex terræ latebris repantem viperam intuitum, aut fame coactum, aut morbi tædio inductum, ut malo malum commutaret, viuentem viperam edisse, neque prius è vita migrasse, quàm omnia ipsius membra computruerint, atque exciderint. Alterum præterea ferunt, viperam in musti dolium irrepsisse cōspicatum, cum mustum ad satietatem ingurgitasset vomuisse, multumque veneni simul cum musto reiecisse, quoniam in musto fera extincta fuerat: iterumque hominem mustum largissimè epotum, vitæ pariter ac morbi finem quærentem. ut verò satiatus, iuxta inebriatusque fuit, primum quidem humi prostratus instar morientis iacebat. posteaquàm deinde graui sopore experrectus est, ebrietatemque discussit, in primis comæ defluxerunt, præterea digiti & ungues; deinceps omnia in ambitu corporis membra contabuerunt. quoniam vero adhuc in femine facultas erat, iterum tanquam ab ortu hominem natura veluti ex cera creauit. alios enim crines enutriuit, ungues nouos, & nitidam carnem instaurauit, ac vetus corium ceu serpentis senectam exuit: & tanquam alter homo ad vitæ munia reuocatus est. Ita habet fabula non admodum quidem vera, neque valde fidem excedens. Malum enim malo pulsum esse probabile est: naturam verò ex residua vitæ scintilla hominem redintegrasse, haud ita à ratione abhorret, ut monstro simile esse uideatur.

ARETAEI CAPPADOCIS

DE MORBORVM ACV-

TORVM CVRATIONE,

Liber Primus.

IUNIO PAVLO CRASSO PATAVINO


INTERPRETE.

Prooemium.

Curatio phreniticorum.	Cap. I.
Curatio Lethargicorū, seu Vernofoforum.	Cap. II.
Curatio Tabis.	Cap. III.
Curatio Apoplexiæ.	Cap. IIII.
Curatio accessionis morbi Comitialis.	Cap. V.
Curatio Tetani, seu Rigoris.	Cap. VI.
Curatio Anginæ.	Cap. VII.
Curatio vitiorum columellæ.	Cap. VIII.
Curatio Pestilentium in faucibus vitiorum.	Cap. IX.
Curatio Pleuritidis, idest, morbi costalis, seu lateralis.	Cap. X.

Prooemium.

Cap. I.

A  Cutarum ægritudinum medicamina speciebus signorum contigua sunt, quæ superioribus libris à me cōprehensa fuere. Quæcunque sanè in febrium curatione fiunt secundum ipsorum differentiam, & secundum morborum speciem, & in ipsis diuersitatem; eorum plura in Tractatione de Febribus explicabuntur. Quotquot autem cum febribus acuti morbi fiunt, qualis Phrenitis est, aut sine febribus, qualis Apoplexia; eorum duntaxat medicamina commemorabo: vt ne aberrem, neque verbosior sim, alia in alijs describens locis. Idem verò principium, quod & de morbis feci, eundem etiam finem faciam.

B Curatio Phreniticorum. Cap. II.

A Egrotum cubare conuenit in conclaui mediocris amplitudinis, aeris temperati, hyeme tepidi, æstate frigidioris. vere autem & autumnò secundum temporum naturas coniectura vti decet. Deinde quiescere iubendum est & ægrotos ipsos & omnes domesticos. Acutè nanque audiunt phrenitici, & strepitibus irritantur, nec non & ab his

L

in furorem aguntur. Parietes læues sint, æquales, neque supereminentes, neque festucas, aut aliquid exertum habentes, neque picturis exornentur: pictura enim parietum mentem turbat: nam præ oculis falsa quædam simulacra obuerfantur, & quædam non eminentia tanquam eminentia manibus contractant, omnisque occasio citra causam manuum agitationem prouocat. Cubilis longitudo & latitudo moderata sit; quò neque in ampliori volutari, iactarique possit, neque à nimis angusto delabi. Stragule vestes glabræ sint, vt ne floccos colligendi in mentem veniat. In molli lecto decumbant; nam durum stratum neruis ingratum est: Nò minime autem inter ceteros egrotantes phrenitici neruis laborant: facile enim conuelluntur. Amicissimi eos inuisant: fabulæ & sermones animum ne vellicent: cùm delectabilia omnia esse oporteat, illis præcipue, quorum iracunda infania est. Vtrum in tenebris an in luce habendi sint, ex morbi natura conijcere debemus: nam si ad lumen efferantur, & quæ non sunt, cernunt, & quæ nò adsunt, cogitant, aut pro alijs alia cognoscunt, aut quasdam nouas & vanas imagines accipiunt, atque in summa lucem, aut quæ in luce sunt, extimescunt; obscuro loco eos continere præstat: Sin secus se habeant, lucido. bonum est autem ad lucem resipiscere, placarique infaniam. Ne diu a cibis abstineant: cibi verò humidiores sunt, paucioresque, & continui: nam cibi animum demulcent. Occasio autem exhibendi cibi esto in vtriusque remissionibus, febris videlicet, atque delirij. Quòd si ab inedia furant, & non desinat febris; cibos dare non valde febrim lædentes vtile est. Nempe bonum est febrim deliriumque in accessionibus remissionibusque concordare, quò exhibendi cibi oportunum tempus inueniatur. In primis itaque considerandum est, sanguis nec ne mittendus sit. Si mentis quidem alienatio vnà cum febre à principio inuaserit; vena in cubiti curuatura primo aut secundo die, media potissimum secanda est. Quòd si non nisi tertio, aut quarto die delirium accedat; vsque ad primum decretoriorum dierum circuitum venę sectio differenda est. At si vltra conueniens tempus, vt puta sexto aut septimo die superueniat, venę sectio dimittenda est: multo enim ante iudicationes in acutis morbis euacuandum est, aut purgandum, aut alijs irritationibus vtendum. Venæ quoque incisor ne multum sanguinis detrahat, licet à principio fecet: phrenitis nanque malum est in syncopam facile mutabile. Sin autem ægrotus valde repletus sit, & iuuenis, plurimo cibo, & largissimo vini potu saginatus; hæ ad phrenitidem rationes non pertinent: verum istis & citra delirium multum sanguinis hauriendum est: longè autem minus auferendum, si ijdem phrenitici sint. Verum tamen audacius vena soluenda est, si a præcordijs non à capite morbus oriatur: ibi enim vi

- A** tæ principium est: caput verò sensus, neruorumque originis locus est, sanguinemq; potius à corde trahit, quàm alijs distribuat. Igitur si membrum hoc affectum sit, venam cubiti scindere non conuenit: quippe in illis vitijs inanire vasa oportet, à quibus non modica noxa prouenit. Quòd si vires patiantur vt quantum sanguinis satis est, euacuetur; semel auferendum est: ne, dum repetendo tempus conteritur, exhibendi cibi occasio elabatur: quandoquidem phreniticis continuę febres sunt, neque remissiones longas habent, sed breues & latentes subleuationes. Cæterum si ante mediocritatem defecerit æger; ad secundam remissionem differendum est, nisi longo tempore post ventura sit. Quòd
- B** si non sit; vires instaurando odoramentis, faciei tractatione, & pedum compressione protinus sanguis detrahendus est: quantum verò mittendum sit, facultas ostendet. Esca humida omnibus quidem febricitantibus idonea est, sed phreniticis maxime: aridiores enim sunt, quàm si sola adesset febris. neque mulsa danda, nisi biliosi sint: nam facile à biliosis naturis concoquitur. Far lotum cum aqua, aut mulsa conuenit. Bonum quoque est ex his sorbitiones simplices præbere, quales satureia, aut apio, aut anetho incoctis fieri solent. hæ nanq; bonam spirationem conciliant, & vrinam cient: conducit autem phreniticis lotij excretio. Omnia olera profunt: sed malux potissimū lentor bonus est & ad linguę arteriæque læuorem, & ad stercorum descensum. optima est beta, blitum, coronopus, cucurbita, & quicquid suis temporibus optimum fuerit. Ordei verò mundati cremor liquidissimus quidem in primis nutritibilior est: sed tanto etiam spissior crassiorque sit, quanto plus temporis morbus progressus fuerit. Verum in iudicationibus & paulo ante iudicationes cibus subtrahendus est. Si morbus longiori tempore producat, cibos ne subtrahito, sed triticea exhibeto, quò sufficiat ægrotus: quādo extremorum & volatiliū carnibus in cremore liquefactis plerunque opus est. oportet enim hæc in elixando valde dissolui. Ex piscibus saxatiles alijs præstantiores sunt: atq; omnino regionis illius optimos deligito. quippe aliam regionē alias piscium species procreare creditum est. Vinosæ naturæ fructus subtrahito: quoniam caput & mentem percutiunt. Verum si necessitas vrgeat, viribus aut ore ventriculi labantibus; mala in mulsa elixa, aut in adipe tosta exhibeto. aliorum singula calida aqua dissoluito, si roborandi duntaxat oris ventriculi causa exhibeas: sin autem vires quoque instaurare opus sit, non vsque adeo vinosa facultas dissoluenda est. Cibi quidem (vt semel dicam) huiusmodi sunt. Irrigandum verò caput est refrigerandi causa oliuę acerbæ contritę vnguinē: nam caput in phreniticis calefieri nō amat. Quòd si vigilię & cogitationes ægrotum agitent; rosacei parem modum in

principio misceto: adhuc verò plus rosacei addendum, quò magis ex- **E**
 tra intraque caput roboretur ac refrigeretur. At si mens labefactetur,
 et locutio euariet; serpylli comam oleis incoquito: aut hederæ succum,
 aut sanguinalis affundito. Si mentis verò alienatio vehementius homi-
 nem turbet; peucedanum, & spondylium oleis inferuefacito, & aceti
 parum instillato: hæc enim halitus & caliditatem diffiant, crassasq; hu-
 miditates, quæ & ipsæ deliramenti causæ sunt, discutiunt. Cauere au-
 tem conuenit, ne in ceruicem ac tendones madefactio descendat, Ten-
 donibus enim atque nervis inimica est. Nempe irrigandi semper occa-
 sio est, præterquàm exacerbationis initio: rarius quidem in incremen- **F**
 to, omnium verò frequentissime vigente morbo, cum maxime insa-
 niunt, tum maxime irrigandum est humore frigido: atque æstiuo tem-
 pore multo magis refrigerato, hyeme verò tepido. Vt mitescat autem
 delirium; posca, aut conyzæ decocto cum spongia facies fouenda est.
 Deinde cœnanthino, aut crocino vngue linenda: quin etiam nares, &
 aures ipsdem imbuendæ: Hæc enim somnum alliciunt. Siquando isti
 pernoctant, neque interdiu sopiuntur, sed penitus intenti sunt oculi
 atque instar cornu rigentes, iactantur autem, & è lecto profiliunt; his
 somnus & quies conciliandi sunt: primum quidem caput rosaceo me-
 ro irrigando, aut amaracino cum succo hederæ, aut serpylli, aut etiam
 fertulæ decocto. Magis autem soporiferum est papauer in oleo elixum **G**
 capitis sincipiti super datum, aut in aqua faciei per spongiam imposi-
 tum. ipsæ quoque integræ herbæ (si proximè lectæ fuerint,) virides cer-
 uicalibus subijciendæ sunt. crassant enim, madefaciuntq; spiritum ari-
 dum tenuemque: & caliginem quandam sensibus obducunt: graue au-
 tem & torpens est caligo: id verò est somni principium. At si valentiori-
 bus auxilijs egebunt; & ipsa papaueris lachryma ex aqua frons inun-
 genda. quin etiã nares ea linendæ, et in aures infundenda est. Contrecta-
 tio pedum suavis ex oleo: capitisq; attactus efficax est, sed potissimum
 si tempora, auresque scalpantur. nam & ferarum iram furoremq; au-
 rium & temporum mollis attrectatio coercet. Cuique verò vñtata **H**
 somnum accersunt: Nautis in cymba decubitus, & maritima nauiga-
 tio, & littorum sonus, & vñdarum murmur, ventorumque bombus,
 & maris nauisque redolentia: Musico tiliarum exercitatio quietem
 affert, aut lyræ cantus, aut citharæ, aut meditatio puerorum canen-
 tium: Ludi autem magistro puerilium fabellarum enarratio. Atque ita
 alijs alia animum demulcentia somnum insinuant. Cæterum præcor-
 dijs ac ventri madefactiones & cataplasmata adhibeto, si phlegmone
 subsit, atque durties, flatusq;, distendat: oleū quoq; ex oliua bene ma-
 tura nequaquam acerba inijcito: id enim crassum est, & viscidum, &

- A** calefaciens. Hæc utiq; in inflammatione facienda sunt. Inijciatur verò in ipsa anethum, aut conyza: bonum quoque est si simul omnia. Quòd si adsit etiam inflatio, cumini & apij semina adijcito, & quæcunque lotium flatusque prolestant: nec non & nitrum cribratum inspergito. Verum si in iecore vitium dolorque fuerit; lanas ab oue sordidas accipito, oleum verò acerbum, aut rosaceum, & sapam græcam, aut creticam admisceto: fertulamque incoquito, atque omnibus in vnum succum permixtis iecur irrigato. Ad lienem verò oleum cum aceto benefacit: aut si magis, quam prius turbet, posca, & pro lanis sponsia mollis adhibeatur. nam mirum in modum his gaudet mitescitque lienis. Por
- B** rò si præcordia interius sint, sursumque trahantur, & circumtenta cutis sit; optimum hoc remedium erit loco vnguinis, aut vnà cum ipso crasso tantundem. opportunum est. cunila verò & ros marinus incoquantur anethum quoque non iniucundum erit. Quòd si cataplasmatibus tempus erit idoneum, oleis quidem iisdem in iisdem affectibus vtendum est. Materia sit autem lini semen, fœnum græcum, ordeï tenuis farina. Bonum est autem & faba, & eruum, si venter intumescat: pariter & millium torrefactum in sacculo positum leue molleque fomentum est. pinsitum verò & aqua intercutem laborantibus cum melle & oleo & lini semine cataplasma bonum est. Flores autem & herbe & semina
- C** quæcunque à me in irrigationibus posita sunt; & in cataplasmatibus eadem sunt. Mel verò & cum ipsis bonum est, vt arida cogantur, miscanturq; squallentia, atque vt calor diutius permaneat: ipsum quoque solum bonum est pro cataplasmate semicoctum, & ad irrigandum, si cum aliquo humore liquetur: mollit enim, calefacit, flatus lotiumque euocat, & ardores obtundit. Nam hæc quoque mulsa epota præstat: hisque plura & meliora, si interius arteriam, pulmones, pectus, & ventrem subeat. Astidue verò aliis irritanda est glandulis, aut illitionibus (sæpius enim siccescit,) vt à capite materiæ detrahantur, & à pectore halitus diffidentur, & alii purgamenta excernantur. Quòd si multis die
- D** bus venter suppressus fuit, ipsum mulsa, oleo, et nitro subluere opus est. Verum si non satis phlegmones exhalationes desierunt; cucurbitulam affigens incidito, qua parte phlegmone extumuit, & maior apparet: vnâ autem, aut duas affigito, prout phlegmone significauerit, & vires præceperint: & sanguinis detrahendi copiam ab his cōiectare oportet. Excessus enim syncopæ autor est. Primo quidem, aut altero die madefactio eadem esto, Tertio verò ceratum cum aliquo ex oleis ad irrigandum aptis imposito. Deinde epithemata in inflammatione si facultas sit, ex hyssopo, fœnogræco ex mulsa decocto, terebinthi arboris resina, & cera: olea verò in iisdem eadē. Quòd si nihil istis delirium

remittat; tondere caput necesse est: si longissimi crines sint, primum di
 midij: si breuiiores, ad cutim. Postea prius resectis viribus cucurbitula **E**
 vertici capitis affigenda est, sanguisque hauriendus: verum prius inanis
 cucurbitula inter scapulo adhibeatur. Cæterum quoniam thoracem in
 omnibus acutis morbis medicari oportet: nam prorsus ipse cum corde
 & pulmone laborat primum quidem ob spiritus modo calidi, modo
 frigidi necessitatem, præterea ab ardenti febre, & tussi, & humorum
 prauitate, & neruorum cõmunione, & oris ventriculi noxa, necnon
 succingentis membranæ, & septi transuersi vitio: (cor enim si maiori
 aliquo malo oppressum sit, nunquam sanescit:) in Phreniticis vtique
 & hæc in primis mitiganda sunt. siquidem nonnullis mentis alienatio **F**
 ab aliquo eorum, quæ in pectore sunt, vitio exoritur. ea verò sunt, spiri
 tus calidus & ficcus, fitis acris, ignis intolerabilis qui vndique in thora
 cem confluit, & prauitas quidem à domestico calore cõmutato & ma
 ior & molestior prouenit. Ab alijs etiam membris in thoracem con
 tributio fit: Extrema nanque frigida sunt, caput, pedes, ac manus: super
 hæc autem thorax est. igitur humectandi refrigerandi que auxilio eget.
 Humectatio quidem fit ex oleo, in quo chamæmalum, aut nardus in
 cocta fit. Aestate verò & lapa græca benè faciet. At si epithematibus vti
 deceat: palmulæ vino austero maceratæ, deinde contusæ in placentam
 cum nardo, polenta, atque œnanthe suaue pectori cataplasma fuerint. **G**
 Refrigerant quoque mala pinsita cum mastiche & sertula: quæ omnia
 cera & nardo excipiantur. Sin autem & os ventriculi torpeat, & à cibis
 abhorreat: succum absinthij, aut comam vnà cum his terito, ipso etiam
 in oleo incocto præcordia irrigato: & aquam, in qua maduit, aut ipsius
 succum ante cibum propinato duos scilicet aquæ illius cyathos, aut suc
 ci ad amaræ fabæ magnitudinem ex aquæ cyathis duobus. At si os ven
 triculi ardor malè habet, non ratione morbi, sed ipsum duntaxat ab
 acris salisque humiditatibus, siue à bile mordetur, atque fiti perare
 scit: lac aquæ admixtum in cibis exhibendum hemina videlicet dimi
 dium vno aquæ cyatho temperatum: atq; ita huiusce lactis plurimum **H**
 sorbeat: non nihil etiam cum pane assumat. Verum tamen si ardor ho
 minem torqueat, & fitis, & anxietas, & furens insania, & frigida cupi
 ditas; propinanda quidem frigida est, sed non tanta, quanta in ardore
 morbo absque phrenitide propinatur. In istis enim timendum neruis
 est itaque danda est, vt ori ventriculi subueniatur. pauca verò satis est,
 parum enim potant phrenitici. Cæterum si in Syncopam prolabantur,
 nam & hoc incidere solet, viribus euanescentibus, in sudorem lique
 scente homine, omnibus humoribus extrorsum impetum faciētibus,
 tenore ac spiritu fatiscentibus; tunc cura delirij post habetur. sed cum

- A** metus sit, ne in vaporem, humiditatemque homo dissoluatur; vnicum subsidium vinum est. celeriter enim substantiam alendo instaurat: & quoquo versus ad extremitates usque permeat: tenori tenorem apponit: & spiritum torpentem expergefacerit: frigiditatem calore temperat: laxantem madorem astringit: extrorsum erumpentia atque diffluentia coercet: olfactu suaue delectat: vires demum fulcire ad vitam prorogandam potest: atque in infania ad animum demulcendum optimum est. Hæc omnia epotum vinum simul præstat. iracundia namque mollescente animo conquiescit: atque ipsimet ad recreandas vires cibos accipiunt: quin etiam se ipsos ad voluptatem replent. Nempe si iam plus
- B** temporis morbus extrahitur, & febris ignaua est, & delirium in fatuitatem vertitur, & præcordia non usque adeo læsa sunt, aut tumore, aut inflatione, aut durtia, sed in capite potissima morbi causa est; audacter lauare oportet, atque sæpius caput perfundere, habitus namque sanabitur: & caput difflabitur: & omne corpus exhalabit. Atque ita siccitas obtunditur: & sensus caligo discutitur: & mens stabilis, atque inconcussa firmatur. Hæc vtique sunt tollendi morbi præcepta.

Curatio Veternosorum. Cap. II.

- C** **V**eternosi in luce & ad solis radios collocentur: morbus enim nihil aliud est, quàm tenebræ. & magis in loco calido habeantur: ipse enim causa est insita frigiditas. cubile agitabile sit. stragulæ vestes, parietum picturæ, omnia sint varia, quæcūq; visum proritare queunt. multus habeatur sermo: pedes premendo tractentur: vellantur pili: membra scalpantur. Si altus sopor obtineat, vociferandum est. iracundè increpandus est æger: his, quæ timere consuevit, deterrendus: quæcūq; prius optabat expectabatque, annuncianda sunt: omnia ad soporem discutendum contrà, atque in phreniticis, molienda. Quòd ad Veternosorum euacuationem attinet; hæc nouisse oportet, si alteri morbo, vt pote phrenitidi succedat veternus, venam ne soluito: neque alicunde multum sanguinem educito: sed ventrem subluito non solum stercoreis educendi causa, sed etiam vt aliquid à superioribus partibus reuellatur, & à capite deriuetur. igitur multum insit salis, & nitri. Optimum verò sit, si sublutioni castorium inspergas. imum enim intestinū veternosis frigidum est, & ad excretionem emortuum. Si non per successione, sed suo pte ingenio veternus incipiat, & æger plenus esse videatur; si sanguinis, vena in cubiti curuatura secunda est: si pituitæ aquosæ, aut aliorum succorum, purgare opus est, nico ex ordeï cremore, aut nigro veratro ex mullâ inter initia, si mediocriter purgare velis. Sin autem copiosius, medicamenti, quod Hieram id est Sacram vocans: pon-

A R E T A E I

do drachmas duas ieiuno dato cum mulsæ cyathis tribus: atque tantis- **E**
per expectans, quoad purgatio confecta sit; tunc cibos, si opportunum
sit, exhibeto: sin minus, in posterum diem alimentum differto. Non-
nunquam sanè & vesperi hieræ drachma cum aquæ, aut mulsæ cyathis
duobus dissoluta in tempore datur. Nempe inedia malum est, malum
est & cibi multitudo. Igitur exiguo cibo vti singulis diebus oportet:
neque subito ac penitus ieiunandum est, os enim ventriculi per totum
diem refectione caloreque indiget. Quin etiam cibus esto attenuans,
& aluum leniens in iusculis magis quàm leguminibus, gallina, cōchri-
de. herba verò mercuriali assidue vtitor; acetumque affundito, & suc-
cis inijcito, si forte succo ptisanæ vtendum sit. Bonum autem spiritum **F**
reddit, vrinamque citat fœniculum, apium olera, aut horum semina.
Item porrum acrimonia sua proficit, & brassica cum oleo & garo. opti-
mè facit & cuminum dulce cum brassica ad flatus digerendos & lo-
tium euocandum. Vesica enim atque venter in quolibet morbo irri-
tant atque infestant. Irrigationes capitis tales fiant, quales & in phreni-
ticis. Vtrisque enim sensus pleni halituum sunt: quos refrigerando, ad-
stringendoque rosæ atque hederæ succo propulsare necesse est; aut di-
gerere per transpirationem extenuantibus, exempli causa serpyllo, aut
acetō cum rosaceo. Si nerui doleant, & totum corpus, sed multo ma-
gis extrema frigescant; caput ceruicemque; castorio cum anethino oleo **G**
inungito, atque irrigato. quin etiam spinam eodem, sicyonio, aut gleu-
cino, aut veteri oleo admixto perfundito: necnon & manus ad hume-
ros usque, & pedes usque ad inguina perungendi sunt. Nonnullis quoque
vesica est humectanda: quæ tanquam neruus patitur, & tanquam vri-
næ iter laborat: insuper humorum acredine vexatur: biliosum enim lo-
tium est. Sin autem maior tremor adsit, & conuulsionem minetur; ne-
cessariò & sicyonium oleum capiti superfundendum: sed brevis eius
usus esto. Quod si præcordia inflammata sint, cutis verò tumida, infla-
ta, distentaque, aut introrsum vergentibus præcordijs concaua efficia-
tur; madefactiones & cataplasmata eiusmodi sint, cuiusmodi in capite **H**
de phreniticis comprehendimus. Cucurbitula minimè vtitor, si à phre-
nitide in hanc labem incidit: audacius verò cucurbitula vti poteris, si
ab initio morbus iste inuaserit. Sin autem atra lingua sit, & tumor in
præcordijs appareat; cucurbitulam affigere necesse est. postquam verò
interuallo temporis sensus purgati fuerint, & alia facilius feret; capitis
vertici applicare. quādoquidem ea parte euacuare sine vlla virium mo-
lestia possumus. Et flatus supra infraque eliciendi sunt. Veternus enim
flatu colligit & in ventriculis, & in toto corpore ignauia, marcor, ani-
mæque defectus conspicitur. Motus autem ac vigilia discutiendi facul-
tatem

- A** tatem habent. Rutam igitur viridem cum melle & nitro contritam illinito: sic enim magis flatus digerit: cum his verò & terebinthinæ resinæ pars vna misceatur. Fetus quoq; flatus prouocat aut cum sordidis valentibusque lanis, aut cum asperis panniculis veteribus atque attritis: aut cum spongia ex aqua, vbi hyssopum, aut origanum, aut pulegium aut rype incocta sit. Euocant autem flatus & quæcunque ante cibos propinantur: quæ vtique pituitam bilemque ab intestinis & stomacho educunt. Hyssopum in mulsa elixum, dictamum creticum, origanum acria quidem sunt, sed eductoria. Adiantum, gramenque flatus & lotia erumpere faciunt. Si manus & caput cōtremiscant, castoreum
- B** dimidiæ drachmæ pondere ex mulsæ cyathis tribus ad plures dies bibendum est: si bibi verò nō possit, ad demoliendam calamitatem cum olei cyathis tribus, in quo ruta incocta sit, duplum in imum intestinū infundatur: idque per plures dies faciendum. Vltra verò vtilitatem, quæ ex hoc prouenit (nam supra infraque flatus expellit, & nonnullis vrinam, stercusque detrudit:) si forte in omne corpus dilabens penetrat, firmi atque robusti nerui efficiuntur, & habitus ad calidum sic cumque permutat: morborumque constitutiones conuertit. Optime etiam proficit si in nares inspiretur; nam & ea ex parte spiritus sternutamentis educit. Et quemadmodum per vesicam vrinam expellit, ita
- C** & per nares mucum. Hos autem effectus hoc loco suauis caliditate præstat, & melius quàm alia sternutatoria, scilicet quàm piper, veratrum, radícula, euphorbium, Nam hæc ad primum atque vltimum attactum immitia sunt, & caput sensumque perturbant. Castoreum verò paulatim adhibitum calefacit, cū & alioqui capiti conducat: quandoquidem nerui vndique ex capite oriantur: morbis autem neruorum castoreum medetur. Cæterum ipsum cum aliquo aut aliquibus ex supra cōprehensis admiscere non ingratum fuerit. nam si admixtum sit, non protinus quidem caput mediocriter conturbauerit, diutius verò caliditatem accenderit. Nares prorritatione humidæ reddantur. odora-
- D** menta applicentur acria quidem ad sensum, sed facultate calida: quale ipsum castoreum est, aut thymbra, aut pulegium, aut thymum, viridia aut arida aceto perfusa. Acribus pharmacis pedes genuaq; illinantur. Materia esto calefaciens, et ex adiectione mordens: nam vtroque veteris opus est ad calorem excitandum atque vigiliam. Primum igitur vrtica crura verberato. tenuissimæ nanq; vrticę partes adherentes non diu perseuerant: sed pruritus & dolorem non grauem inferunt; mediocriter verò stimulant, & tumefaciunt, & calorem excitant. Quod si hæc vehementiora fieri volueris; lemnestidis, atque euphorbij pares portiones cum vnguine gleucino illinito. Optimum quoque est scillæ

crudæ laminis perfricare: sed à mēbris omne oleosum detergere oportet: quodlibet enim acre minimè mordax est admixtū cum vngue, nisi id medicamentosum sit, quale est cyprinum, aut gleucinum, aut ficyonium. Si præter hæc altus adhuc sopor occupet; proderit syluaticum cucumerem ex aceto tritum, & equæ sinapis portioni admixtum imponere. acre verò est id cataplasma, celeriterque ruborem concitat: celeriter quoque calefacere potest. verum ne pustulas vulneraque efficiendo periculum inferat, frequēter detrahendum est cataplasma, atque nunquid horum acciderit, inspiciendum. Hæc utique ad ipsius torporem, ac veluti demortui languorē discutiendum quolibet morbi tempore præter exacerbationum inuasiones molienda sunt. Quòd si iam sensum recuperet, pondus tamen aliquod in capite infit, & sonus aut bombus obstrepat; etiam per os pituita elicienda est. Mastichen in primis mandendam exhibe, vt continenter expuat: postea rursus vuam taminiam, granum gnidium: sed omnium maxime sinapi, et quoniam vsitatum est, & quoniā inter alia magis pituitam educit: ac si quis sponte ipsum deuorauerit, quæ in ventriculo sunt, disijcere potest: potest etiam aluum madefacere, & flatus excernere. Etenim aliquando casu hæc mihi euenerunt: cū homo quidam me consentiente ipsum deuorasset. Bonus autem magister est experientia, opus est verò & ipsum periculum facere: imperitia nanque timoris & cautionis causa est. Caput quoque postquā ad cutim detonsum fuit, nisi magnopere proficiat; vt transpiret, radendum est: quin etiam ad vsum acrium medicaminum, vt eius, qui ex limnestide constat, aut hydar, aut thapsia, aut sinapi, humidum ex aqua cum dupla panis portione in linteolo veteri illitum capiti superdandum est: cumque horæ spatium ibi permissum fuerit, spongijs calidis fouere opportunum fuerit. Item ex vfu erit & lautio omnibus iam, aut saltem plurimis, & præcipuis ad morbi depulsionem adhibitis, adhuc tamen corpore torpente, vbi & gestatio proderit, & frictio, & quælibet lenis corporis agitatio.

De curatione Tabis. Cap. III.

Istos sanè si & tabes male habet, ocyus succurrendum est, ad balneum deducendo, & corpus dimouendo. Tabis quoque lac medella est, & nutritio, & ventris calefactio, & vesicæ lenitio. Quin etiam eadem huic vitio, quæ & catocho, expediunt: similis enim atque eadem est horum morborum species. Castoreum utique istis opportunius est atque lenius & potui datum, & illitum, & in intestinum infusum. Mulieribus autē qualia his similia ab vtero vitia oriantur, in libro De muliebribus morbis à nobis disputabitur.

A De curatione Apoplexię. Cap. III.

A Poplexia validus planè morbus est. nam in omnibus exanimis sunt, quorum & corpus & mens stupet. Si agrotus senex sit (qui bus familiare id vitium est) nō liberatur, & morbi magnitudine & ætatis miseria oppressus. Quibus autem notis morbi magnitudo cōiectanda sit, antea à nobis positum est. Si iuuenis æger sit; debilis est apoplexia, non tamen facile remouetur. Tentanda igitur curatio est. Aequale sanè adiutorium vt pote magno affectui magnum remedium missio sanguinis est: nisi quis plusquàm conueniat, mittendo delinquat.

B modum autem coniectare difficile est: nam si paulò plus detraxeris, hominem planè strangulasti. ad vitam enim tuendam his vel paucus sanguis efficacissimus est: cum sit vitæ corporisq̃ue alimenti fomes. si minus detraxeris, quàm causa postulat; nihil magni per magnum auxilium contuleris: adhuc enim causa permanet. Sed præstat minus detrahendo delinquere: nam si minus detractum esse visum sit, aliqui verò optimi successus apparuerint; iterum venam rescindere cōgruens fuerit: scindenda est autem vena in concauo cubiti. hæc enim in sinistro fluida est. Simul quoque in pusilla apoplexia & resolutæ partes considerandæ sunt, in sinistro ne, an in dextro latere resolutio sit: à salubribus enim partibus (vt dicere mos est) sanguinem haurire oportet. hac enim sanguis faciliè delabitur: hac etiam à læsis partibus materia deriuatur. Igitur si absq; euidenti causa attoniti reddantur; sic de secanda vena ratiocinandum est. At si ab ictu, aut delapsu, aut compressione in hanc labem inciderint, in aliud tempus res differenda est: nonnullis verò ad medelam atque vitam id solum satis fuit. Cæterum si frigiditate multa, & torpore, & sensuum abolitione hominem occupante vena minime scindenda videatur; subluenda alius est: quò multitudo ab intestinis extrahatur (plerunq̃ue enim ex voracitate & crapula in morbum talem prolabantur.) vtq̃ue humores caput occupantes reuellantur.

D Sublutio planè acris esto, pituitam, bilemque subducens. Igitur nitrum solum ne habeto, sed etiam euphorbium trium obolorum pondere, (qui eluēdæ aluo modus vsitatus est:) & cucurbitæ agrestis interanea, aut centaurij comæ decoctum ex oleo, aut aqua. Optima quoque sublutio fuerit, mellis consuetæ portioni ruta adiuncta, & cum vnguine elixa, & terebinthi arboris resina. & sal pro nitro, & hyssopi decoctum. Quòd si per hæc subsidia paulum excitatus homo fuerit, aut febre correptus, aut sensum ab illo marcore suscipiens, aut arteriæ bono pulsu restituto, aut facie vtcunque meliora significante; spes salutis concipiēda est, audaciusque subueniendum. Interim igitur roboratis

viribus, purgatorij medicaminis, quod Sacrum vocāt, ieiunō maxime **E**.
quidem integra potio danda est: si vires prohibeant, dimidium cum
mulsa. & æger in lectica supinus collocatus agitandus est, sensim eum,
qui ferunt, gestantibus; frequenter verò, quò lassitudo arceatur, inter-
quiescat: ac si alius liquida sit, libens admittito: sin secus, aque, aut mul-
sæ cyathos duos potui dato. Sin autem & dum purgatur, nauseabun-
dus sit; id ne prohibeto. nam & illa distentio ad expergefaciendum vi-
gorem quendam præstat, & pituitæ vomitus morbi causam euellit:
sensum verò, & caput, & nervos repurgat sacrum quod vocatur medi-
camen. De qualibet itaque ab initio administranda purgatione satis
differuimus. Totū verò hominem lanis inuolutum oleo ficyonio per-
fundere oportet, aut gleucino veteri, aut singulis seorsum, aut simul **F**
mixtis. Sed optimum fuerit ad conspissanda olea cerę parum colliqua-
re: atque ista nitri ac piperis mixtione valentior reddenda est: sint verò
tenuiter contrita & cribrata. At miram habet vim ad resolutos casto-
reum, & illitum cum aliquo ex antedictis oleis: sed longe potētius est,
si cum mulsa potui detur, portio verò tanta sit, quantam in veteriosis
nouimus. Cōiectare autem oportet & ætatem ægrotantis, & mentem,
an pluribus diebus bibere sit paratus. Nempe inunctiones irrigationi-
bus præstant, facilius feruntur, & magis proficiunt: neque enim dila-
bentes lectum & stragula inquinant; ægrotis verò id inutile est: illæ au- **G**
tem inhærentes corpori in colliquatas partes a calore sorbentur. quin
etiam & ipsarum perpetuitas conducibilis est; nam irrigatio diffluit.
Inunctionum autem materia est, quæcunq; à me supra dicta sunt: cum
ipsis verò castoreum. Accipitur itaq; resina terebinthi arboris, euphor-
bium, limnestis (hoc est adarce) pyrethrum æquis portionibus: piperis,
galbani dimidium, nitri ægyptij triplum, cerę quantum ad liquida cō-
spissanda satis sit. Ceterum medicamina multo magis, quā hæc, varia,
& multo plura seorsum loco suo tradita sunt. Epiplasmata quoque du-
ris distentisque partibus superdanda. Horum sylua est lini semen, fœ-
num græcum, farina ordeï, mel: oleum, vbi ruta, aut anethum incocta **H**
sint: althææ radix pinsita, & in mulsa vsque ad ceræ mollitudinem de-
cocta. Sunt verò & tractabilia, & temperatura suauius. Siquidē adhuc
febre vacant, aut leuiter febricitant, posthabita caloris cura hæc facien-
da sunt: At si febres acutæ sunt, & reliquus morbus his leuior esse vide-
tur, febres verò in discrimen adducunt; ad has & victus rationem, & re-
liquam curationem conuertere oportet. Alimentis itaque summè te-
nuibus, & facilis coctionis vescendum est, atq; opportunitas nunc ma-
gis obseruanda. Et per totam curationem in exacerbationibus subtra-
here, atq; penitus in febres animum intendere oportet. Cū morbus

- A** autem diu trahitur, & caput in causa est; cucurbitula occipitio affigenda, & sanguis largiter hauriendus: plus enim, quàm venæ sectio, proficit, & vires nequaquam labefactat. Sed prius inter scapulas inanem cucurbitulam admoueas: vt in contrarium eius, quæ in occipitio est, succos reuellat. Nempe interdum & gula resoluta est; in qua sola attonitis salutis præsidium collocatur, deuorandis scilicet alimentis, & medicaminibus transmittendis. neque enim inediæ famisque tantummodo periculum instat, verum etiam tussis, difficilis spirationis, atque strangulatus. Nam si quis intra os liquidum cibum infundat; in arteriâ subterlabitur, cum neque tonsillæ ad impulsum ciborum concidant, neque epiglottis in proprium locum subsidat, quæ arteriæ operculum à natura facta est. Quapropter opus est mulsam, aut succum longa mystilla infundentem, supraque arteriam attollentem in gulam demittere: id quoque enim ad deglutendum inseruit. Verum enimuero si ægrotus iam morti proximus sit, ipsius adeo ceruix spiritusque congelascunt. ideo ceruicem & mentum calefactorijs illinito & foueto. Frustra verò laborant, atque imperiti illi sunt, quicunque sub mento cucurbitulam, vt gula dilatetur, affigunt: quandoquidem non dilatatione ad impositionem ciborum, sed ad deglutendum compressione opus est, dilatat autem cucurbitula: & cum deuorare velis, prohibet reuellēs ac retrahens;
- C** cum remittendum potius sit, quò in deuorando cōstrictio fieri possit. Insuper arteriam repleri, vt strangulatio fiat periculum est, neque etiam si hac, & illa in parte gutturis affixeris; quicquā prodest. musculi namque & nerui & tendones & venæ ante ipsum positi sunt. Vesica vtique, & laxum intestinum inter se proxima interdum ad excernendum debilitantur, resoluuntur, recrementorumque semper plena reperiuntur: vesica verò & in maximam molem extumescit. Interdum autem ita resoluuntur, vt purgamenta cōtinere nequeant: per ipsa enim tanquam inanima superuacua delabuntur. Tunc igitur instrumētum, quod Cathetera vocant, in vesicam demittere haud sanè tutum est. ne corrumpatur enim vesica, atque homo conuellatur, discrimen impendet; sed præstiterit cremore haud multo aluum subluere: cumque stercus ab intestino eiectum fuerit, iterum iniiciendum est cum oleo castoreū. Spes autem vnica omnium pariter resolutorum, separatimque singularum partium eo vitio laborantium in oleum infusio fuerit. quomodo verò ipsa administretur, in sermone De diuturnis morbis exponetur.
- D**

De Comitialis accessione. Cap. V.

Comitialis morbi primus casus perniciosus est, si acutè morbus inuadit; nonnunquam enim & vno die hominem perdit. Peri-

culosa etiam sunt per circuitus exacerbationes. vnde factum est, vt in **E** acutorum numerum comitialis morbus poneretur. Quod si malo affueſcat homo, & morbus tenaciter adhærens occupet; non ſolùm diuturnus, verùm etiam nōnullis perpetuus efficitur. nam ſi ætatis florem vigoremque excedit, conſeſcit cum ægro, commoriturque. Quotquot igitur medicamina vt diuturno morbo conueniunt, in ſermone De diuturnis compræhenduntur: quotquot autem ad mortis celeritatem euitandam faciēda ſunt; horum plura in ſermone De attonitis tradidimus, venæ ſectiōes, alui ſublutiones, inunctiōes, cucurbitulas. hæc enim vt homo expergiſcatur, valentiſſimè efficiunt. Quotquot autem prolapſui peculiaria adiutoria inueniuntur, ea in præſentia doce- **F** bimus. Pueris itaque, quibus ex corruptione, aut ex vehementi refrigeratione inuſitata hæc labes inceſſit; vomitus aut cibi, aut pituitæ, aut aliorum quorundam ſuccorum prodeſſe conſueuit. pennæ autem irino vnguento delibutæ nauſeam excitant. veruntamen & irino non vſque ad conuulſiones tonſillæ ſunt illinendæ. Comprimere quoque leniter ilia opus eſt, puerum in ventrem ſuſpenſum conuertendo: hæc enim figura ad vomitum habiliſſima eſt. At ſi vellatur, aut diſtorqueatur inferior maxilla, aut manus & crura iactentur, aut vnà cum toto corpore oculi diſtendantur; manibus perunctis tractando demulcere conuenit: obtorti oculi dirigendi ſunt: rectæ partes ne torqueantur, ſua- **G** uiter continendæ: frigida membra lanis antiquis ſordidis, attritisque panniculis fouenda; ſedem præterea melle cum rutaceo oleo inungito, aut cum nitro, aut refina liquida cum his mixta: hæc quoque leniter intra anum intrudito: flatuſ enim proliciunt. flatuum autem excretio huiuſce morbi in pueris medela eſt. Porro ſi deglutire valeant; pharmacum iſtud exhibendum eſt, cardamomi pars, æris combuſti. & hæc ex mulſa propinato, aut enim euomunt vnà cum humoribus ventriculum infeſtantibus, aut aliud ſubducitur. Optimum quoque eſt huiuſmodi linctuarium, cardamomi, ſinapis, hyſſopi comæ par modus, iridis radicis pars cum nitri duplo, piperis tertia pars: omnia cum **H** melle permisceto, & maxillam diducens in os infundito: interius etiam, quàm vbi ſunt tonſillæ, quò deglutire valeant, iniſcito. Hæc adeo pueris expediunt. Iuuenibus autem & hæc quidem profunt, verùm etiam potentiora hiſ medicamina ad vomitum deligenda ſunt, vt narciſſi bulbi, ſinapis, & hyſſopi pares partes, æris & piperis dimidio minus, quàm priora, cum melle miſcens exhibe. Hæc proſectò ad leuandam exacerbationem abundè fuerint: quæ verò ad propulſandum morbum facient, in ſermone De diuturnis morbis perſequemur.

A De curatione Rigoris, quem Tetanū vocant. Cap. VI.

IN præsentia lectum mollem, tractabilem, læuem, suauem, calidumq;
esse necesse est: neruos enim inflexiles, duros, rigentesque morbus
efficit: quin etiam cutis tota squallens asperaque corpori obtenta est:
palpebræ naturâ versatiles vix oculos conuiuendo protegunt: oculi in
tenti sunt, in profundo conuoluti: necnon & artus sunt deligati, ob di
stentionem immobiles. Aegroti domicilium calidum esto, si æstas sit,
citra sudorem, aut resolutionem: ad syncopam enim morbus inclinat.
Neq; verò ad alia magna remedia cunctâter accedendum: haud enim
B differendi datur occasio. Quapropter siue ob refrigerationem absque
manifesta causâ rigor inuaserit, siue ex vulnere, siue ex abortu mulie
ri inceserit; venam in cubito rescindito: curans in deligando brachio
laxiorem compressionem fieri, sectionemque leniter & facile expedi
ri: siquidem ista neruorum cōuulsiones cient. Semel etiam cruor citra
defectum animæ frigusq; extremorum mediocriter effundatur. Neq;
inedia æger maceretur: res enim frigida siccaque fames est. Propinetur
itaque mulsæ spissæ meracior, & ptisanæ cremor cum melle. Ista nanq;
& tonsillis comprimendo minimum dolorem inferunt, & gulæ de
glutiendo lenia sunt & facilia, & ad molliendam aluum mollissima,
C & ad vires instaurandas valentissima. Omne corpus lanis inuoluito
oleo gleucino, aut crocino madentibus, in quibus aut rosmarinus, aut
conyza, aut artemisia incocta sit: atq; omnia & facultate & ad tactum
calida sunt. Oblinere autem corpus vnguine conuenit, quod ex lim
nestide, (quam adarccem esse putamus,) quod in stagnis nascitur, & eu
phorbio, & nitro, & pyrethro conflatum est: his verò & multum ca
storei adijciatur. Bene quoque fuerit tendones lanis contegere, & se
cundum aurem & mentum loca perungere. nam partes hæ maximè
patiuntur ac distenduntur. Præterea leuibus calefactorijs fouendi sunt
tendones & vesica per sacculos millium torrefactum includentes, aut
D bubulas vesicas olei calidi semiplenas: quò locis, quæ fouentur, secun
dum latitudinem applicari valeant. Interdum coegit necessitas, vt ca
piti fomenta adhiberentur: quod neque sensibus vsq; adeo tutum est,
neq; neruis salutare. sensibus enim quandam caliginem effundit mul
tis halitibus ipsos petentibus: neruos autem replet. Quo circa modo
fouendi quam tutissimo vtendus est, atque materia haud ita multum
foedè olens deligenda. vtique materia esto oleum in vesicis in duplici
vase citra nidorem feruefactum: aut sales tenues in sacculo. millium
enim ac lini semen tactu quidē lenia sunt, sed halituosa & graueolen
tia. Ratio verò fouendi huiusmodi esto. tendonibus resupinato ægro

A R E T A E I

fomenta vsque ad verticem subiicienda sunt: vltcrius verò ad synciput **E**
 ne procedito. Iste nanque locus omnibus sensibus communis est: ab ip
 soque, tanquam ex fonte omnia adiumenta, omnes noxæ scaturiunt.
 Quòd si epiplasmata tendonibus superdanda sunt; erectum occipi-
 cium esto: nam si magis sursum versus imposueris, caput exhalationi-
 bus complebis. Materia sit autem epiplasmatum lini & fœnigræci se-
 mina. Post epiplasmata verò utilis fuerit cucurbitula occipitio ab vtro
 que spinæ latere adhibita. Sed parce admodum flamma accendatur:
 nam quæ ab labris cucurbitulæ fit circumpressio, doloris conuulsio-
 nisque autor esse solet. Igitur diutius trahere præstat, ac molliter ma-
 gis, quàm plurimum breui tempore. sic enim tibi in conuexum locus **F**
 sine dolore attolletur, qui cõcidendus est. Scopus autem modi sangui-
 nis extrahendi tibi vires ægrotantis proponantur. Hæc vtique rigori-
 bus, qui sine vlceribus fiunt, remedia conueniunt. At si ex vulnere cõ-
 uulsio facta sit; perniciosum profectò id est, ægreque de salute sperari
 potest: nihilominus tamen opem ferre decet: quandoquidem nonnul-
 li et adhibitis remedijs mortem euitarunt. Oportet sanè vltra ceteram
 medelam & vlceribus consulere cum calefacientibus, quæcunq; a me
 iam dicta sunt, irrigando, & totibus & cataplasmatibus & medicamen-
 tis, quæcunque & facilè calorem excitent, & humectando pus abun-
 dè moueant. Vlcera enim in rigore sicca & squallida sunt. Accipito er **G**
 go thuris mannam, polij comam, terebinthi piniq; arborum resinam,
 althææ radicem, & rutam conyzamque herbam: hæc in cataplasmatibus
 commiscere opus est, alia liquando, alia, quæ puluerca sunt, inspergen-
 do, alia in oleo prius macerando. althæam verò in mulsa ante contu-
 sam decoquito. Inspergendum est etiam vlceri castoreum: neque exi-
 guus inde in totum corpus calor emanabit. Horrores enim ab vlceri-
 bus prodeuntes malefici sunt. Perungendæ quoque sunt nares casto-
 reo cum crocino vnguento permixto: quin etiam castoreū trium obo-
 lorum pondere assiduè bibere expediet. verum si ab hac potione gula
 laboret; interijcienda est laserpitij radice exhibitio ponderis tanti, **H**
 quanti & castoreum dandum esse diximus: aut myrrhæ dimidio mi-
 nus, quàm laserpitium. sed omnia cum mulsa potanda præbeantur.
 Quòd si cyrenaici laserpitij lachrymæ copia tibi fiat; hæc opus est mel-
 le cocto inuolutam ad erui magnitudinem deuorādā dare. ita enim
 optimum factu est, quò palatum præteriens ægrotum lateat; acris est
 enim, ructumque insuauis ac foedè olens excitat. si neque hac ratione
 deuorari possit, in mulsa eliquata propinetur. Omnibus enim potioni-
 bus, quæcunque calefacere, humectare, distentionem laxare, & nervos
 remollire aptæ sunt; hæc haud dubiè valétior est. Cæterū si nihil egroti
 deglutiant,

A deglutiant, in anum castoreum cum oleo dandum est: hoc etiam anus cum vngvine aut melle illinendus: hoc item vesica irriganda, & cum cera, vt crassius reddatur, perungenda. Sin autem flatum stercusq; educendi tempus adsit; purgatorij, quod Hieram, id est, Sacram vocant, drachmas duas cum mulsâ, & oleo in sedem inijcito. Nam præterquâ quòd illa euocat; intestinum etiam & inferiorem ventrem calefacit ac fouet. varium nanque & calidum medicamentum hiera est.

De curatione Anginæ. Cap. VII.

B **D**Væ anginæ species reperiuntur, Altera cum caliditate, & magna tonsillarum inflatione, & extrorsum versus tumefactione: quin etiam lingua, gurgulio, & omnes adiacentes particulae in tumorem efferuntur: Altera istis locis collapsis, & submissis efficitur: sed interius compressio maiore strangulatu discruciat: vt interna inflammatio ad cor vsque pertinere videatur. Huic quàm celerrime occurrendum est, nam & hac celerrime ægroti rapiuntur. Igitur si crapula, & ebrietas in causa sunt; eodem die inferius humorem inijcito. isque duorum generum sit, alter vsitatus, quò stercora educantur: alter eiusmodi, vt aliquas à tonsillis pectoreque humiditates euellere possit. neque tamen in cæteris efficacior meraciorque esto: sed centaurij & hyssopi

C decocta infundenda sunt. hæc enim & pituitam educere solent. Si tenuis autem victus præcesserit; scindere cubiti venam expediet: & latior sectio, quò maiore cum impetu, copiosiorque sanguis emanet, facienda est. Huiusmodi nanq; profusio minime quidem ad caliditatem mitigandam satis est: sed strangulatum soluere, & reliqua omnia diminueri valet. Haud ignobile quoque adiuumentum præstat, si ad animæ vsque defectum ægrum perduxeris vsq; eò tamen, dum ne anima deficiat. quandoquidem nonnulli secta vena ab animi deliquio vita excessere. Item vinctis supra talos & genua constringentes opitulabimur.

D Optima quoque sunt vincula supra brachialia versus cubitos, & supra cubitos versus humeros. At si deglutiendi via expeditissima sit; elaterium & cum mulsâ, & cum sero lactis, quantum ad purgandum hominem satis sit, præbeatur. alijs enim purgatorijs elaterium in his ægrotis præstantius est. Cōferunt etiam cneorum seu thymelæa, & sinapi: si quidem hæc ambo ventrem repurgant. In quibus verò inflationes deuotionem impediunt; linguam ad palatum reflectens, ipsius venas rescindito. quòd si promptè multusq; sanguis defluat; inter alia remedia hoc magis proderit. Irrigationes utiq; locis inflammatis primum quidem adstringentes, quò retrorsum materiæ labantur, conueniunt. quam ob rem lanæ fordida cum œsypo vino madentes, aut oleo ex immaturis

oliuis expreffo accipiantur. Quin etiam cataplafmata irrigationibus fi- E
 milia funto, exempli caufa palmulæ vino madefactæ tunfæque cum ro-
 farum folijs. quò fit autem vifcidum & molle cataplafma; etiam orde-
 farina admifceatur: aut lini fermen, & mel, & oleum: vt omnium mix-
 tura fiat. Quòd fi ad fuppurationem veniat; calida admouenda funt:
 quibus & in altera anginae fpecie vtendum eft. adefto igitur fœnigræci
 farina, & manna, & refina, quæ liquari poffunt: & polij coma infperga-
 tur. necnon & fomentum calidum adhibeatur fpongijs in decocto lau-
 ri baccarum hyffopi que madentibus. Ad mouendum pus autem effi-
 caciffimum eft columbinus, fimus tenuiter per criferam, id eft, lineum F
 facculum inftar pulueris tranfmiffus, ac fuper infperfus. idem & cani-
 nus eodẽ modo præftat. Ex mulfa verò cum lentis, aut hyffopi, aut ro-
 farum, aut palmularum, aut fimul omnium decocto collutiones fiant.
 Illinendum præterea totum os eft vfque ad intimas fauces fimplicibus
 quidem, vt mororum, aut malorum punicorum aqua maceratorum
 fucco, aut palmularum decocto: compositis verò medicamētis, vt Dia-
 moro, quod vocant, aut eo, quod ex Befafa, id eft, ruta fylueftri, & fuc-
 co rhoi componitur: aut Diachelidonio, id eft, ex hirundinibus confe-
 cto medicamento. Sin vlcera cruftofa fint; collutiones & gargarifmi
 fiant ex hyffopi in mulfa, aut pinguium ficorum in aqua decocto: præ- G
 ter hæc amyllum percolatũ in mulfa, aut in ptifanae tragiue cremore.
 Si Angina cum concidentia, quæ erat altera fpecies, occupet; ab inte-
 rioribus extrorfum omnia euocanda funt, & humores, & caliditas, &
 omnis caro, vt totum foras extumeat. Proinde calidæ irrigationes fun-
 to cum ruta, & anetho, nitro infperfo: Et cum his fuperius memorata
 cataplafmata. Proficit etiam ceratum ex nitro & finapi ad calorem ex-
 citandum fuperdare: calor autem exterior huiusmodi vitium tollit, fed
 in collo tumor extuberat. Tumor autem foras in fublime elatus à pul-
 monis inflammatione liberat, intus verò abditus anginam patientibus
 perniciofum malum eft. At quicunque ftrangulationem ab angina ve-
 rentes, quò laxius fpiritus duceretur, arteriam fecuerunt; non fanè ex- H
 perimento rem comprobaffe videntur. Quippe caliditas inflammatio-
 nis maior ex vulnere efficitur, ftrangulatum adauget, tuſſimque com-
 mouet. Quin etiam, fi alioqui periculum id euaserint; vulneris oræ in
 vnum coaleſcere nequeunt: ambæ enim cartilagineæ, atque inter fe in-
 glutinabiles funt.

De Curatione columellæ. Cap. VIII.

Vitiorum, quotquot columellam infeſtāt, Aliqua per ſuccifione
 curare neceſſe eſt: ſed de eorum chirurgia diſputare ad præſen-

- A**tem locum non attinet: Aliqua, vtpote acuta, medicamentis sananda sunt. nam facile strangulant, & difficultate spiritus aliqua istorum hominem perimunt. Talis est vtique, quā Vuam, & quam Columnam dicimus: vtrique enim cum inflammatione, crassitie, longitudineque suboritur. ita, vt in arteriam pendulæ fiat. Aequabili sanè crassitudine à basi ad summum vsque palatum columna, inæquali verò vua constat. huius enim ad palatum basis gracilis est, in extremo teres et crassa, rubēs aut liuida. iccirco & Vuæ appellationem id vitium sortitum est. Quapropter his maturè opem ferre decet: celerrima nanque à strangulatu perniciēs impendet. Proinde si ægroti iuuenes sunt, à vena cubiti
- B** sanguis detrahendus est: vtque largius euacuetur, maiore plaga vena aperiatur. siquidem huiusmodi sanguinis detractio à strangulatu, tanquam à laqueo, ægrotantem liberat. Subluenda quoque alius est mitiori lotionē primum: deinde aliàs, atque aliàs acriore, vsq; eò, dum aliquid à superioribus partibus deriuetur. Circumdentur & vincula adstringentia extremis cruribus supra malleolos & genua: necnon & humeris supra brachialia atq; cubitos. Quòd si strangulatio inualeſcat; cucurbitula occipitio atque pectori adglutinetur. & istarum aliqua incidatur: omniaque administrentur, quæcunq; à me in capite De angina præcepta sunt: cum eadem in vtroque vitio sit mortis ratio. Iisdem præterea intra os medicamentis & adstringentibus & mollientibus, & exteriori fotu, & cataplasmatibus, & oris inunctionibus vtendum est. Circum columnam verò, aut circum vuam adstrictoritim rhoi succum, acaciam melle aut aqua dissolutam, hypocisthida, terram famiā, lemniamue, aut sinopicam rubricam, atque omphacium ponito. Si vlcerosa sit vua; gummi & amyllum rosarum aut palmularum decocto liquefacta: item ptisanæ aut tragi cremor adhibeantur. At in columnæ curatione aliquanto plus valentiorum medicaminum adijcito; quæ ex myrrha, costo, atq; cypero componantur. Nam id genus acria columna tolerat. Verum si nonnullis locus iste purulētus effectus est, atq; palati ossa computruerunt; hi longo temporis interuallo vitam finiunt.
- D** Sed horum auxilia nobis alio loco præcipientur.

De Curatiōe pestilētiū in faucibus morborū. Cap. IX.

Horum vitiorum curatio cum alijs tonsillarū affectibus qua cōmunis est, qua propria. In inflammatione & strangulatu purgatio per clysteres, venæ sectio, irrigationes, cataplasmata, fotus, deligationes, cucurbitulæ, omnia demum eadem, atq; in his, conueniunt. Illi tiones autem acriorum medicamentorum faciendæ sunt: neque enim vlcerà quiescunt, neq; crustæ in superficie sunt. Verum si ab his sanies

ad interiora destillet: celeriter partes, etiam si integræ erant, vlcera- **E**
 tur: celerrimeque vlcera interius depascendo serpunt, atque hominem
 perimunt. Porro igne vitium adurere, cum in superiori parte sit; im-
 prudentis esse propter Isthmum iudico. Sed medicamentis igni simili-
 bus, quò & depastio coerceatur, et crustæ decidant; vtendum præcipio,
 Ea verò sunt alumen cum melle, galla, balauftium arida cum mulla.
 Hæc eadem calamo, aut penna, aut crasso & oblongo caule, quò medi-
 camina ad vlcera perueniant; inspiranda sunt. Optima sanè est & chal-
 citis vsta cum trita cadmia ex aceto. esto autem cadmia portione du-
 pla: & rhei radix cum aliquo humore. Præterea ne vlcerum compres-
 sio fiat, cauendum est: ab ea nanque & humescunt, & magis exedunt.
 Hac de causa opus est pinna medicamenta arida inspergere: liquida ve **F**
 rò liquentissima reddentem in gurgulionem infundere. At si crustæ
 iam resoluuntur, & vlcera rubida fiunt; tunc conuulsionis maximè pe-
 riculum subest. resiccantur enim plerunque vlcera, & cum his nervi di-
 stenduntur. Itaque lacte cum amylo, & succo ptisanæ, aut tragi, aut li-
 ni seminis, aut fœnigræci remollire madefacereque conuenit. Quibus-
 dam & columella vsque ad palati os exesa est: quin etiam tonsillæ ad ba-
 sim vsque & epiglottida. ac propter cicatricem deuorare neque soli-
 dum quicquam, neque liquidum poterant. Sed & ipsum, quod bibe-
 bat, interdum percussus hominem fame necauit.

De curatione Pleuritidis, seu morbi lateralis. Cap. X. **G.**

N Vlla moræ atque dilationis in pleuriticis, quin protinus valen-
 ti remedio succurramus, datur occasio. Febris enim peracuta
 ad perniciem properat: dolor quoque, succingentis membranæ in peius
 vrget: necnon & tussis pectus caputque concutiens vires proterit. Quo-
 circa eodem potissimum die vena cædenda est. Sin autem ex ingurgi-
 tatione ciborum potusque ægritudo prouenerit; inedia diem vnum
 ægroto imperanda. post, sanguinem à vena mittito, quæ in cauo cubiti
 est, non eius, qui secundum rectum incessum inflammatis costis oppo-
 nitur: præstat enim maximè procul abducere. Sanguinem verò ne vsque **H**
 ad animæ deliquium fundito: nam si refrigeratum corpus animo desti-
 tuitur; pulmoniam inuadere periculum est. Humores enim exteriori
 caliditate attractioneque priuati, in penitiores partes relabuntur. Item
 pulmo rarus, calidus, ad trahendumque valentissimus est: costis etiam
 proximus, earumque doloris est particeps. Verùm morbi pulmonis pleu-
 ritidi succedentes non vsque quaque salubres sunt: Pleuritis verò à pul-
 monis vomica exoriens benignior est. Quapropter cum mediocriter
 sanguis effluxerit; interiecto ad recreandum hominem temporis spa-

- A** tio, iterum detrahare opus est: si bene quidem habeat, eodem die, cum longa remissio fit: sin minus, postridie. Quod si neque febris remittat, (sæpe enim diem vnum febris occupat, & augetur,) tertio die in secunda remissione, in qua & cibi dandi sunt; sangninem mitte: totum hominem vberius perungens, costisque oleum molle infundens cum calido vngvine ex rutæ anethiue decocto. Ipsum verò latus admodum leniter irrigandum est. sed nonnullis & dolor & inflammatio erupit, vt eorum locorum affectus esse videretur: cum tamen id interiorum vitiorum incrementum sit. At in præsentia de alimonia, quemadmodum & de vniuersa curatione, quò nihil in ea delinquatur; sermonem habeamus. in alimentis enim medicamenta ponentur: quin immo in alimentis medicamenta sunt. Itaque genere calidus humidusque cibus esto, lenis, æquabilis, migmatodes, id est, bene permixtus, dissolutorius: pituitam soluendi, extenuandi que potestatem habens. Proinde cibarijs omnibus ptisana anteponatur; initio quidem, quò ipsius crassamentum solidumque reijciatur, in cremorem percoletur, soloque cum melle condiaur. ab ipsa verò vsitata ad voluptatem varietatemque parandam medicamina remoueantur: in hac enim ægritudine solus cremor satis est. Quippe humectare, calefacere, pituitam soluere & detergere, per superiora sine molestia, quæcunque euocanda sunt, euocare, facile quoque ventrem ducere sola ptisana potest. Ipsius verò lenitas blanda est & ad deuorandum habilis. ipsius etiam lentor caliditates mitigat, membranas mundat, tussés concoquit, omnia emollit: tales ordei virtutes sunt. Halica verò secundum gradum occupat: quæ cum pauca quædam cum ptisana communia possideat: ob ea probatur, optimaque censetur. Lentor enim, lenitas, suauitasque in deuorando vtrique communia sunt: in cæteris omnibus halicam ptisana antecellit: sed ea quoque simplex cum melle solo conficiatur. Tragi præterea boni sunt. Deterior ipsis oryza est: quoniam ficcet & exasperat: potiusque costarum purgationem supprimit, quàm facilem reddit. Optimus quoque est panis aridus, contusus, per subcuniculum transmissus, bene temperatus, concoctu facilis: cum mulsæ, quantum satis est, alimenti præbet. Nempè si iam diu morbus produci tur, cum dictisque cibarijs homo labare coepit: ptisana ex ordeo præbeatur bene trita, bene cocta: condiaur verò anetho, sale, & oleo tenui, puro, non viscido, non exasperante. At non multum olei cum ptisana coquere præstat. nam & sorbitionem pinguem reddit, & prauitatem oleum deponit: longa enim decoctione in cremorem ordeï absorptum amplius non apparet. Item porrum cum sua coma, & amygdala amara cum cremore incoquantur. Ita nanque ferculum ad spirationem expediendam commodum me-

A R E T A E I

dicamentosumque ab his efficitur. Porri autem cum cremore comesti E
 vtilitatem iuxta delectationemque summam afferunt. Iam verò et ouo
 rum bonum succum creantium opportunitas adest. ac si humida co-
 piofaque per os materia feratur; sulfur ignem non expertum nitrumque
 in oua inspergito. Sed mirifice profunt oua nup à gallina edita ex igne
 igne carentia: quippe à matre caliditas inest igne quidē humidior, sed
 ægrotanti familiarior, vtpote animali ab animali. Sin autem pituita
 glutinosa ac tenax sit; in oua oleum infundito, ac resinam siccam pi-
 neam, quò sulfur melius reddatur, inspergito: necnon & terebinthi re-
 sinam eliquato. Piper præterea in ouis, in ptisana, in omnibus epulis, &
 quæcunque piperi similia sunt, benè proficiunt. Inter carnes extremi F
 pedes in cremoribus eliquati, columbæ, gallinæ elixæ, porcorum cere-
 bra cum omento quidem tosta, sine illo verò nidore vacantia. Si inter
 spirandum æger strepitum non reddit; dandi sunt etiam marini pisces
 aut saxatiles, quicquid optimum regio ferat. Verum vt nequæ cupidita-
 te delinquat, neque victus tenuitate contabescat; ex fructibus malum
 concedito in aqua, aut mulsa elixum, aut cum adipe assatum: sed co-
 rium & interiora aspera cum seminibus abijciantur. Tempore quoque
 illo, quod Horam græci nominant; fici, & alij id genus fructus conce-
 dantur: quatenus, scilicet, innoxij sunt, quin potius adiuumentum præ-
 stant. Hæc sanè de alimentis abundè sint. Lateri autem lanæ superden- G
 tur sulfure fumigatæ, vngvine imbutæ, in quo anethum rutæ inco-
 cta sit. Iugiter his latus madefaciendum, cataplasmatisque ante cibi as-
 sumptionem tegendum est. præter vsitata cataplasmata fertulam in
 mulsa elixam accipito, cui papaueris carnem incoctam commisceto,
 manne quoque puluisculum inspergito. At si humidius sputum copio-
 sumque reijcitur; lolij farina, aut irionis commiscenda est, & nitrum
 inspergendum. Cæterum si morbus productior fit, dolor est pertinax,
 & humida fit expurgatio; tunc purulentum hominem fore speratur.
 itaque sinapi & cachrys cataplasmatibus admiscenda sunt. Sed si penitio-
 res locos ægroti frigidus esse persentiunt; acetum affundito. illud au- H
 tem efficere operæ precium est, vt cataplasmatum calor diu efficax per-
 maneat. melior est enim id genus caliditas, quàm cataplasmatum inno-
 uatio. Proinde calefactiones in sacculis ex huiusmodi, vtpote ex millio
 fiant, aut ex calenti oleo in vesica incluso. Omnis verò fœtus machina-
 tio, ne pondera dolori dolorem adijciant, levis esto. his enim leuibus
 & assumpto cibo, cum dolor infestat, vti nihil prohibet. Iam verò post
 hæc etiam adimouendæ cucurbitulæ occasio adest: Sed hoc post septi-
 mum diem facere optimum fuerit: ante ne festines. haud enim placidi
 morbi sunt, quicunque ante septimum cucurbitam requirunt. esto au-

- A**tem magna, omni ex parte lata, dolentem locum ambire valens. quippe cum haud interius descendat dolor, sed in latitudinem diffusus sit. At flamma sub cucurbita multa esto: quò non solum attrahat, verum etiam ante ignis extinctionem calefaciat. Extincto igne scarificandum est, tantumque sanguinis, quantum vires permittunt, detrahendum. multo verò plus esto, quam si alia de causa de præcordijs sanguinem haurires. nam maximè perspicuum est, quod in lateris morbo vexatis à cucurbita percipitur adiumentum. Sal quidem, aut nitrum in scarificationibus mordacia sunt ac dolorifica, sed salutaria. Quapropter considerandæ sunt hominis vires & ingenium: nam si forti animo ac tolerans sit, sal inspergendus est, non ipsis vulneribus ita, vt ipsa contingat: sed super linteolum oleo madidum inspergatur. id verò super locum scarificatum extendito: humiditates enim ex salis colliquatione manantes minus, quam sal, mordaces sunt. Sed multo oleo perfundendum linteolum est, quò huius lenitate morsionis dolor retundatur. Secundo die autem cucurbitam affigere mirificè iuuat: vt ex vulneribus tenuis quædam sanies extrahatur. id verò priore cucurbita multo est efficacius, multoque magis vires conseruat: neque enim sanguis, aut alimentum, sed sanies emanat. Atq; id quidem facito, cum prius vires exquisitè perpenderis. Die tertio ceratum cum cyprino oleo & rutaceo imponito. Quòd si vltèrius purgatione sputa indigeant; in ceratis resinam eliquato, aut sulfur ignem nõ expertum admisceto; atque iterum folum loco adhibeto. Porro modus cucurbitæ talis esto. fictile vas habendum est, leue, lateri congruens, latum: aut æneum. Id pronum in labra dolentibus locis circumponito: flammam verò multam cum oleo subiicito, quò viuens flamma in longum tempus sufficiat. Vasculi autem oras carni ne imprimito, sed ad difflationem transitus aliquis esto quò minus suffocata flamma extinguatur. diutius verò illam accendere expedit: nam intra vas illud inclusa caliditas optimum fomentum est, & bona sudoris prouocatio. Neq; verò medelam inferioribus partibus adhibendam negligere oportet: viris quidem in anum rutaceum oleum, mulieribus autem & in vterum infundendum est. Perpetuò sanè quæ bibuntur, ac deuorantur, sunt multa cum ruta & succo ptisanæ, si continenter tussit: vt in alimento medicamentum sit. Verum si nondum alimenti præbendi tempus adsit, aliquod compositum, quod Picærium græci dicunt, accipiatur ex varijs constans, cum melle ad consistentiam decoctum. Globulos autem fabæ magnitudinem equantes, turbatosque dare oportet sub lingua continendos, huc atque illuc iactandos: vt non deuorabile, sed eliquabile sit. Suaue quoq; est id, quod ex papauere cum melle ac fertula campana medicamen cõficitur lene,

A R E T A E I

atque somniferum. Hæc utique & ante cibi assumptionem, & assum- **E**
 pto cibo, & post somnum ipsum præbenda sunt; sed ieiuno medicamē-
 tosa exhibeantur: Quale est, quod hæc accipit, urtica, lini seminis, amy-
 li, nucis pineæ, cuiusq; contriti cyathum, amygdala amara numero vi-
 gintiquinque, totidem & piperis grana. oportet autem hæc torrere, ac
 trita cum melle ad eclegmatis temperaturam permiscere. horum de-
 tur mystillæ una. si liquida crudaq; excreat, myrrhæ pondo drachmas
 duas, croci pondo drachmam unam, piperis grana quindecim, cum
 mellis pondo libra subigito. id sanè medicamentum & ante cibi acce-
 ptionem mystillæ dimidiatæ mensura dari debet. bene facit in longo la-
 teris morbo, quando & oxymel dare convenit, si spirandi urgeat diffi- **F**
 cultas. Frigidam verò aquam quicumque medici pleuriticis concesserunt;
 neque qua ratione id fecerint, assequi valeo, neque experimento
 confirmare. quippe si qui à frigida periculum euitarunt; hi profectò mi-
 hi non laborare pleuritide visi sunt. Verùm apud vetustiores etiam me-
 dicos species quædam concursus pleuritis, seu Lateralis morbus voca-
 batur: cum bilis esset excretio, cum dolore lateris, & exigua febre, vel
 etiam sine febre. Huiusmodi sanè affectus nomen quidem pleuritidis,
 rem verò nō obtinet. Quin etiam spiritus nonnunquam in latere con-
 clusus sitim, dolorem prauum, mollemq; caliditatem excitat: id quoq;
 vitium ignari homines Pleuritim nuncuparūt. His nempè frigida aqua **G**
 remedio esse poterit, cum prospera ventis fortuna extincta sitis erit, bi-
 lis ac spiritus per inferiora subducetur, & dolor & caliditas exhalabūt.
 Verum in lateris inflammatione & succingentis membranæ tumore
 non solum frigida aqua, sed etiam frigida respiratio noxia est. Itaq;
 si ex prius tradita medendi ratione incolumes redduntur pleu-
 ritici, paulum tamen adhuc tussunt, & caliditas subinde
 repetit, atque infestat; ad hæc penitus discutienda
 maturandum est. aut enim quæ relinquin-
 tur, recidivas faciunt, aut ad suppura-
 tionem conuertuntur. **H**

ARETAEI CAPPADOCIS

DE ACUTIS MOR-

BIS CURANDIS,

Liber Secundus.

IVNIO PAVLO CRASSO PATAVINO

INTERPRETE.

Curatio Pulmonariæ.	Cap. I.
Curatio Reiectionis sanguinis.	Cap. II.
Curatio Cardiæ Affectus.	Cap. III.
Curatio Cholerae.	Cap. IIII.
Curatio Voluuli.	Cap. V.
Curatio Acutorum Iecoris Affectuum.	Cap. VI.
Curatio Acuti morbi Venæ & arteriæ dorsi.	Cap. VII.
Curatio Acuti Renum morbi.	Cap. VIII.
Curatio Acutorum Vesicæ vitiorum.	Cap. IX.
Curatio Vulvæ strangulatus.	Cap. X.
Curatio Satyriasis.	Cap. XI.

Curatio Pulmonariæ. Cap. I.

A **I** Eracutum letaleque malum est inflammatio repletioq;
pulmonis: quas strangulatus brevis consequitur. Igitur
æquis resistantia viribus, matureque ferenda subsidia
sunt. protinus in cubito venæ aperiuntur, siue vtraque,
in dextra videlicet, ac leua manu, idque potius: siue vna
tantum, & ea maior. quò ab vtraque pulmonis regione humiditatum
reuulsio, non tamen vsq; ad animi deliquium fiat: strangulatum enim
animi deliquium auget. Cæterum si vel paulum respirauerit; tunc sup-
primendus sanguis est, ac denuò postea mittendus. nam si à sanguine
morbi causæ prouenerint; eas venæ sectio tollit. Atqui seu pituita, seu
B spuma, seu quæuis alia humiditas tumefaciat; venarum inanitiones
ampliores pulmonis locum ad respirationis transitum efficiunt. opus
est autem humores & flatus post venæ sectionem deorsum versus tra-
here, nitro, melle, ruta, resina terebinthi liquida sedem oblinendo. sed
missionis sanguinis loco, si quod maius impedimentum sit, acrem suc-
cum per clysterem in sedem immittito: vt puta, salem cum nitro, aut
terebinthi resinam cum melle. Ruta quoque in oleo, & hyssopum in

aqua decocta: Item cucurbitæ syluaticæ carnes interiores in aqua exco E
 cte conueniunt. Præterea inanes cucurbitulæ egregiè faciunt, si tergo,
 dorso præcordiisque vbique adhibeantur. quod sicubi pectus carnu-
 lentum sit, quò minus circum ossa cutim cucurbitula incumbens affli-
 gat; ibi eam affigito. nam si ad quancunque partem corporis humores
 distrahantur, & spiritus ad extima euocetur, quibus pulmo opprimi-
 tur; aliquod mali solamen inuenias. omni enim ex parte Pulmonaria
 obsidenda impugnandaque est. Verùm neq; vllum ex his medicamen-
 tis, quæ ore sumpta conducunt, despiciendum est. quippe ea est natura
 pulmonis, vt siue recte valeat, siue egrotet; ad se humores alliciat. Quo
 circa eiusmodi medicamenta præbeantur, quæ humores ad transpiran F
 dum attenuent, lubricos fluxilesque ad extrudendum efficiant. Propi-
 netur quidem celeriter iuuandi causa nitrum cum hyssopi decocto,
 aut muria cum aceto & melle, aut sinapi humidum cum mulsâ. singu-
 lis autem iridis radicem & piper inspergere auso benè cedit. item hæc
 arida cribrato, et cum melle exhibeto. Quòd si interdium insomnes sint,
 & noctem quoque totam peruigilent, ne hominem furor corripiat,
 metus est: varijsque somnificis medicamentis, nisi ægritudo remittat,
 vti decet: quò medicamenta in tempore data morbi acerbitatē leniant
 & obtundant. multa verò soporifera sunt. At si in strangulationis im-
 petu, iamque aduentante interitu medicamen præbeas; apud tuos con G
 tribules mortis eius autor appellaberis. Alimenta pariter eiusmodi ef-
 se debent, acria, videlicet tenuia, crassitudinem dissipantia, extergen-
 dique facultatem habentia: Inter olera porrum, aut cornicis pes, aut vr-
 tica, aut brassica in aceto incocta. Inter frumentacea verò ptisanæ cre-
 mor parum origani, aut hyssopi, necnon piperis, sed plus nitri loco fa-
 lis accipiens. Alica præterea mulsæ incocta prodest. Omniaque per eli-
 xationem flatum abijciant: flatus enim vomica pulmonis laborantibus
 infesti sunt. Vinum, si febre vacant, quod haud ita multum adstringat,
 potui detur: quippe densat corpora adstrictio: Istis verò membra potius H
 laxanda sunt, sputique educationi studendum. Sed in totum potus mo-
 dicus esto, cum pulmoni madefactio inimica sit: quoniam à gula atq;
 ventriculo trahit. Thorax autem lanis oleo imbutis cum nitro, aut sale
 contegatur. Optima inunctio est ea, quæ ex adarce fit. Sinapi etiam ari-
 dum, & cum cerato humido prodest. Atque in summa & humores &
 calor, & spiritus foràs educendi sunt. Huic rei opitulantur acrium olfa-
 ctus atque illitio, & extremorum deligatio. Hæc facienti
 nisi morbus cedat, de hominis valetudine
 actum est.

A De sanguinis Reiectionis curatione. Cap. II.

OMnes sanguinis effusiones haud mite vitium sunt, non modicum solum ratione, ut si per fracturam, aut erosionem, verum etiam si per rarefactionem effunditur. neque si ex pectore, aut pulmonibus, aut stomacho, aut iecore fertur, periculosum est, è capite verò si defluit, minorem noxam affert: sanguinis enim exitus est: sanguis autem omnium est alimentum, omnium calor, omnium color. terroremque incutit, sanguinem ab ore utcumque manantem intueri. malumque est, si à primario viscere: peius verò si ob fracturam, aut erosionem profunditur.

B Huius itaque vitij medicus ad opem ferendam maturet, necesse est. In primis quidem aerem frigidiorē ad respirationem deligito, conclaue non titubans, cubile firmum, quò nullam in partem quatiatur, inhabitet: cōcussiones enim malum exasperant, stratum solidum, haud multum cedens, neque profundum, neque calidum esto. positus figurae corporis erecta sit. ne sermocinetur, nèue sermones audiant. animi absit perturbatio, sed contrà oblectamentis leniatur: siquidem id genus ægrotos magna animi consternatio corripit. quis enim vomens sanguinem mortem instantem non perhorrescat? Igitur si sanguine referti sunt, & venas prominentes habent; in qualibet sanguinis profusione venam pertundito. nam siue ex fractura, siue ex erosione profluit, sectio venæ conducit. Sin rarefactio in causa est; ne multitudo venam effringat, metuendum. cædenda est autem caua incubito vena. Etenim ex hac facile sanguis effluit, & ipsa sectioni exposita est: utque per plures dies sanguis innoxie decurrat, commodè aperta seruetur. in omnibus autem omnium (ut ita dicam,) præcipuorum viscerum hæc est sanguinis via. vena utique hac superior, necnon & hæc vnius in brachio venæ ambæ propagines sunt. quare nihilo plus superior, quàm media emolumenti affert. nam propaginum ignari sunt, quotquot stomacho & iecori superiorem venam copularunt. Sin à liene sanguis fertur, sinistræ manus venam illam, quæ inter minimum anularemque digitum sita est, rescindito: quandoquidem medicorum nonnulli eam ad lienem usque pertinere arbitrantur. verum & hæc ipsa inter cubiti venas inferioris propago est. cur itaque potius eam quis propè digitos, quàm in cubiti curuatura proscindat, cum hoc in loco amplior sit, & ad effluxum habilior? Porro si quis ante animæ defectum sanguis cohibendus est, atque haud ita multus auferendus: nam & ipsa cruoris per os effusio satis hominem labefactare potest. assidue verò post paucum detractum sanguinem iterum detrahito & eodem die, & postridie, necnon & perendie. At si egrotus tenuis, & inops sanguinis sit, venam

ne scindito. hæc de sanguinis missione abundè sint. Succurrendum est **E** etiam extremorum deligaturis, pedum quidem supra malleolos & genua, manuum verò supra brachiale & cubitum fascia ipsa lata sit, quò sit validior, neq; dolorem moueat constrictio. Nempe locis, vnde sanguis erumpit, lanas otium succidas imposito, & humore perfundito, vtpote austero vino, & roseo aut myrtino oleo. Si cruoris effluuium vrget; lanarum vice spongiæ admouendæ sunt, & pro vino acetum infundito, locumque myrtino subungito. in omnibus autem spongiis acaciæ, aut hypocythidis, aut etiam aloes succi aridi sint, optimè facit & omphacium aceto liquatum. Quòd si irrigatio fordida sit, ægreque feratur; emplastris vti conueniet: cutim enim circumtendunt, ac veluti manu corripunt, quin etiam ipforum facultates refrigerare, exicare **F** reque magnopere valent. Infinitæ verò aliæ aliis experimento cognite vires insunt: sed optima emplastra ac tutiora sunt, quæcunque acetum habent, & salicis foliorum succum, necnon & bitumen, & æruginem, & alumèn, & thus, & myrram, & æs vstum, & æris squammam: atque in summa quæcunque huiusmodi emplastra sunt; emplastris fordida lanæ, aut spongiæ pauco aceto perfusæ superduntur; Sin emplastrorum distentionem ferre nequeunt; id genus epithema facito. Palmulæ pingues nigro vino austero maceratae ad mazæ, id est, placenta crassitudinem conteruntur: postea acacia trita, & malicoria insperguntur, hæc omnia panniculo trito ac veteri illita pectori inducuntur. Item polen- **G** tam vino aut aceto perfusam, necnon lentis farinam tenuem per incerniculum transmissam cerato ex vnguento roseo facto excipiens imposito: cum quo & symphyti radicem tusam & cribratam admisceto. Aliud epithema hæc recipit, Prunorum damascenorum, quæ Brabila græci vocant, agrestium radices in aceto incoquito, ad speciem placenta contundito, ac rhoi, commis, myrti paulum misceto. ex his vtique alia alijs, prout medicaminum efficacia, lenitate, odore opus est, miscenda sunt: siquidem & ægrotantibus gratificari decet. Hæc nimirum exterius applicanda remedia sunt. At his præsentior medela in potionibus deuorandisque consistit, vt proxima vulneratis partibus medica **H** mina sint. Porrò triplex istorum forma est, vt vel fluctionis ductus ligent, cogendo vascula & comprimendo: vel defluentem humorem crassum compactumque efficiant; quò licet transitus pateant, ne destillet: vel exiccent incurfus in sede antiqua sanguinem retinentes; vt ne effluuiò loci exhausti ita permaneant, exundatioque ibi sit, quò facta est effusio. In venarum quidem rarefactione adstrictio satis est: ipsæ nanque ceu situla noua imbecilla in rarefactionibus perfluunt. Diuisionibus verò, vt labia committantur, adstrictio quoque medetur: sed maioribus

- A** valentioribusque medicamentis vtendum. Verum enim verò si sit erosio-
nis modus, neque per adstringentia vlceris oræ cogantur, sed vul-
nus dehiscat, neq; ex compressione in vnum redire valeat; sanguinem
atque calorem congelare necesse est. nam istorum immobilitate con-
cretioneq; profluuium coercetur. Posca igitur rarefactis ad stringen-
dum satis est: neq; enim sanguis effluens purus est, sed ipsius sanies per
ostiola parua dilabitur. atque huiusmodi posca neq; adeo multa, neq;
frequenter egemus. Nonnullis & exterius admota remedia abundè fue-
runt. Quin etiam palmularum, aut filiquarum esculentarum deco-
ctum potui datum solum quosdam liberauit. esto autem acetum ex vi-
B ni adstringentis genere, quod si nō medicatione, tempore saltem acre
adstringensque euaserit. Verum in vulnerum dilatationibus præter po-
scam medicamenta primum simplicia adhibeantur, vt plantaginis, aut
sanguinalis herbæ, aut seridis succus singulorum portio æqua cum po-
sca: quòd si adhuc plus effluat, hypocisthidis, aut acaciæ ficcorum cu-
iusque pondo drachmam in tres poscæ cyathos inspergito. optimè ve-
rò facit & vix acerbæ succus. At si calamitas hæc semper in peius irritetur;
gallam tritam, & rubi radicem arefactam, & lapidem ex mari, Co-
rallium quod vocant, aridum tufumque conspergito. verum rhei ra-
dix ad refrigerandum, siccandum, adstringendum, omniaque facien-
C da his efficacior est. sed hæc quoque cum posca sola præbetur. Sin auxi-
lia maiora requiruntur; radicis huius pondo tres obolos seridis atque
plantaginis succis, qui trium aut quatuor cyathorum mensuram com-
pleant, iniicito. In erosionibus autem prorsus astringentia adhibere
tenta: quòd dilabentem sanguinem concretum, compactumq; reddas,
& suscipientia membra constringas: vt procul à vulnere venæ conci-
dant, & occludantur. quin etiam quæ bibuntur, tenacia sunt, concre-
tionem efficere valentia. Succum igitur coriandri ex aceto propinato:
item & leporis, aut inuli, aut hœdi coagulum. Sed multum ne concedi
to: nam istorum aliquod nonnunquam plus, quàm conuenit, datum
D hominem iugulauit. coriandri quidē succi ne minus semicyatho cum
tribus poscæ cyathis præbeatur: coaguli verò tres oboli, summum qua-
tuor. Ad hæc huiusmodi fluoris sanguinei speciebus & terra samia effi-
caciter subuenit, & eretrias, & aster quæ vocatur, valde candida, &
rubrica sinopica, & sigillum lemnium. Istorum pondus minimum
drachma, maximum drachmæ tres cum decocto aliquo præbeatur: vt
palmularum, aut filiquarum edulium, aut rubi radicum. Sin arteria ex-
asperatur, proptereaque tussit; in cretica sapa id genus terræ insper-
gantur. egregiè ad arteriam leniendam & amyllum facit: nam cum le-
uore & glutinandi potestatem habet. Si profusio sanguinis vrget; se-

A R E T A E I

mel in die ante cibi assumptionem dandum est: sin minus, & secundo E
& tertio sub vesperam. Ex medicamentis quoque ficcis catapotia fieri
possunt ex melle ad consistentiam decocto: qualis est galla trita. opti-
mus est etiam rhous, quo in obsonijs vtimur, vinacea, acuti rumicis
femen, per se singula, & simul omnia. Hæc vtique & sub lingua ad per-
petuam eliquationem habenda sunt. Gummi etiam cum planta porri
& spinæ lachryma profunt. Variorum sanè medicamentorum infinita
est experientia, varij etiam vsus: vt pastilli ex ægyptia spina, & pastilli ex
electro, & eius, qui Croceus appellatur, quorum apparatus proprio lo-
co expositus est. Porro cùm febris abest, omnia in medicamētis auden-
da sunt, & multa & multoties exhibendo. Si febre vexantur, (plerunq; F
autem corporum inflammationibus febres superueniunt,) neque affa-
tim eruptio suppressenda est, neque in accessionibus medicamenta po-
tui danda: quoniam multi celerius febre, quàm sanguinis effusione cō-
sumuntur. Alimenta varia sunt, specieq; medicamentis similia, quia
etiam in cibis medicamenta reperiuntur. neque enim in vno duntaxat
cibo omnia alimenti bona inuenire facile est. Atqui si non vnus cibus
ad medicationem sufficit, non vno propterea vti ob satietatem facile
est: sed per varia eundum: iam enim diuturna valetudo facta est. Itaque
adstringentia sint alimenta, & facultate refrigerantia, & ad tactum
quoque frigida esse debent. calor enim sanguinem prolicit. Alica lota, G
oryza in posca: sin acetum tussim exasperat, palmularum decoctum: pa-
nis assus, præaridus, contusus, atque in farinæ speciem redactus & cri-
bratus: atque ex his omnibus cum oleo sorbitio fiat. item thymbra sale
condita, & rhous cibis aspergatur. Quòd si aliqua in re ægrotanti mo-
rem gerere placeat, coriandrum, si gratum sit, delectationis causa con-
cedito: aut aliquod ex seminibus vrinam mouentibus, facilemque spi-
rationem reddentibus. lens vtiq; si profluvium sanguinis vrgeat, cum
plantaginis succo præbeatur: si non vrgeat, à succo abstineto: quippe
qui nec concoctu facilis, neque gustatui iucundus est. istis verò mini-
mè omnium ægrè concoctilia danda sunt. At si ob sanguinis effusio- H
nem mortem instare verearis, tunc iniucunda concoctu difficilia, quin
etiam immania sint licet ea, quæ salutem afferunt: propterea galla ari-
da trita lenti siccae & frigidae adspargatur: oua coquendo crassiora effe-
cta cum mali punici corio, aut galla exhibeto: tale vtique necessariò in
medicamine alimentum est. Potus omnino parcissimus esto: nam sic-
co victui humor inutilis est. Hæc nimirum adhibenda sunt, si adstrin-
gere ac refrigerare statueris: si verò sanguinem ac spiritum crassiorem
efficere; lac, amyllum, & alica profunt: modo cum amylo, modo cum
alica lac misceto. horum temperatura, vt ne sit liquida sorbitio, ad con

Acretionem perueniat. Ceterum si adhuc magis crassare adstringereque cupias; alicam cum palmulis decoquito; ad spissandum autem amy-
lum lacque optima fuerint, et far tyrrhenum cum lacte: crassum cum
sit, viscidum, & glutinosum. Hædi verò coagulum in decocta liquida
causa concretionis affundito: sicut in lac quoque, ut ad recentis casei
temperaturam deueniat: his crassius est millium, ut far, in lacte deco-
ctum. inspergantur autem galla & malicorium. Verum exiccantium,
aut crassantium mediocritates coniectura assequi oportet: id genus
nanque tussim mouent. Siccitatis quoque excellentia nonnullis & ve-
nas lacerauit. Si bene cedit curatio, sanguisque compescitur; in contra-
Bria paulatim adiiciendo fiat mutatio: atque, (ut dici solet,) nequid ni-
mis. huiusmodi enim vitia facile reuertere solent, ac maligno ingenio præ-
dita sunt. Iam verò hominem instaurare, carneque replere, & nouas ci-
catrices solidare necesse est gestationibus, mollibus frictionibus, pere-
grinationibus, animi oblectamentis, cibis varijs atq; vsitatis. Hæc utiq;
facienda sunt, si à sanguinis exitu vulnus coaluit, & congruenter locus
sanatus est: sin vlcus relinquitur, purulentumque fit; altera deliberatio
ne opus est; si quidem & iterum profusio sanguinis redit. verum de hoc
affectu in sermone De diuturnis morbis disputabimus.

C De curatione Cardiacorum, aut Syncopæ. Cap. III.

IN syncopa medicum prouidentia sedulo nauare operam necesse
est: futuram enim si prospexeris, & præsentia tibi festinanter opem
ferent, & ipsam ante, quàm inuadat, propulsabis. præsentem verò non
facile euadunt ægrotantes. Solutionem nanque naturæ Syncopam ef-
se diximus: Instaurabilis autem non est dissoluta natura. Hanc igitur
maximè quidem futuram arcere; sin minus, saltem nuper incipienti re-
fistere debemus. præscienda verò ea sunt, quæ de acutis morbis differ-
uimus, quando & causas, & signa explicauimus. Nam febris ardens ini-
tium est: febrem ardentem signa pessima consequuntur, ariditas, vigi-
Dlia, caliditas viscerum, qualis ab igne provenit. extimæ partes frigent:
manus pedesq; extremi frigidissimi sunt: respiratio in attrahendo lon-
ga est. si quidem frigidi aeris, quoniam ignem expirant, auidi sunt. ar-
teriæ motibus exiguis, creberrimis, tremulisque agitantur. Ab his itaq;
sumpta coniectura, & ab alijs, quotquot à me inter signa comprehensa
sunt, ipsi ab initio syncopæ occurrendum est. Quapropter nisi hæc om-
nia impediant, habitus, ætas, anni tempus, hominis timiditas; vena cæ-
denda est. Quod si multa prohibeant, quæ numerum insignem, & ma-
gni faciendum constituent, utpote lingua aspera & sicca & nigra, (om-
nia enim interiora signa noscuntur,) in omnibus facultas perpenden-

A R E T A E I

da est: nisi prius morbo, doloribus, inedia labefactata sit: siquidem non **E** defectu tantum, verum etiā strangulatu prosteritur. At ubi præ multitudine syncopa fiat, & inflammatio aliqua insignis in præcordijs, aut iecinore appareat; nequaquam procrastinare expedit. Secunda est igitur vena caua in cubito: per minutas sectiones, idest scarificationem etiam sanguis detrahendus est, quò facultas haud ita insignem iacturam faciat: copiosum enim ac subitum naturam vitiat. quin etiam multo minus sanguinis, quàm in alijs occasionibus, hauriendum est: nam in syncopa si vel minimum erroris committitur, ad interitum ducit. Protinus igitur ad vires instaurandas alimentum dare conuenit. Natura enim priorum repulsa, & nouorum adiectione lætatur. Vtiq; si **F** misionem sanguinis facultas non sustinet, inflammationesque infestant; cucurbitula tunc multo ante morbi iudicationem ei admouenda est. in iudicatorijs enim diebus syncopa incidere solet: in ijsdem verò circuitibus & naturæ iudicant, & morbi interimunt. Si vini potandi necessitas homini incidit, diligenti consideratione opus est: neque enim vsque adeò tuta est in inflammationibus vini potio. siquidem vini potio inflammatione laborantibus dolores auget, inflammatione vacantibus naturæ incrementum affert, sed ante, quàm semel, aut iterum cucurbitulam affixisti; & ad membra relaxanda, & ad sanguinis facilem exitum utilis est: nonnullis & post cucurbitulæ secundam affixionem **G** benefecit. Hoc verò in casu & parsimonia vtendum est. nam & in cucurbitulæ vsu nimiae sanguinis effusionis idem periculum adimus: euacuationibus autem per clysterem duntaxat ad inueterata stercora eijcienda opus est: sed facultatis rationem habeto. Capitis irrigationes frigida, quotquot mihi in sermone de phrenitide relatæ sunt, paulum mediocritatem excedentes adhibeantur. Aer mundus, ad inspirandumq; frigidior deligendus: Visus plantarum, picturæ, aquarumque aspectu oblectandus: & hæc omnia iucundè suauiterque intuenda. amicorum præsentium locutiones sint ioculares atq; ridiculæ. Summa sit in ægro tantis corpore quies, in animo hilaritas. odoramenta suauia, quæ capi- **H** tis sensum non grauent, adhibenda. quin etiam grati odoris alimentanaribus offerantur, qualis polenta est aqua aut aceto resperfa, aut panis calidus recentissimè coctus. Nempè vino haud copiosè os colluatur, neque prorsus denegetur. Potum frequentiore, quàm alijs, & magis assiduè his concedito. Esca per totum diem sit leuis, concoctilis, plerunq; triticea, nec non ægrotanti iucunda, licet paulo deterior: istis enim magis, quàm alijs gratificandum est: quandoquidem haud minimè ad stomachi resolutionem id morbi genus aptum est. Inedia verò aut fames nequaquam prodest: satis enim morbus ipse omnia consu-
mere,

A mere, & exhaurire potest. Porro cùm iam circuitus ad iudicationem peruenit, humiditas verò iugulum frontemq; irrorat, extrema argent, arteriarum pulsatus minimus est, frequentissimus veluti repens, ac tenore debilis; tum paulum quid alimenti triticei sumendum, vinumq; euidenter degustandum est. Sed caput irrigationibus præmunire oportet pariter & vesicam. Hæc verò auxilia in tractatu De phrenitide à nobis memorata sunt. Vinum vtique non pleno ore, neque ad saturitatem vsque iingurgitandum est. Aliqui sanè importunè repleti, postea inappetentia, atque cibi potusque accipiendi impotentia vita excessere: multis autem satis largè vescentibus, natura iam resoluta ad mortem euitandam alimentorum copia nihil profuit: in ventriculum quidem cibus delabentibus, sed ad recreandas vires à ventre non ascendentibus. Alimenta sanè varia sint oportet, plerunque triticea, quò forberi potius, quàm mandi apta sint. si solida sunt, lubrica saltem efficiantur. Oua neque valde concreta, neque torrefacta sint, sed omnino soliditatis expertia. Panis buccellæ vino madentes & calefactæ duæ tresue initio præbeantur. Post autem omnia frigida ministrentur, nisi forsan interius phlegmonæ delitescant. Vinum odoratum, haud ita multum adstringens, quàm minime crassum deligatur, ex Græcis Chium, aut Lesbium, & quotquot alia insulana tenuis sunt téperaturæ: ex Italicis autē Surrentinum, aut Fundanum, aut Falernum, aut Signinum, nisi vehementer adstringat. atq; ex his omnibus illud vitandum est, quod peruetustum, aut valde nouum sit. Nempè detur primo calidum non minus cyathis quatuor ante iudicationem, neque plus cotyla, siue hemina, quamuis bibax homo sit. deinceps cibo exhibito, si inflammatio permiserit, iterum frigidum vinum, quod siti medeatur, propinandū. At si necessitas vrgeat; vino nō solo, sed cū cibo vtédum est. verum ne mentem vinum lædat, cibus ante sumendus est: & post hæc abstinendum. Si post aliquod temporis interuallum dormire velit, quies concedenda est. Verùm si multus sudor emanet, arteriæ iam micare desināt, **D** vox acutior reddatur, & pectus calore destituatur; vini quantum potare possit, concedendum. in solo enim vino refrigeratis spes vitæ posita est. Vinum itaque sit vsitatum, & modo id ægrotus tantum bibat, modo cibum cum vino asumat. id autem per interualla fiat ad tollendam lassitudinem, quæ tum ex morbo, tum ex cibo prouenit. nam qui exiguas vires habent, & post assumptum cibum valde laborant. Igitur & ipsum decet forti esse bonoq; animo, & medicum suauis oratione eum ad bonam spem cohortari, varioque alimento & vino opitulari: nec non & alia efficaci medela vtī opus est & ad sudores coercendos, & ad vires instaurandas, vt penè extinctæ reuiuiscant. Quapropter pecto-

A R E T A E I

ris sinistrae mammae palmulae in vino maceratae cum aloe & mastiche
 superduntur: ceratum verò cum nardo factum ista excipiat. quòd si istud
 durum ficcumq; fiat; aliud epithema imponendum: mala cotonea ex-
 tracto semine, & quicquid durum est, confusa polentae odoratae admi-
 sceto: postmodum absinthij & myrti comam, acaciam quoque & man-
 nam cribratas permisceto: simulque omnia subacta oenanthino cerato
 excipito. Si per haec sudor non supprimatur, vultu acerbæ succus miscel-
 lae addendus est. succus igitur iste, quæ Græci omphacion vocant, cum
 maximè acerbus est, & acacia, & gummi, & rhous esculentus, & alu-
 men, & palmulae, & rosarum succus benè olens simul omnia cum nar-
 do & labruscae pinguiori parte pectori superponantur. huiusmodi
 nanque epithema iuxta refrigerat & adstringit. Decumbat verò æger
 in aere frigido, aut & ad vrsam domus vergat. at si & frigida boreæ au-
 ra afflabit, malè spirantem animum excitabit. Moretur autem & pro-
 pè virentia prata, fontesque, & obstrepentes riuos: nam & ab his ema-
 nans bonus halitus, & mentis delectatio, animam fouet, & naturam su-
 scitat, vitæque restituit: quin etiam cibi potionisque desiderium laces-
 cit. Cæterum si quis ob inopiam hæc assequi nequeat; imitari oportet &
 auram frigidam ramorum benè olentium voluptarijs flabellis, & tem-
 pus vernum folijs ac floribus præsentibus humum sternentes. Operi-
 mentum quoque leue sit & obsoletum; vt aerem quidem accipiat, calo-
 rem autem pectoris exhalare permittat. optimum verò est vetus lin-
 teum. Cervices quidem & iugula & pectus polenta cōspergito: vt odo-
 ris suauitate nutriet, ficcitate coerceat. item & polline quidem corpo-
 ris raras partes contegit: necnon & faciem terra samia lineo sacculo
 cribrata, & raro linteolo inclusa respergito, vt minutissimus puluis in
 frontem & malas excutiat. calx præterea extincta, & gypsum exustum
 per lineum paruum sacculum, quem Græci Criseram vocant, trans-
 missa sudore madentibus iniiciantur. Compressit sudores nonnunquā
 & spongia ex frigida faciei admota: dilabentes enim humores cogun-
 tur, & cutis raritas conspissatur. Prodest etiam sedem inungere: vt frigi-
 dus flatus, & ab alimento exortus effundatur. Item reuocandus exci-
 tandusq; est extremorum calor illitu gleucini olei, aut ficyonij, quod
 ex agresti cucumere efficitur, cum pipere, castorio, nitro, et cachry: mo-
 dicum ceræ in eis eliquando, vt inunctio membrīs inhærescat. Illitio
 quoque ex adarce (limnestida vocant) euphorbio, & lauri bacca calo-
 rem exuscitat: pariter & bulbi crudi, illi inquam, qui exigui & rubri
 sunt, cum pipere & aceti fecē leuigata valentissimum pedibus cataplas-
 ma imponitur: sed intra horæ spatium illud frequentissimè auferendū
 est. instat enim periculum vlceris & vesicarum. Porro ab his spes afful-

- A** get ita egrotantem perniciem euasurum. Quòd si omnia secundum rationem medicus præstet, recteq; omnia cedant; cum syncopa si inflammationes quoque adsint, discutiuntur: sudor nusquam effluit: calor in quamlibet corporis partem ad extremos vsque pedes, & summas nares diffusus reuiuiscit: facies vegeto colore decoratur: pulsatus in magnitudinem efferuntur, nihil tremuli, sed vehementes: vox autem consueta reuertitur, & canora est: ipseque prorsus viuus efficitur. lassitudinem quidem haud exiguum percipit, verum dormire etiam conspicitur. atqui si ipsum somnus occupauerit, cibaria planè cōcocta: erunt sensus mali obliterabitur: naturæque vis egerminabit, & reuifescet:
- B** cumque à somno expergiscitur, bene spirat, leuis est, expeditus & robustus: reuocat autem in memoriam morbum ceu quoddam somnium. At nonnulli sunt, quibus febres obscuræ, tanquam morbi reliquæ, remanent: nonnunquam & inflammationes modicæ, & lingua arida, & sudoris priuatio: præterea rigent, torpent, dissoluuntur. hi sanè in tabe prolabuntur. Tunc verò tempus terendum non est quiete & victu tenui: sed ad motiones eger traducendus per gestationes, frictiones, & lauacra: quò vitæ residuum à morte vindicetur, augeatur, ac recreetur. Propinandum verò est etiam lac maximè mulieris, quæ proximè peperit, puerumque nutrit. hi nanque alimento, vt nuper in lucem editi pueri, egent. si lactis humani copia non datur, asinæ, quæ non pridem peperit, lac accipito: tenue est enim ac fluxile huiusmodi lac. Post hæc ad resumptionem & ad consueta æger ducendus est.

Curatio Cholerae. Cap. IIII.

- I**N Cholera eorum, quæ eijciuntur, suppressio mala est: cruda enim sunt. quare nos oportet ea facile sponteq; exeuntia libenter permittere: si non exeant, incitare, aquam tepidam sorbitioni dantes, assidue quidem, sed paucam, ne tentiones inanes in stomacho fiant conuulsioni similes; si torquentur intestina, & pedes frigescent; irriganda est aluus
- D** calido vngue, in quo ruta, cuminumque incocta sint: vt flatus digerantur, dissipenturque. lana quoque imponenda est, & pedes inungendo molliter fricare oportet, contrectando magis, quam premendo. sed genibus tenus hæc fiant: vt caliditas, quæ abierat, reuocetur. Hæc verò tantisper facienda sunt, donec stercora per inferiora deijciantur, & superius biliosa efferantur. Sin autem omnia antiqua stercora deiecta fuerint, & biliosi humores transferint, biliosusque vomitus & distentio adsit, fastidium, anxietas, virium labefactatio: tunc frigida aquæ cyathi duo, aut tres propinandi sunt ad ventris adstrictionem: vt retrogradus humorum cursus cohibeatur: vtque stomachus ardens refrigeretur.

A R E T A E I

assiduè verò id, cùm potam aquam vomuerit, facito. facile quidem frigida in ventre incalescit: verùm eam stomachus euomit à calida pariter ac frigida dolore affectus, semper autem frigidum potum expetit. Porro si arteriarum motus ad paruitatem lapsi fuerint, necnon assiduè & frequenter micent arteriæ, sudor circa frontem & iugula et qualibet corporis parte stillatim effluat, alui profluuium non sistatur, & ventriculus adhuc euomat cum distentione & animi deliquio; parum vini odorati & adstringentis aquæ frigida infundendum est: vt præ odore sensus excitetur: ob eiusque potentiam roboretur. & corpus ob nutritionem recreetur. vinum enim celeriter sursum petit, vt retrogradum humorum fluxum coerceat. tenue verò est, vt facile diffusum naturæ ad sanitatem recuperandam opem ferat: validum quoque, vt vires dilabentes fulciat, atque sustineat. Inspergenda est etiam nonnunquam recens & benè olens polenta. Verum enimuerò si omnia vrgeant, sudor & tentio non stomachi modo, sed etiam neruorum, singultus inanis, & pedes cõtendantur, & aluius multa excernat, & homo caliget, et pulsus arteriarum ad immobilitatem vergant; tunc huiusmodi ægroti statum præuertere opus est. Quòd si iam adsit; frigida ac vini multum præbendum est, & nequaquam meracius: ne fiat ebrius, ac ne lædantur nerui: sed cum cibo, & panis bucellis madefactis. Præbere quoque aliam escam conuenit, qualis à me in capite De syncopa tradita est, item fructus mollioris corticis, Oporam Græci vocât, adstringentes, sorba, me G spila, mala cydonia, vuam. Ceterùm si omnia euomit, & stomachus nihil retinet; ad calidas potiones & cibaria recurrendum: nonnullis enim hæc mutatio vomitionem compescit: calida verò calidissima sunt. Sin horum auxiliorum nullum proficit; cucurbitula in interscapulo affigenda est, atque infra vmbilicum. verùm assiduè cucurbitulæ mutandæ sunt: nam si diutius permaneant, dolorem ciunt; periculumque est, ne vesiculas excitent. Profuit interdum & auræ motus suavis: vt & spiritus reuiuifcat, & cibus in ventriculo remoretur: vtque melius ægrotus spiret, meliusque arteriæ micent. At si hæc in peius labantur; ventri, pectorique talia imponenda sunt, qualia & ad syncopam supra memorauimus: palmulæ vino madefactæ, acacia, hypocythis, hæc roseo cerato excepta, linteoloque illita ventri imposito: pectori autem mastichen, aloem, absinthij comam tritam cum cerato nardino superdato: aut cœnanthem toti pectori inspergito. Pedes verò & musculos, si cõuellantur; sycionio, gleucino, aut veteri oleo cum exigua cera perungito, castoreo quoque respergito. Porro si frigidi etiam pedes sint; vngui ne ex adarce & euphorbio inungito, & lanis obuoluito, & manuum palpatiõe foueto. quin etiam dorsi spinâ, tendones, & musculos; nec-

A non & maxillas ijsdem inungere expedit. Quòd si post hæc sudor & venter suppressi fuerint, & stomachus cibos admittat, neque euomat, pulsus magni & validi sint, & conuulsio desinat, sed calor vbique increseat, & extrema infestet, somnus verò omnia concoquat; secundo die aut tertio soluendus est æger, & ad consueta mittendus. At contrà si omnia vomitu reijciat, sudor perennis effluat, frigeat laborans, & liuidus fiat, pulsus etiã propè extincti sint, & vires cadant, cùm ita inquã se habuerint, inde honestam fugam capescere bonum est.

* Aliter lauandus.

Curatio Voluuli.

Cap. V.

B **I**N voluulo dolor est perimens ob intestinorum phlegmonem: distentio adest, & inflatio: celerrima ac fidissima perniciēs impendet. nonnulli enim desperata salute ægrotantes mortem euidentem tantummodo formidant: aliqui verò in voluulo ob cruciatus acerbitem mortem expetunt. quocirca neque remedium vllum morbo inferius, neque debilius medico adhiberi opus est. Verùm si morbi causam inflammationem esse inuenerit: venam in cubito magna sectione aperiat: quòd multus subito sanguis inflammationis alimentum, vel vsque ad animæ deliquium effundatur. Etenim hoc vel sedandi doloris, vel stuporis ac sensus priuationis initium est. In voluulo autem recreatio est ac respiratio, vel ad breue tempus (licet præ ignorantia) tormenti dilatio. quandoquidem hominibus ita viuētibz mori beatum est: Medico autem cuiquam mortem inferre nefas ducitur. Sed fas est interdum, cùm præsentia mala euadi non possent manifestè prouideat; grauitate capitis torpida ægrotum sopire. Sin absque inflammatione ob corruptionem, aut ingens frigus voluulus prouenerit; venæ sectio dimittenda est: reliqua autem omnia facienda. Consulendum est igitur, vt à potu aquæ tepidæ frequēter euomat, oleum bibat, deinde rursum euomat, flatus inferius irritamentis educendi. irritatoria quidem sunt cyclamini succus, & nitrum, aut sal: flatus autem euocant cuminum, & ruta. igitur his omnibus cum resina terebinthi sedem oblinere oportet, & spongijs fouere: aut hæc per clysteres infundere cum oleo, melle, & hyssopo, et cucurbitulæ syluestris carnis decocto. Quòd si stercus excretum sit, iterum oleum calidum cum ruta iniiciendum: id enim si intus moretur, fomentum intestinis propitium est. præterea dolentes locos oleo, in quo ruta & anethum abundè incocta sint, perfundere cōducit. Adhibeantur & foci ex lentibus figulorum aut fabrorum ferrariorum, aut ex millio & sale vstulatis. Cataplasmata verò præter vulgata sunt lolij farina & cuminum, & hyssopi aut origani coma. Cucurbitulæ quoque leues quidem, sed frequentes, alia iuxta alias abdo-

A R E T A E I

mini & ilibus ad inguina vsque admoueantur: quin & à tergo coxendicibus ad renes vsque & dorsum: vbique enim quisq; omnia dolorem leniantia faciens iuuat. Præbibat autem cumini, aut rutæ decoctum, & sinonis, aut vnà cum his aliquod ex anodynis appellatis medicamentis: infinita autem alia ab alijs probata experimento inuenta sunt. Bonum verò est & ex viperis medicamentum plus consueta portione potui datum. Cæterum si neque dolor remittitur, neque flatus, neq; stercus deijcitur; purgatorium pharmacum, quod hieram vocant, necessarium dandum est: aut enim simul cum pituita & bile pharmacum vomitu expellitur: aut descendit, flatum, dura stercora, pituitam, bilem ipsius mali fomenta secum educens. Alimenta exhibeantur alium ducendi vim habentia, iuscula gallinarum, ostreorum insigni pulchritudine præditorum, ordeï cremor cum multo oleo decoctus, quod à principio ante decoctionem infusum sit: habeat verò cuminum, nitrum, porrum cum coma. Aut medela adhibeatur cum aliquo iure ventrem subducente: cochleæ valde elixæ, & ipsarum succus. Itellinæ aqua potui detur (si febricitet) cum assaro, aut nardo, aut cachry excocta: nam hæc flatus eliciunt, vrinam cient, & spirandi potestatem facilem reddunt. At si, dolor absit; & vinum bene facit, vt intestina calefiant, vtque vires labantes confirmentur. prodest etiam fœniculi radicis decoctum, si bibatur, & adiantum, & cinamomum. Sin ad abscessum inflammatio conuertatur; huic opem ferre satius fuerit medicamentis abscessui conuenientibus vtentem. ea verò in libris De longis morbis descripta sunt: vbi colici affectus sanatio traditur.

* Aliter febris.

Curatio acutorum Iecoris vitiorum. Cap. VI.

IN iecore sanguinis creatio est, & in totum sanguinis à iecore emanatio: ac omnino iecur est veluti sanguis gelatus. ideo phlegmonæ hoc loco acutissimæ fiunt: hac enim in parte alimentum residet. Sin vsquam alibi phlegmone constiterit; non vsque adeo acuta est: aduena est enim sanguinis accursus. in iecur autem non opus est aliunde effluere. nam si obstructio aliqua exitus occludat; iecur effusione priuatum repletur abundatq; sanguine, alimenti verò ad iecur transitus adhuc patet: aliud est enim iter alimenti à ventriculo & intestinis in omne corpus. Quocircà euacuare facile oportet, venam cubiti secando: multum quidem sanguinis, sed non semel totum detrahendo. Inedia primum iubenda est, postea cibi paucitas, vt et medicamentis ingredientibus iecur inane pateat. Insuper medicamentis exterius appositis, quæ in iecore accruata sunt, discutere oportet. igitur illinatur aloe, aut nitro, lanæ æsypo sordentes admoueantur. Refrigeratione quoque opus est. iccur

- A** enim sanguine accenditur : nam sanguis calidus est . Huiusmodi ergo cataplasmata funto, accipiat^r farina loliacea, aut irionis , aut ordei, & feminis lini: ex humoribus autē vinum acidum , cydoniorum succus, capreolorū vitis, labruscæ maturæ, aut oleum cum ea. Item cum spongijs fomentum fiat ex decocto baccarum lauri, lentisci , pulegij, iridis: per ista mitigato morbo cucurbitula maior applicetur; vt ex omni parte hypochondrio circumdetur: atque altius concidenda cutis, vt multum sanguinis effundatur. Nonnullis autem hirudines , quā scarificationes , magis placent. nam eius bestiolæ morsus altius penetrat: verū erosiones quoq; maiores facit: vnde & sanguinis effluuium ægrè
- B** supprimitur. cumq; sanguinis potu saturata hirudo ceciderit; cucurbitula est applicanda: ab intimis enim partibus tunc attrahit. Quòd si satis euacuatum sit; vulnera medicamentis sanguinē coercentibus morfuque carentibus obtegenda sunt, vt araneorum telis , manna aloëque inspergenda: panis cum ruta aut sertula aut althææ radicibus elixus superdandus. tertio verò die ceratum cum myrobalano, aut absinthij coma & iride conuenit . Quin etiam & malagmata vocata medicamenta talia esse debēt, vt extenuare, aut rarefacere , aut vrinā ciere valeant. optimum sanè est medicamentum ex feminibus cōstans: quorum omnibus medicis experientia perspecta est. bonum est & illud , in quo aut
- C** sampucus, aut sertula ponitur. Cibi tenues funto, labiles , lotium mouentes, penetrabiles: alica cum mulsā, & sorbitio ex ea cum sale & anetho. Ordei verò cremor & detergendi facultatem habet : at si & dauci seminum nō nihil addatur, ad vrinam lacescendam præstantior est: subducit enim per alueolos, qui à iecore in renes pertinet. opportunus verò est à iecore effluentibus illuc transitus & vasorum laxitate & itineris rectitudine . Iccircò & cucurbitulis ea nos trahere oportet eo loco, vbi renes sunt, secundum os coxendicis applicantes. Cæterum & hi vnguine cum ruta , aut odorato iunco , aut calamo aromatico irrigandi sunt . per hæc vtique ægrotum posse mortem effugere sperandum est.
- D** Sin ad suppurationem cōuertatur; pus mouentibus medicamentis vti-
tor, quotquot à me in sermone De colicis literis prodentur . Cū pus autem iam genitū fuerit, quo modo incidendum, quo modoq; medendum sit, alio loco scriptis mandabimus. Eadem nobis & de splene scripta sunt: si quando & inflammationis acutæ calamitas eum inuasit.

Curatio acuti morbi dorsalis Venæ & Ar-
teriæ. Cap. VII.

Venæ concauæ, crassæque arteriæ, quæ secundum dorsum extenduntur, inflammationem ardoris speciem maiores nostri appel-

A R T A E I

lauerunt. nam & ardoribus similes affectus in ambabus oriuntur: ignis **E**
 acutus & acer, fastidium, sitis, anxietas, pulsus palpitans in præcordijs,
 & in auersa parte quam Græci Metaphrenon vocât: & quotcûq; à me
 in volumine De signis relata sunt. Nempe & in syncopâ tendit ignis,
 quemadmodum & in ardoribus: siquidem venæ radicatio (vt ita dicâ)
 iecur est: arteriæ verò principium cor. haud ab re igitur existimes eo-
 rum viscerum supremas partes maximè ad vitam facientes ægrotare.
 Etenim cor arteriæ calorem impertit, venæ autem sanguinem iecur in-
 fundit. Amborum verò magnorum viscerum magna sunt germina ip-
 sæ videlicet phlegmonæ. Venas itaque in cubito protinus cædito, mul-
 tumque sanguinis, sed non semel totum mittito, immo & bis, & ter, et **F**
 alio die, quò interim vires instaurentur, repetito. Deinceps cataplasma-
 tis vtitor, & cucurbitulâ præcordijs, vbi est arteriæ transitio, necnon et
 inter scapulas, nam ibi quoq; pulsationes sunt, affigito, liberiusque sca-
 rificato, et multum sanguinis detrahit: haud enim ita facilè ex horum
 vasorum inanitione in animæ defectum homines cadunt. Verùm &
 alius præter consuetudinem valde suppressa ad lubricitatem per cly-
 sterum molliores infusiones est reuocanda, acribus autem minimè vt-
 tor: nam hi facilè in febrim incidunt à muria & nitri liquatione. ideo li-
 ni feminis & fœnigræci succus esto, & radicum maluæ decoctum ad
 prouocandum, & ad mordendū satis est. Extremas partes, pedes vide- **G**
 licet & manus gleucino oleo, aut ficyonio, aut ex adarce vngvine ex-
 calfacito: nam partes istæ in ipsis valde frigescent. Præterea ante cibos
 potui dato, quæ lotium euocant, meon, aslarum, absinthium. nitrum
 quoque inspergito. sed omniū valentissima est cucurbita, & cinnamo-
 mum, siquis eius copiam habeat. Lac istis & alimēti, & medicinæ vim
 præbet: etenim refrigeratione indigent, cū in eorum visceribus velu-
 ti quidam ignis exstuet, & dulci alimento, necnon & multo in parua
 mole: has nimirum virtutes alimenti lac obtinet: esto autem mulieris,
 quæ proximè peperit, & duobus lactis cyathis vnus aquæ admisceatur.
 lac etiam bubulum optimum est: tertio loco caprinum ponitur. Ciba **H**
 ria concoctu facilia præbeantur, plerique succi, fœniculi radix, & apij se-
 men: indatur et mel: aqua verò, quæ bibitur, ista habeto. Oportet etiam
 sudores elicere, & vbiq; difflationes humidas & fluxas facere. Caput
 sicut in ardentibus febribus irrigetur. Epithema pectori & sinistrae
 mammae, quale in syncopa, superdetur. Cubile rectus decubitus: vt om-
 nia his similia sint, quæ in ardentibus febribus fiunt. Exercitatio modi-
 ca ad sudores euocandos, necnon & balneum, si iste interius exarde-
 scit. neque enim iudicationibus huiusmodi vitia soluantur, & si ardo-
 ris species sunt.

Curatio

A Curatio acuti morbi in Renibus. Cap. VIII.

PEracuta sanè in renibus inflammatio exoritur. simul enim inflā-
mantur à iecore in renes discurrentes venæ: cum illis autem & ie-
cur: cum haud ita prælongæ sint, sed valde latæ adeo, vt renes proximi
iecori suspensi esse videantur. Verum & vrinæ retentio inflammationi
superuenit, vehementiam inflammationis adaugens: nam renum caua
lotij non exeuntis alluuione replentur. Porro idem & in calculis eue-
nit, si in renibus calculus vrinæ canalium laxitate maior oriatur, qui nō
egrediens inhærescit, atque sic & ipse vrinam intercludit. Cæterum de
B calculorum creatione in libro De longis morbis sermonē habebimus:
quomodo aut ne coalescant, aut iam concreti exterantur, cōminuan-
turque. De calore autem atque obstructione, quæcunque celeriter ene-
cant, in præsentia differemus. Si calculi iam conflati sunt, adestque in-
flammatiō: venam cubiti, nisi ætas præpediat, secato: benè fluidus au-
tem multusque sanguis exeat: neque enim phlegmonē tantum euacua-
tione mitigantur, sed etiam calculorum intrusiones vasorum inanitio-
ne laxantur: quin etiam per miētum calculi elabuntur. Postmodum ir-
rigationibus gleucini aut cyprini olei, & fomentis et cataplasmatibus par-
ticulæ remittuntur. Artemisia verò herba, & iuncus, & odoratus cala-
C mus in cataplasmatibus esto. Deinde cucurbitulam renibus in regione
coxendicis adhibeto: maxime nanque ab ea parte euacuatio profuit.
Aluus præterea ducatur per clysteres cum lubricis, & viscidis potius,
quàm acribus, ex maluæ, aut fœnigræci cremoribus. nonnunquam ve-
rò medicamenta ante cibos vrinam citantia dentur, qualia in vitijs ie-
coris narrata sunt: pariter & cibaria similia concoctu facilia. cruditas
enim istis noxam affert. Optimum sanè lac est, maximè quidem asinæ:
secundo equinum: ouillum autem & caprinum confert, quatenus lac
est. Si pauperes ægroti sint, eos lauare satius est. sin minus, in decocto
herbarum desidant vmbilico tenuis folio repleto. Verum si ad pus ver-
D gat, quibus cataplasmatibus ac medicamentis vtendum sit, multis in lo-
cis superius traditum est. At si calculus institerit, fomentis vtique, & ca-
taplasmatibus ijsdem vti oportet. calculi verò medicamentis potabilibus
conterendi sunt, simplicibus quidem sio, & prionite (asplenum puto)
herbis cum oleo aut aceto esculento decoctis: earum quoque succo po-
tui dato: compositis autem ea antidoto, quæ Bistimus appellatur, & ea,
quæ ex viperis constat, & bestia, quæ Coscinos id est Cribrum dicitur,
& quotcunq; experientia optima esse comprobauit. Gestationes istis,
& corporis concussiones ad mouendum propellendumque calculum
bene faciunt: nam calculorum in vesicam transitus ingentes dolores

Q

conciat. quòd si inde exciderint, dolor tollitur, vt neq; per somnium **E** dolorem sentire sibi videri soleant. quin etiam tanquam ex ineuitabili bus malis animus perterritus soluitur.

Curatio acutorum Vesicæ affectum. Cap. IX.

ET Vesicæ acuta vitia renalibus similia proueniunt, phlegmonæ, & vlcera, & lapides, & grumorum obstructions: à quibus vrinæ suppressio, & stillicidium exoritur. sed in hoc membro acutior dolor est, interitusque celerrimus: vesica enim neruus latus est. At renes veluti concrementum sanguinis iecoris speciem habent: in quibus, & grauissimi, & maxime miserabiles morbi incidunt: vnde mors cum **F** maximis cruciatibus miseris mortalibus ingruit. Protinus igitur ventris ea pars laxa, quam Ceneona Græci vocant, secanda est: multoq; oleo cum ruta & anetho vesica est irriganda. Si concretus sanguis doloris, impeditæque vrinæ author sit; oxymel bibere debet: aut calcis parum cum mulsâ, quò grummi dissoluantur: deinde quæ vrinam mouent, & herbæ, & femina exhibenda. Sin ex sanguinis effusione periculum instet, absque vlla cunctatione ei magis, quam cæteris subueniendum: neque enim id leue discrimen est. Nempè medicamina sanguinem coercentia opem ferunt: opem fert autem vesicæ refrigeratio, ex rosaceo & vino irrigatio, & cum lanis succidis obuolutio. Epithema **G** bonum est, palmulæ ex vino cum malo punico, aut succo rhois. Verùm si auersatur epithemata graua, & vehementes refrigerationes, (cauendum est enim vesica natura frigida tenuisque, ne ita multum refrigeretur) eam gleucino illinito, aut acacia, aut hypocystide [ex vino. A spongijs verò, nisi valde vrgeat sanguinis eruptio, abstineto. Escæ triticæ coctu faciles, bonum succum gignentes, lotiumq; educentes præbeantur, quales à me in capite de renibus comprehensæ sunt. Lac, vinum dulce theræum, aut scybellite. Medicamenta potabilia sunt, vrinaria, bene olentia, fluxilia, & id genus alia. Vtilissimum vtique vesicæ remedium cicadæ sunt tempore suo tostæ pro cibo exhibitæ. extra tempus **H** autem aridæ tritæ cum aqua: sed radicis nardi parum cum cicadis elixetur. in iisdem quoque loco balnei ad vesicæ laxamentum æger desidat. Quòd si lapillorum interpositio mictum impediat; oriculario specillo lapis amouendus est, vrinæq; educenda, nisi adsit phlegmone. in phlegmonis nanque neque meatus instrumentum admittit: præterea oriculario specillo vulnerantur. At si expediri medicatio nequit, homoque doloribus consumitur, locum eum, qui sub glande est, ceruicemq; vesicæ incidito: vt lapis excidat, atque vrina effundatur, ac deinde potissimum medendum est ad cicatricem vulnus ducendo: sin minus, puris

A effluuium, quod Rhæas græce dicitur, factum esse pro futura hominis vita satius est, quàm vt tormentis miserrimè cruciatus intereat.

Curatio Vuluæ suffocationis. Cap. X.

V Vulua in mulieribus membranis extentis hinc atque inde secundum ilia continetur, ac perinde atque animal vitia in olfactu patitur. nam ad benè olentia delectationis causa se recipit, foedè olentia contristantiaque præ molestia refugit. Igitur si aliquid superius triste offeratur; vulua ad naturalia descendit: si extra, ostio naturalium apponatur; retrò sursumque recedit. nonnunquam verò in hoc aut illud
B latus ad lienem, aut iecur mouetur. ad recessum eius autem contractio nemque membranule, vt in nauibus vela, cedunt, atque consentiunt. Hæc verò illi & propter inflammationem eueniunt. Nā si eius ceruix afficitur, atque intumescit: fit prominentior. Si infundo exoritur inflammatio; sursum repit. Sin ad pedes foras vergat; turpis & immunda res est, dolores afferens & contristans, præterea difficulter ambulare potest, & in latus & supina decumbere, nisi pedes mulieris phlegmone la borent. At si ad superiora vulua recurrerit; quàm ocysimè hominem strangulat, vrget autem spiritum comprimens: neque enim prius conqueri & clamare, et opem ab adstantibus petere valet, quòd nonnullis,
C hisque pluribus respiratio, nonnullis autem vox celerius intercipitur. par est itaque eos, qui his miserijs interfunt, prius quàm mulier intereat, medicū accersere. Verùm si forte aliquando occurreris; cognita phlegmone venam scindito, præcipue quidem eam, quæ in malleolo: quæ si non bene fluida sit, eam, quæ in cubito est, petito: Sed à vena malleoli sanguinis missionē repetito. Alia verò omnia administrato, quæcunque strangulatus & citra inflammationem subueniunt: qualia sunt manuum ac pedum vincula ad torporem vsque adstringentia: foedè olentium olfactus, vt liquidæ picis, capillorum, lanæque exustorum, flammæ in lucerna extinctæ nidoris, castorei, quod præter foeditatem odoris nervos etiam refrigeratos calefacit. lotium præterea vetus vel demortui ferè corporis sensum magnoperè suscitatur, & vterum ad inferiores partes abigit. Porro medicamenta odorata naturalibus sunt imponenda: vnguentum verò lene sit & minimè tactum vellicans, nardus, aut baccharægyptium, aut vnguentum ex malabathri indicæ arboris folijs compositum, aut cum aliquo odorato vnguine tusum cinnamomum: atque his muliebres locos oblinito. Quòd si ex his fusile medicamen confletur, illud in vuluam infundito. anum quoque flatuum eductorijs inungito. per clysteres quoque non acres, sed molles, viscidos lubricosque humores indito, vt stercora solum eijciant, sedesque vtero am-

* Aliter extētionē.

pla vacuaque remaneat. id succus althææ, fœnigræciæ præstabit: fertu- E
 lam verò, aut sampfucum cum oleo decoquito. Cæterum si maiore vi,
 aut depulsione vulua egeat; tunc validæ mulieris aut viri benè tenacis
 manibus hypochondrium comprimatur, aut fascijs adstringentibus
 succingatur: quò in angustum locus redigatur, neque iterum sursum
 versus vulua procurrat. Item naribus apprehensis sternutamenta citen-
 tur: quibusdam enim sternutamento & cõtentione vulua in propriam
 sedem redire potest. in nares autem puluis inspiretur ex radice lanariæ,
 aut piperis, aut castoris. Item leues cucurbitulæ in feminibus, ilibus, co-
 xis, inguinibus attrahendæ vuluæ causa defigantur. amplius & dorso
 inter scapulas strangulatu subueniens admoueto. Sin à phlegmone
 strangulatus proueniat; vena ad pubem veniens scindenda est, mul- F
 tumque sanguinis fundendum. Item faciei frictiones, capillorum euul-
 siones, vt mulier ad se redeat, simul benè facient. At si vel parum tole-
 rare poterit; in decocto aromatum desidat, odoratisque suffumigetur.
 Ante cibos castorei paulum bibat, & hieræ paulû cum castoreo. Quòd
 si ferre valet; lauetur, & in tempore ad antiquos vsus reuertatur: detq;
 operam mulier, vt quàm facillimè menses elabantur.

Curatio Satyriasis.

Cap. XI.

Neruorum in virilibus inflammatio penis tentiginem facit cum
 appetitû contristationeque in actu venereo. fiunt autem disten- G
 tiones neruorum cõuulsioni persimiles, nunquam mitigabiles. Quin
 & ipso concubitu sedari non potest ista calamitas. Mentis quoque alie-
 natio sequitur. nam primum quidẽ impudentes euadunt, dum casum
 suum licentiosè narrât: audaces enim eos coeundi insatietas efficit. Po-
 stea verò cùm affectus iste desierit; tunc ad se redeunt, & mente opti-
 mè constant. Igitur omnium horum causa venam in cubito & in talo
 aperias, & multum cruoris, ac sæpe detrahas. neque enim id temporis
 intempestiuum fuerit & ad mentis stupefactionem, et ad inflammatio-
 nis remissionem, & ad caloris virilium mitigationem faciendam, ani-
 mæ deliquium afferre. quippe sanguis multus calorem & audaciam H
 valde accendit, inflammationem alit, mentis perturbationem confu-
 sionemq; veluti esca ignem procreat. Omne corpus etiam medicamẽ-
 to, quod Hieram, id est, sacram vocant, purgato: neque enim purgatio
 ne solum egent, sed etiam leni medicatione: vtrunque autem præstare
 hiera potest. Insuper genitalia, & lumbos, & locos inter femina & in-
 guina (Plechada græci vocant) & locum inter anum & scrotum (Peri-
 næos græce dicitur) & testiculos lanis ab oue detonsis adhuc sordenti-
 bus obuoluito. sed lanas rosaceo ac vino perfundito: partesq; istas mul-

- A** ta irrigatione madefacito, ne ab lanis caliditas oriatur: immo natiuus calor à frigida humorum potestate obtundatur. Eiusmodi quoq; cataplasmata superdanda, panis cum plantaginis herbæ succo, & solano, et feride, & papaueris folijs, idque genus alijs, quæcunque torporem, frigoraque iniiciunt. necnon & similibus virilia & locos inter inguina & femina, & coxas illinito cicuta ex aqua, vel vino, vel aceto: item mandragora, aut acacia, & spongijs vice lanarum vtitor. Interea subluenda alius est maluæ decocto, & oleo, & melle: omnia verò acria vitentur. Defigantur in coxa cucurbitulæ, aut in abdomine Optimæ sunt autē & hirudines ad sanguinem deorsum attrahendū. Et super vulnera cataplasma imponatur micæ panis cum althæa. Postea in aqua desidat, vbi artemisia, saluia, conyzaq; decoctę sint. At si longiori tempore vitium extrahatur, neque multitudo secundum proportionem minuta fuerit, et neruorum conuulsionis metus adest, (nam facile in his affectibus conuelluntur;) curandi rationem mutare opus est. quippe calefacientia admouēda sunt, gleucinum scilicet oleum, aut sicyonium pro rosaceo. lanis autem mundis & cataplasmatibus tepesacientibus partes illæ contegendæ: quandoquidem neruorum inflationes nonnunquam huiusmodi curatio mitigauit. amplius & castoreum cum mulsâ bibitum. Cibaria parūm nutriētia frigidaque sunt: pauca triticea: plurima olera, malua, bliton, lactuca, cucurbita elixa, cucumis maturus elixus, pepo suo tempore collectus. A vino, et carnibus, lōgo temporis intervallo abstinetō: siquidem vinum est neruorum calefactio, animę remollitio, voluptatis reuocatio, genituræ creatio, venerisq; excitatio. Hæc à me in acutos morbos remedia scripta sint. Oportet autem & iuuenem medicum ipsum suo Marte aliqua sibi cōparare: neq; omnia ex alienis commentarijs depromere. Hoc sanè pacto acuta vitia fiūt, vt ordine singulis, quæ scripta sunt, aut omnibus vti valeas.

D

ARETAEI CAPPADOCIS

DIVTVERNORVM MOR- BORVM CVRATIVVS.

Liber primus.

Prooemium.	Cap. I.
Curatio Cephalææ.	Cap. II.
Curatio Vertiginosorum.	Cap. III.
Curatio Morbi comitialis.	Cap. IIII.
Curatio Melancholicæ.	Cap. V.
Curatio Phthisis seu vlcerum pulmonis.	Cap. VIII.
Curatio Vlcerum iecoris, & effusionis puris.	Cap. XIII.
Curatio Lienis.	Cap. XV.

Cætera capita desiderantur numero octo. vide primum librum
de signis & causis longorum morborum,

Prooemium. Cap. I.



N longinquis morbis dilatio medelæ mala est: nam ob cunctationem in vitia insanabilia prolabuntur. Inflatio E sanè ita habet, vt non facile recedat, si semel inuaserit: at si & diutius trahitur, temporis spatio vires acquirit: & nonnunquam euenit, vt commoriatur. Exiguos quoq; morbos maiores excipiunt: cumq; priores discrimine vacarent, eorum soboles perniciofa exoritur. Itaque nullo pacto ægrotum filere conuenit, ne morbus deprehendatur, erubescens: neque aufugere, vim curationis metuentem: neque medicum pigrum esse, ignauumq; oportet: vtrunque enim ad morbum insanabilem efficiendum consentit. Nonnulli autem sunt ægroti, qui præsentium, necnon & futurorum ignoratione ad finem vsque cum morbo degunt. Nam plerique neq; F pereunt, neque futuram mortem suspicantur: quocirca neque se medici fidei committunt. Horum probatio ex cephalæa colligitur: de qua prius sermonem instituam.

Curatio Cephalææ. Cap. II.

C Aput quanto ad vitam magis necessarium est, tanto difficiliore ægritudine laborat. Atque morborum capitis inuasio quidem tolerabilis est: nam parum dolent, aures sonant, grauitas adest: at si intenduntur, finis est mortiferus. Igitur exiguos dolores ne spernito: nam

- A** & exiguis medicamentis in quibusdam discussi sunt. Si plus temporis extrahuntur; maiores cruciatus superueniunt. propterea vena cubiti incidenda est: sed duobus ante diebus vinum bibat. tantum autem sanguinis detrahito, quantum eius vires tibi coniectanti ostenderint. verum non semel totum detrahare magnopere expedit. porro quorum vires copiosam sanguinis detractionem patiuntur, his ipsis continuo morbus discutitur: atque id omnibus longis ægritudinibus conuenit. Tribus autē quatuorū diebus interiectis liberalius alendi sunt. Deinceps purgatorium, hieram quod vocant, cum mulsa propinandum: ea enim à capite morbi alimentum maximè abducit. modus verò medicinali quatuor aut quinque drachmarum pondo esto. Quod si bene purgauerit; tunc lauandus est, & vinum exhibendum, & vires augendæ. Postea iterum vena frontis recta scindenda est: hæc enim est opportunissima sanguinis detractio. modus autem esto hemina, aut paulò plus. neque vltra sanguinem mittito, quoniam vasa inanire non expedit. Deinde capillis nouacula detractis cucurbitulam priorem vertici affigito, alteram inter scapulas citra sanguinis effusionem admoueto: et eam, quæ in vertice fixa est, liberius scarificato: quò sanguis vberius attrahatur, & partes profundiores incidantur. remedia nanque ad ossa vsque penetrantia cephalæam iuuant. Quod si vulnera cicatricem ducant, arteriæ secantur: duplices autem sunt, aliquæ post aures paulò vterius, proprijsq; motionibus produntur: aliæ verò aurium arteriæ prorsum versus sitæ sunt auribus proximæ: nam instrumento, quod Antitrochon græci nominant, adducuntur. verum hæ quoque proprijs pulsationibus innotescunt. nempe maiores ossibus vicinæ secantur: hæ nanque vtilitatem afferunt. adiacent & aliæ singulis auribus oppidò tenues, quas incidere prorsus inutile est. modum verò incidendi in libris De manuū operationibus exposui. Cæterum post medelam in cephalæa, morbo comitali, & vertigine, vtque semel dicam, in omnibus capitis vitijs (prius ventre, aut purgatorio, quod deuoretur, aut clysteri, euacuato) pituita euocanda est modo è naribus per sternutatoria, modo ex ore per ducentia pituitam. Species autem sternutamenta citantium sunt piper, radix herbæ lanariæ, fibri testiculus. hæc quidem sunt vulgata & communia. ad læuorem autem terito, & cribrato, & calamo aut crassiore pennæ anserinæ caule inspirato. His efficacius in attrahendo violentiusq; euphorbium est cum aliquo ipsorum admixtum. Quin etiam cum oleis miscetur gleucino scilicet, aut sicyonio, id est, ex cucumere syluatico, aut cum vnguento ex styrace: redditur autem magnopere liquidum, vt fusile sit. infunditur per nasi fistulam: hæ verò geminæ sunt, atque, ab vno canali cognatæ & coherentes adeo, vt

A R E T A E I

semel vtrisque infundendum sit. neque enim tolerabilis est alterutrius **E**
 naris sigillatim dilatatio. nam protinus caput accenditur, & acerbus
 dolor inuadit. Quæ autem per os pituitam eliciunt, hæc sunt: sinapis,
 granum cnidium, piper, vua taminia: id præstat vel mixta, vel singula.
 Cæterum quoniam & ipsa mandere, & expuere assiduum est: iccirco
 & cum aqua, aut mulsæ, aut poscæ permixta danda sunt: atque os eluen-
 dum. ad tonsillas enim impulso humore extentoq; collo expirationis
 flatu abluatur. Posteaquàm pituitam, quantam libet, eduxeris, permul-
 ta aqua calida lauandum caput, atque perfundendum: vt perspirabile
 atque diffilabile reddatur: ingentes enim obstructions fiunt. Cœna fru-
 galis & simplex esto: in qua & vinum ad stomachi restitutionem suma **F**
 tur, siquidē & ipse magno dolore vexatur. Interea verò vbi vires ægri
 stabilieris, lotionē per clysterem vsitata opus est: in qua nitri multum
 inspergatur, aut resinæ à terebintho arbore pondo drachmæ duæ eli-
 quentur. postridie sanguis è nasi interioribus detrahatur: intro enim
 prælongnm instrumentum immittitur, quod Cateiadion vocant, aut
 illud, cui Storyne nomen est. aut si quis horum copiam non habuerit;
 pennæ anserinæ caulem crassiorē fumere debet, eiusque neruosam
 partem denticulatim instar ferræ incidere, atque sic in nares vsque ad
 ossa, quæ ob cribri seu colatorij similitudinē Ethmoeide vocantur, im-
 mittere: deinde vtraque manu agitare, quò locus à dentibus insculpa-
 tur, ac vulneretur. Facilis est autem ac copiosus sanguinis cursus: nam **G**
 graciles venæ hîc desinunt, corporaque hac in parte mollia sunt, & se-
 ctioni habilia. verum & multos nares vulnerandi modos vulgus no-
 uit, herbas scilicet asperas, & arida lauri folia naribus imponentes, aut
 digitis eas fortiter agitantes. cum verò quantum satis sit, euacuaueris,
 quod erit hemine dimidium; coercendus sanguis est spongijs & poscæ.
 aut aliquod aridum, quod sistendi sanguinis vim habeat, naribus inspi-
 randum, galla, aut scissile alumen, aut balauftium. Verumenimverò
 post hæc remedia siue dolor capitis perseueret, siue desinat; oportet ad
 finem huius medicationis peruenire. quoniam id malum sæpe reuerti
 solet, & in suo vigore consistens plerunque delitescit. Itaque nouacula **H**
 derasis capillis, (quâdoquidem & hoc capiti prodest,) ferramentis can-
 dentibus vrendum est: si in superficie, ad musculos vsque peruenias: sin
 osse tenus penetrare velis, à musculis caueto. nam musculi exusti ner-
 uorum distentiones cient. quòd si in summa cute vsferis, vinum odora-
 tum album cum rosaceo infundere satis est: Pittarium verò malefa-
 ctum per triduum supra crustas extendito. quòd si crustæ altius descen-
 dant; porri comam cum sale tritam, linteoloque illitam super dato.
 Tercio die crustis summam cutim tantum occupantibus ceratum ex
 rosa

- A** rosa: profundioribus autem lentem ex melle imposito. Sed quæ medicamenta cicatrici ducendæ sint, alio loco descripsimus. Nonnulli super frontem ea in parte, vbi futura est, quæ Corona dicitur; cutim osse tenus inciderunt: illudque aut exterentes, aut excidentes vsque ad meditullium (quam græci Diploen nominant) ad carnis repletionem perduxerunt. Alij & ossa ad membranam vsq; perforarunt. Verum id genus remedia temeraria sunt: nihilominus tamen adhibentur, si omnibus alijs tentatis adhuc cephalæa perseuerat, & æger est animosus, vel corporis robur excellit. Nempè si paulatim ad sanitatem accessio fiat; exercitationes recto corpore pectori humerisq; adhibeantur, manuum
- B** fiat gesticulatio, alteres iaciantur, saltu corpus moueatur, atque in his peritè corpus torqueatur. primò & postremò crura fricentur, medio tempore caput. picatio assiduè picem inspergendo administretur. item caput rubrificandum nonnunquam sinapi cum duplo pane affricando, ne intolerabilis ignis excitetur: nonnunquam medicamenta simul illinendo, quale est illud, quod ex adarce, & euphorbio, & pyrethro componitur. proficit autem & ad dolorem in tempore sedandum, & ad radicem mali extirpandam thapsiæ succus, & medicamina cum ipsa iungenda: quotcunque cutim tumefaciunt; & varis similia tubercula excitant. Victus ratio in singulis dolorum generibus tenuis esto: exiguus
- C** potus, & aquæ potio ante vllam medelam potissimum adhibeatur. ex toto verò ab acribus temperet, cepis, allijs, et succo lascerpitij. à sinapi autem non penitus: siquidem eius acrimonia, præterquam quòd stomachi vim roborat; capiti quoque haud ingrata est; pituitam fundens ac diffians, aut ad inferiora deturbans. Leguminum pessima faba est, & eius species pisa, & quæ à græcis ochri, & dolichi nuncupantur: illi cicerculæ folio similes, hi faseoli aut lobi à nonnullis vocitati. secundo loco ponitur lens: quæ nonnullis concoctionis excretionisq; virtutibus prædita est: sed caput replet, doloremque concitat. nihilominus cum pipere elixa spernenda non est. Far lotum haud ingratum est cum vino & melle, quantum ad condimentum satis sit: & ex ipso conflata sorbitio, & eius semina in simplici iussculo decocta. vtique bona sunt & in condimento, quod græci Caryceam vocant, semina cari, coriandri, anesi: apij verò semen ijs anteferendum. mentha herba, & pulegiū præterquam quòd benè olent; quandam vim habent, & urinam mouendi, & flatus per inferiora expellendi. Inter carnes vetustæ omnes damnantur: nuper interfecti galli carnes laudantur. Inter aues torquatus palumbus, columbus, & aliæ quęcunque haud ita multum pingues sunt, suum extremitates, lepus assatus. Bubula ouillaque caro crassum succum creat, & caput replet. Hoedus non penitus malus. Lac & caseus ca

* Aliter
præter.

put dolore vexant. Ex piscibus saxatiles deligēdi, & quotquot in ea re- E
gione optimi censentur. Olera elixa quidem ea assumantur, quæ lotiū
& ventrem citant, malua, blitum, beta, asparagi, acris verò & brasica
est. At inter cruda lactuca omniū est optima. Radices autē etiam elixæ
prauæ sunt. radiculæ, rapæ, pastinacæ vrinā mouent, sed caput explent.
fisarum flatus edit, & ventriculum tumefacit. Vinum album tenue
dulce admittatur, tantum adstrictionis habens, quòd aliud nō remo-
retur. Omnia bellaria capiti inimica. quā et palmularū omne genus.
ficus autem & vua demulcent, & quicquid ea parte anni, quam Horā
græci vocant; bonitate præstat. sed quibuscunque vel etiam iuuantibus
fatiari malum est. peior est cruditas: labores minus, quā cruditas no- F
cēt: nihilominus & ipsi sunt detrimentosi. Deambulationes matutine
alio prius exonerata citra spiritus difficultatem benè feruntur. optimæ
sunt etiam & à cœna. gestatio longa per loca non ventosa conueniet.
atque vbi sol caput non feriat: ei nanque sirius officit. Vfus veneris capi-
ti ac nervis labem accersit. Peregrè proficiscatur egrotus in regiones ca-
lidiores ex frigidioribus, & in sicciore ab humidioribus. Cōfert & na-
uigatio, et in mari vitæ traductio. & si quis sit maris accola; in falsa aqua
frigida lauari, & in mari natari, & in arena volitari, victumque ex ma-
ri quærere proderit. Doloris verò capitis, quē Eterocraniam græci no-
minant, eadem medicamina sunt: nam quæ toti capiti remedia con- G
ducunt, eadem singulis eius partibus adhibere, bonū est. Quibuscunq;
verò per hæc morbus depulsus non fuerit; ijs reliquum est, vt veratro
vtantur, vtpote vltimo atque valentissimo omnium remedio.

Curatio Vertiginosorum. Cap. III.

E T succedit cephalææ vertigo, & ipsa per se proprijs de causis ori-
tur, si profluuium ab hæmorrhoidibus coercetur, si è naribus san-
guis non effluat, qui prius effluere consueuerat, si corpus non diffletur
aut sudore, aut labore antea fatigatum. Igitur si ab cephalæa ducit ori-
ginem; ea medendi ratione vti debemus, quæ ad cephalæam supra ex H
posita est. quibus autem violentius cum vltimis remedijs occurrendū
sit, posterius explicabo. Sin ab aliqua humorum suppressione morbus
inciderit; vsitata excretio mouenda est. naturæ nanque salutare est ma-
teriæ recursus. At si ista tardat, malum verò increfcit; in alijs quidem
suppressionibus aut sanguinis è naribus manare assueti, aut sudorum,
sanguis mittendus est è vena cubiti: Sin ab iecore multis humoribus af-
fluente, aut à liene, aut ab aliquo ex visceribus in medio corpore positis
vertigo prodeat; cucurbitulæ subueniūt. Sed quantum ex vena defluit,
tantundem per has sanguinis est detrahendum. sanguis enim est causæ

- A** alimentum:quemadmodum & ventriculus. Deinceps capitis remedia subiungenda, vena cubiti recta, aut nasi arteriæ vtrique in angulis secandæ: cucurbitula vertici affigenda: caput radendum, rubrumque faciendum: pituita è naribus per sternutatoria, aut ex ore, quemadmodum docui, euacuanda: omnia denique modo in cephalæa narrato administranda. duntaxat adiicitur cyclamini succus, aut anagallidis in nares fundendus. Posteaquàm verò medicaminum capitis ad finem perueneris; deinde quotquot efficaciora ad vertiginosos inueniuntur, ea sunt adhibenda. Vomitus à cœna, necnō vomitus ab esu radicalium vti postea decet: quin etiam ad veratri assumptionem hæc præparatio fuerit. nam præexercendus est stomachus, cū vehementioribus vomitorijs vti volumus. Pituita quoq; impræsentia magis attenuatur, & ad veratrum benè funditur. Veratri exhibēdi modi plures sunt, vt validioribus quidem succurrat, ad magnitudinem amē, idest placentulæ, aut paulo crassius est incidendum: & cum fare loto, aut lente assumitur pondo drachmę duę. imbecillioribus autem & gracilioribus decoctum cum melle propinatur. duarum aut trium mystillarum modus esto. quis verò sit faciendi modus, alio loco declarabitur. Inter singula autem remedia æger cibus reficiendus est: quò ea, quæ interim incidunt, sustinere valeat. In accessionibus quoque sic opitulandum est,
- C** deliganda sunt crura supra talos & genua, & manus brachialia, brachiaque infra humeros propè cubita. ad caput irrigandum facit rosaceum cum aceto. oleo verò incoquito serpyllum, aut spondylium, aut hederam, aut id genus alia. fricentur extrema, & facies. olfaciat acetū, pulegium, mentham, aliaque eiusmodi ex aceto. inter dentes aliquid apertionis causa imponatur. nonnunquam enim maxillæ colliduntur & cohærescunt. in tonsillis fiat titillatio: vomitus citetur. nam interdum reiecta pituita æger à tenebris excitatur. Hactenus ad accessionis leuamen & tenebrarum discussionem dictum sit. At de vniuersa victus ratione tam in curando, quàm post curationem hæc nostra sententia est.
- D** Somnus multus equè, atque insomnietas inimica sunt: multus enim somnus stuporem capitis sensibus iniicit: vaporum exuberantia torpet omnis actio. Hi planè grauitatis, et sonorum in auribus, et splendorum quorundam oculis obuersantium causæ, morbi verò indicia sunt. vigilia verò cruditatem facit, alimentum subtrahit, laborem affert, corpus contristat, mentem labefactat: propterea facilè furere, atq; atrabile vexari isti consuerunt. Medicis autem somnus ad alimenti distributionem, & ad laborum diurnorum leuationem utilis est. Aluo ad excretionem consulendum: nam diffilationis causa potior aluus est. Iterum crurum frictio per aspera linteola vsque ad ruborem, deinde

A R E T A E I

dorsi & laterum, postremò capitis adhibenda. ab his ambulationes cir **E**
ca initia & finem leniores, mediæ verò acriores. Quies consistentia spi
ritus post ambulationes esto. Vocē leniter exercere oportet, grauib
vocibus vtentem sonum ædere. acutæ nanque voces capitis distentio
nes, temporum palpitationes, cerebri pulsationes, oculorum inflatio
nes, auriumque tinnitus efficiunt. mediocriter acuta vox edita capiti
prodest. Postea verò gestationis tempus adest ad difflandam totam ca
pitis grauitatem opportunæ. longa sit autem, verum citra fatigationē,
neque in tortuosis regionis tramitibus, neque assiduis itineris flexibus
gestatio fiat: quoniam sic vertigines oboriuntur. sed rectæ & longæ &
lenes ac superioribus locis gestationes fiant. Siquidem ita assueti sint;
optimum panem solum assumant, quantus exercitationibus impedi- **F**
mento ne sit. prius enim concoctum esse oportet. caput & manus exer
cendæ, horumque frictiones faciendæ. In his verò leniter agendum: vt
caliditas excitetur, & caro augeatur, & vires restituantur. postea suum
ipsius caput erectum fricato diutius hunc laborem sustinens. Quin &
exercitationes ad ceruicis vsus, & ad manuum agilitatem faciunt, si
scienter fiant. sursum attollendo caput atque oculos exercere oportet.
Manuum exercitatio fit, aut discorum iactu, aut certando cestibus, aut
pugnis. pila verò parua & magna detrimento est. nam capitis & oculo
rum circumuolutiones atque intentiones vertigines afferunt. optime
faciunt saltus & cursus. omnia velocia exercitia cruribus conueniunt, **G**
& omnia roborant. Frigida lauatio illuuiæ, illuuiæ autem calida laua
tione melior. astringere, densare, siccare caput frigida lauatio efficacis
simè potest: & hic salubris status est. humectare, soluere, tenebras offun
dere valentissimè calida lauatio potest: & hæ capitis morborum causæ
sunt. tales sunt & austri auditui graues. exercitationibus quies succe
dat, vt perturbationem sedet. Capitis pressiones ad cutim poliēdam fa
ciunt. Aquæ, aut aquati vini propinatio est res optima & ad manum.
coma olerum assumatur, quæ ventrem molliunt, maluæ, betæ, bliti. Li
quamen bonum stomacho, ori suaue, aluum leniens, neque graue capi
ti, ex thymo, aut thymbra, aut sinapi cōficitur. Oua hyeme calida, æsta **H**
te frigida, putamine spoliata, nō tosta præbeantur. Oliuæ, palmulæ, sal
samentum rectè conditum. Alica elota cum aliquo dulci, quantum cō
diendi causa assumi debet. Post hæc sal adhibendus. Ocium & quies ab
audiendo & loquendo. ambulationibus vtatur sub aere perspirabili. de
lectat autem locus aut arboribus cōsitus, aut herbidus. Vtique vertigi
nosus cum ad cœnam accedit, maximè iterum in frigida lauetur, parū
vngvine corpus sublinens: si nolit, at crura tantum. cœna triticea esto,
quale est Itrion, quod est placentæ genus, aut forbitio ex alica, aut ptisa.

Ana flatu vacans, per elixationem concoctu facilis. Medicamenta verò suauiorem ptisanam reddētia sunt piper, pulegium, mentha, cepæ aut porri paulum, neque tantum, vt innatet. acetum verò acre vtiliter assu mit. Carnes ex pinguibus animalibus non pingues, suum pedes & capita. Volatilia omnia, sed multitudinem cōiectura metiri oportet. lepus & venatio. gallina in promptu habetur, & iuuat. Omnia bellaria caput dolore infestant præter palmulas aut maturas ficus, aut vuas. si flaribus homo vacet, hæc benefacient. In secundis quoque mensis vtiliter ea sumuntur, quæ facilè concoquuntur, si nidore vacant, & leuia sunt. Postea deambulatio, mentis hilaratio, in quiete ad somnum conuersio.

B adhibenda.

Curatio morbi comitalis. Cap. IIII.

Ingentibus medicamentis atque valentissimis in morbo comitali opus est. nam quoties eius in mentem venit, non modo laboriosum malum, & periculi plenum; sed etiam generis morbi foeditatem, & calamitatis opprobrium exhorremus. atque ita existimo, si se mutuò in accessionibus spectantes ægroti, quęcunque patiuntur, cernerent; non vltra vitam ducere tolerarent. verum quæ singulis atrocia foedaque insunt, sensus priuatio, intuendi que sublata facultas abscondit. Cæterum

Cmedendi rationem naturæ facilitatem sequi optimum est: quando per ætatis mutationes in longe melius hominem permutat. Quoniam si vsitatus malo victus, in quo morbus alitur, desierit; non vltius hominem infestat. simul enim cum priore victus specie morbus recedit. Igitur si caput occupauit, inhabitat. quocirca omnia quę à nobis in capite De cephalæa relata sunt, facere necesse est: detrahēdo sanguine, & corpore purgando. Venæ autem & quæ in cubito, & frontis recta secandę sunt: cucurbitula admouenda. nō est autem vsque ad animi deliquium sanguis detrahendus: ciet enim morbum deliquium animæ. Arteriæ omnes, & ante, & post aures incidendæ. inter hæc omnia excellens purgatio facienda purgatorio, quam hieram vocant, atque his, quæ è capite pituitam eliciunt: sed multo valentiora sint medicamenta: siquidem istorum habitus est dolorum patiens: Hilaritas verò & bona spes id genus ægros miseros reddit. Opus est etiam ignem capiti inferre: proficit enim. In primis os perforare vsq; ad secundam laminam oportet: deinde ceratis cataplasmatisque vti tantisper, donec membrana ab ossibus recesserit. Terebra nuda ossa circuncidere conuenit: ac si paulum resistant, vsque ad spontinam auulsionem perseuerandum, quousq; nigra nonnunquam istorum, & crassa membrana inuenta fuerit. Cumq; per putrefactionem vel etiam purgationem audacter curante medico vul

neri cicatrix inducta fuerit; agrotus morbū euasit. Maximè omnium **E**
capitis ad ruborem vsque frictiones valent vsitatae quidem, quaecunq;
à me superius traditae sunt: valentior est autem, quæ fit per cantharides.
sed tribus diebus ante, quàm his utamur; lac, ut vesica muniatur, bibe-
dum est: cantharides enim magnopere vesicā ledunt. Hæc abundè sint,
cum caput affectum est. At si mediæ corporis partes causam præbent,
& ab his morbus exoritur: rarissimè autem ista fiunt: potius enim me-
diæ partes in consensu morbi trahuntur à capite, utpote ab ingenti ma-
lo, quod ægritudinis initium est: utcunque igitur res habeat, & in his
vena cubiti soluenda est: à visceribus enim materiæ cursus est. Quin
etiam isti magis, quàm alij, purgandi sunt & hiera, & cneoro, quā thy- **F**
melæam vocant, & coccognidio, quæ chamelæa dicitur: hæc enim pi-
tuitam extrahunt. peropportunum autem ipsis remedium est cucurbi-
tula. epithematum verò & cataplasmatum sylvia omnibus perspecta
est, & ea ubique scribere superuacuum ducimus: nisi quatenus eorum
vim nosse conueniat: quòd scilicet ijs extenuare, per halitus digerere,
fluxa spirabiliaq; corpora reddere oporteat: item concoquentibus me-
dicamentis calidis, aridisq; & urinam mouentibus in nutritione, &
in medicatione utendum: sed omnibus præstat fibri testiculus sæpius in
mense ex aqua mulsâ potus. præterea quaecunque ex varijs composita
medicamenta idem præstant, adhibenda sunt, ex viperis composita an- **G**
tidotus, & mithridatica ex pluribus constans, nec non & Bystini anti-
dotus bibenda est: quandoquidem hæ concoquendi facultatem robo-
rant, utiles humores creant, & urinæ mouendæ aptæ sunt. nam quæ-
cunque simplicia medicamenta scribere opus esset, hisce continentur
antidotis, cinnamomum, casia, folia malabathri, piperis, feselisq; om-
nia genera. & quod nam ex valentissimis remedijs in istis compositis
non reperiens. Fama est & vulturis cerebrum, & crudæ fulicæ cor, & do-
mesticos feles comesos morbum discutere. At ego istorum periculum
nō feci. nonnullos autem vidi nuper iugulati hominis vulneri fialam
subijcientes, atq; inde haustum cruorem bibentes. O ingentem neces- **H**
sitatē, quempiam sustinere, malum malo piaculo depellere: atqui ex
ea ad sanitatem nec ne isti peruenerint, nemo verè mihi affirmare po-
test. Quin & quendam autorem legi, qui humanum iecur epulandum
apponi precipiebat. sed hæc illis scripta sunt, qui ad hunc vsque mise-
riæ terminum peruenerunt. Præterea & victu opitulandum est, & sin-
gulis remedijs, quæ aut ab alijs, aut ab ipsomet ægro fieri possunt. utiq;
in hoc casu nihil spernendum est, nihilq; temerè faciendum; maximè
quælibet exigua adhibendo, quæ penitus prosint, nihil verò lædant.
Etenim spectacula non spectanda, & sermones, & edulia, & suffimen-

- A**ta plurima morbum patefaciunt. Igitur omnia diligenter consideranda sunt. Somnus multus crassitudo est, ocium nebula sensuū, bonum verò mediocritas. Alui excretio à somno, præcipue flatuum ac pituitæ res optima. Ambulationes longæ commodæ sunt, nō flexuosæ bonum spiritum reddunt, sub arboribus myrto, aut lauro, aut inter acres & benè olentes herbas calamentum, pulegium, thymum, mentham, maximè quidem agrestes & sponte nascentes: sin harum copiam non habeat, inter humano cultu procreatas. Inter has quoque gestationes longæ, & ipsæ rectæ fiant. Itinera facere bonum est non secundum fluuiū, ne delabentem aquam intueatur: vertiginem enim aquæ fluxus affert.
- B** neque vllum, qui in orbem voluatur, neque turbinem, qui circum agatur, inspiciat. est enim imbecillior, quàm vt firmum stabiliat spiritum. nam simul cum circulo vertitur: circumuolutio autem vertiginem, et comitalem morbum accersit. Post gestationem lenis deambulatio, postea quies: vt agitatio in gestatione contracta sedetur. Ad hæc exercitationes manuum fiant extremis sudario ex crudis linis confecto inuolutis: inunctio non valde pinguis sit: frictio lenta quidem, sed durior densandi causâ: tumidi enim & crassi sunt plurimi. in medio verò totius frictionis caput erectum perfricetur. Exercitationes ad ceruices & humeros pertinentes, manuum commotio: omnia, quæcunque à me de vertiginosis dicta sunt administrantur. satis verò hic ex copia ibi descripta positum est: præterquàm quòd velociores horum exercitationes esse oportet ad sudorem mouendum, caloremq; excitandum: hæc enim omnia extenuant. Verùm & in omni vita oportet excandescentiam iracundia vacantem inijcere. Alimenta omnia ex crassis leguminibus mala: triticei verò panes sicciore præbendi: alica elota, & ex ea forbitiones. sed medicamenta voluptatis causâ eadem cum supra positis sunt: nunc autem plura ex acrioribus ponito piper, zingiber, libysticum. Liquamina verò ex aceto & cumino & suauia sunt & vtilia. A carnibus quidem maximè in totum abstineant, sin minus, in curatione saltem: in refectioe verò carnes deligantur, quæcunque sunt natura leues: quales sunt volatiliū, præter anatem, & concoctu faciles, vt lepores, suum pedes, salsamentum. & post hæc sitis vtilis est. Vini paulum bibatur albi tenuis odorati quod lotium mouet. Elixorū olerum assumantur quæcunq; facultate acria extenuant, et vrinam citant: qualis est brassica, asparagus, vrtica: crudorum autem lactuca ea parte cõtata, quam horam græci medici nominant. Cucumeres autem & pepon viro quidem robusto superuacua, nonnullis verò gustatione tenuis præbenda. mala est enim horum multitudo, cum frigida sint, atque humida. Fici viridis & maturæ vix vsus conuenit. Ambulationes, post eas

animi oblectatio molestia carens iuuat. iracundia utique & Venus no- **E**
 xia sunt. Effectus enim morbi similitudinem adducit. At nonnulli me-
 dici de concubitu falluntur. Nam quoniam naturalis in virum transi-
 tus aliquantum proficit, puerorum naturam in tempestiuo concubitu vio-
 larunt, tanquam citius eos roboraturi. sed isti à natura sponte præfinitum
 tempus, in quo omnia remedia fiunt, ignorant. Hæc enim singu-
 lis ætatibus propria simul opportunis temporibus creat. in tempore
 nanque concoctiones feminis, barbe, canorum. Quis igitur medicus
 naturæ cum mutationem feminum à principio, tum præfinitum singu-
 lis tempus variauerit. Quin & in morbi naturam impegerunt nondum
 enim in tempore quidam veneri dare operam cœperunt, ante immatu- **F**
 ritate rei noxam accipientes. vitam autem degere oportet in regionibus
 calidis & ficcis. siquidem res frigida atque humida morbus est.

Curatio Melancholiæ. Cap. V.

N Vm sanguinem detrahere expediat, deliberatione indiget in
 melancholicis. ex quo humore morbus oritur: quin etiam ex
 non pauca malorum succorum (Cacochymiam greci nominant,) mul-
 titudine. Itaque si in iuuenili ætate quis morbo corripitur, & veris tem-
 pore; vena in dextro cubito media cædenda est: ut à iecore sit opportu-
 num effluuium. id enim viscus sanguinis fons est, & bilis generatio.
 vtrumque verò melancholiæ alimentum. cædenda est, inquam, licet sint **G**
 graciles & sanguinis inopes: sed paulum sanguinis mittendum; quate-
 nus videlicet venæ sectionem vires sentiant, sed nullam noxam earum
 tenor accipiat. Nam & si crassus, & biliosus, & concretus, & ater, qua-
 lis amurca, sanguis est; nihilominus ipse naturæ prælium est atque ali-
 mentum. Quocirca si plus, quam decet, sanguinis effuderis; natura ci-
 bi penuria de propria sede prolabitur. At si sanguine refertus est æger;
 plerumque quidem non usque adeo malus sanguis est, vena tamē utiq;
 secanda est. verum non eodem die, sed alijs diebus repetendo, quan-
 tum satis est, sanguinis, detrahatur: eodem verò die modum sanguinis
 mittendi vires declarabunt. medio tempore, quò aliam euacuationem **H**
 sustinere valeat, liberalius nutriatur. Opus est autem & ventriculo ipsi
 quoque ægrotanti & laboranti opitulari. eum verò si atra bilis vrget;
 per diem vnum prius tenuiter nutrito ægro nigri veratri pondo drach-
 mæ duæ ex aqua mulsæ præbeantur. id enim bilem atram expurgat:
 necnon & thymi attici coma & ipsa bilem atram educit. commodissi-
 mum est autem singulorum partem, ut ex utroque duarum drachma-
 rum pondo fiat, exhibere. post purgationem lauetur, viniq; paulum
 bibat, & alia in cibis iucunditas concedatur. stomacho enim ac viribus
 laboriosa

- A** laboriosa purgatio est. posthac iterum ad media faciendus transitus. cum prius verò cataplasmate atq; irrigatione laxaueris; cucurbitulam iecori & ventriculo, aut eius ori admoueas. nanque hæc detractio multo, quàm sectio venæ est opportunior. tergis quoque inter scapulas cucurbitulam affigito: siquidem eo loco stomachus adhærescit. Deinde rursus reficiendus æger. Atque si alimentum vires instaurauerit; caput radendum: cui postea cucurbitula affigenda est. huius enim morbi inter alios prima ac maxima causa in capite est. Porro neque sensus ipsi à noxa immunes sunt: nam inde ipsorum exortus atque initium est. commutantur igitur & ipsi, ægritudinemque participant. utique non
- B** nulli & sensibus delirantibus corruptè sentiunt. At stomacho potissimum succurrendum est: cum & ipse malè habeat, & in ipso bilis atra resideat. Igitur absinthij succum ab exiguo incipiens ad fabæ usq; magnitudinem assiduè deuorato. id enim ne bilis gignatur, impedimento est. Benefacit & aloë. nanque ipsa ad inferius intestinum bilem deducit. Nempè si recens malum sit, neque multum homo à naturali statu discesserit; alia huic medela opus non est: sed reliqua victus ratione vtendum, & ad pristinum habitum recuperandum, & ad exactam mali purgationem faciendam, & ad vim corroborandam: quæ omnia, ne iterum morbi reuertantur, efficiant. Victum autem in refectione conuenientem posterius exponam. Si ab his paulum debilitatus morbus denuò inualefcere visus fuerit; vehementiora medicamenta requirit: neq; in aliud tempus differendum est. Verum si ab coercitis mulierum mensibus, aut in viro ab suppresso hæmorrhoidum profluuiio morbus creatus est; irritandi sunt loci, & aliquid soliti excrementi profundendum. Si cunctatur, neq; descendit, in aliam quampiam partem sanguine prolapso, morbus verò exacerbatur; euacuatio facienda est, & à talis incipiendum. Quod si non, quantum satis est, sanguinis, inde manuerit; cubiti quoque vena secetur. Interiectis autem reficiendi causa tribus, aut quatuor diebus, Hieram, id est, Sacram, quæ purgatoriū medicamentum est, potui dato. Ad hæc cucurbitam medijs corporis partibus applicato, iecori videlicet affigēs. Sed maturanda negocia sunt, ac celeritas adhibenda. exiguis enim medicamentis morbus non obsequitur: si magnis autem non vincitur, sed resistit; tunc firma sede melancholia nititur. Quod si penitus totum corpus occupauerit sensus, mentem, sanguinem, bilem, neruos etiam corripuerit; & ipsa insanabilis efficitur, & aliorum morborum corpori sobolem inserit, furoris, neruorum distentionis, resolutionisque. quæ si à melancholia proueniunt; sanationem utiq; accipere nequeunt. Quam ob rem ad hoc malum propulsandum veratro vtendum est. Sed antequàm veratrum agrotus accipiat; stomachum ad vomendum exerceat, & humores extenuet, &

A R E T A E I

corpus fluxile reddat. Vomitiones autem hæc præstant nonnunquam **E**
ieiuno stomacho, nonnunquam radice prouocati. Docebimus verò et
modum & materiam: docebimus & veratri species, & vtendi ratione:
item quo pacto singula & distinguere, & ordinare prius oporteat: &
quo pacto in vomitionibus subueniendum sit, indicabimus. Incredibi-
le est autem nisi ab his funditus cõuulsus est morbus, at multorum sal-
tem annorum interuallo non sopiri. plerunq; enim postea melancho-
lia rursus suboritur. Quòd si iam firmas radices egit; nihil iam vltra
differendum est: sed quæ ad veratrum pertinent, omnia administran-
da. Nempè ægroti omnes sanari non possunt: medicus enim Deorum
potentiam anteiret. verum dolores sedare, morbos intercipere, atque **F**
obscurare, medico fas est. Itaque nimirum his, quæ posuimus, adhibi-
tis, medici defatigantur, seque aliud quicquam facturos negant. atque
duas causas, aut morbum insanabilem esse, aut omnia se remedia ten-
tasse prætexunt. Nihilominus tamen sacram ex aloe medicinam subin-
de præbere haud alienum est: siquidem opportunum melancholiæ sub-
sidium affert, stomacho & iecori subuenit, bilemque deiciens mirifi-
cè prodest. Quin etiam maluæ seminis pondo drachmam ex aqua pro-
pinare optimum esse quidam experientia compertum habuit. Infinita
præterea sunt simplicia medicamēta: quorum alijs alia vtilia sunt. Post
id genus labores demum reficiendus æger est: quibusdam enim, quan-
diu medicatio adhibetur; tandiu morbus permanet, quanuis labefacta **G**
tus ac debilis: at si homo carnes refarciat, ac vires instauret; simul om-
nia morbi vestigia oblitterantur. nam potentia naturæ sanitatem, im-
becillitas morbum parit. Propterea ad refectionem conuertatur ægro-
tans in aquis sponte calidis sæpe commorans. medicamenta enim, quæ
in his sunt ingenita, opem ferunt, bitumen videlicet, aut sulphur, aut
alumen, ac multo his plures aliæ facultates. Bona vtique est humecta-
tio morbi squallorem tollēs, & curationis vexationem mitigans. Raræ
autem ac molles carnes ad ægritudinis remissionē maximè faciunt: ve-
rum siccæ ac densæ melancholia laborātibus carnes sunt. Inunctio pin-
guis cum leni frictione adhibeatur. cum multo aut oleo, hæc cõtineat. **H**

Multa de-
ficiunt.

panes loti cum vino aliquo dulci theræo, cretensi, & scybellite, quod
Pamphyllum vocant: aut vinum & mel, quæ iam diu permixta fue-
rint. oua & frigidiora & calida, putaminibus nudata: non pingues car-
nes vim detergendi habentes: porcorum pedes, & capitis partes: auium
alæ pingui carentes: venatio, vt leporis, caprearum, damarum car-
nes: fructuum autumnalium quisquis optimus fuerit. Stomachi sub-
uersioni consulendum est ante cibum, quò minus deuoratus reij-

- A** ciatur. quare ante omnes cibos mulsæ cyathi dimidium dandum est, bibitumque per vomitum reddendum: quò stomachi excrementa purgentur. sic enim cibus in ventriculo firmus residet. At medicamina necessariò educendorum purgatoria sunt pini fructus, & vrticæ: semina coccali & piperis, amygdala amara. mel eis consistentiam præbeat. Sin exiccare volueris; optimè proficit myrrha, & iridis radix, & medicamen ex viperis, & Bistini, & Mithridatis antidotus, et id genus alia propè infinita. Exterius apponēda sunt cataplasmata, quorum materia est fertula, & papauer, & terebinthi lachryma, & hyssopum, & oleum ex rosis, aut ex œnanthe. cera autem hæc omnia cogantur. Inunctio pinguis, gestationes, deambulationes, & alia, quot carnes reficiunt, & vires instaurant, & naturam in antiquum statum reuocant; administrentur.

Sextū &
septimum
caput de-
ficiunt.

De curatione Phthisis, seu vlcerū pulmonis. Cap. VIII.
Carens principio & fine.

- quemadmodum in naui & tranquillitate. nam si recte habuerit ægrotans; in mari gestatio fieri poterit: atque ibi vitam deget. cum vlceribus enim quiddam siccum marina falsugo communicat. à gestatione quiete concessa vtendum in præsentia pingui oleo. post frictiones oleum cum aceto infundatur, paulum primò, deinde adiiciendum vsque ad heminas quinque, aut sex, aut multo plus etiam: sin minus, at saltem quantum quis ferre poterit. multoties enim vel id solum pro omni alimento satisfecit. Lac verò assumptu suaue, potu facillimum, nutritu solidum, & qualibet esca à pueritia familiarius est: præterea visui colore delectabile, medicamen arteriam non asperans, guttur læuigans, ad eiiciendā pituitam facilem spiritum reddens, inferiorem exitum lubricum efficiens, vlceribus dulce subsidium, et quolibet alio benignius. si quis multum lactis potat, nullo alio eget alimento. in morbo enim bonum medicamen est lac, eiusdem & alimentum efficitur. nam hominum lacte vrescentium nationes frumentum nō edunt. optima verò est cum lacte & puls, & bellaria, & alica lota, & quæcunq; edulia ex lacte fiunt. quòd si et alia esca indigeat; eiusdem generis esto. ptisanæ cremor concoctu facilis, tenuis materiæ est. eatenus verò condiendus erit, quatenus absorptu facillimus sit. siquid etiam saporis iucunditatem afferens capiat; & illud medicamentum esto: qualis est ligustici coma, pulegium, mentha, salis exiguum, acetū, aut mel. si ventriculus non concoquit; huiusmodi exhibenda sunt. At si nihil ventriculo tale exhiberi necesse sit; omnibus ptisana præstantior est. Licet & ptisanam in alicam permutare: minus enim flatuosa, & concoctu facillior est; si quemadmodum & ptisana extersa deglubitur. In humidiori

bus reiectionibus faba vlcera purgat, sed flatibus redundat. item pisum **E**
 & ochrus, qui & quātò pauciores flatibus citant, tantò minus vlcera pur-
 gant. Itaq; medicus coniecturis ductus, prout præsentia postulant, his
 vti debet. istorum quoque condimenta sunt quotquot de ptisana me-
 morata sunt. At oua ex igne quidem aquea calida, sed ex animalibus
 nuper ædita optima sunt. priusquàm eam *

Reliqua
 huius ca-
 pituli vsq;
 ad. xiiij. ca-
 pituli defi-
 ciunt.

De curatione vlcera Iecoris, & puris ab eo effusionis.
 Cap. XIII. Carens principio & fine.

in iecore vlcus perniciosum insit. periculosissimus autem est, qui in **F**
 ventrem fit, saniei confluxus; si stomachum occupet, qui viam supe-
 riora petentibus præbet. Alimentum enim vitæ causa est: ipsius verò
 alimenti dux est stomachus. insuper medicamēta intimis corporis par-
 tibus stomachus distribuit. quapropter si ad quælibet deuoranda malè
 se habeat; celerius ægrum morbo atque fame consumi necesse est. Hæ
 sunt cuiusque loci, quo se pus conuersurum est, inter se differentes no-
 tæ. Nam si per intestina delabatur, tormina vexant, aluus liquida est, pi-
 tuita & bilis fertur: deinde cruentum virus circumfluens, aut humidi-
 tas aquæ similis, in qua crudæ carnes demersæ lotæque fuerint. Si pus in
 vesicam defluit, grauitas in renibus lumbisque sentitur. ac primò lotiū **G**
 multum & bile infectum: postea turbulentum, nullam subsidentiam
 cōtinens, quam græci Hypostasim dicunt, inconstansque decurret: ad
 extremum verò & sedimen album apparebit. Sin ad stomachum fur-
 sum versus pus rapitur, tunc orietur nausea, odium cibi, vomitus pitui-
 tæ, aut bilis, defectus animæ, vertigo vsque eò, donec pus erumpet. Præ-
 cipuum sanè fuerit in aliam partem auertere. praua enim hæc via est.
 Quòd si pus violentius feratur, omnia facienda sunt, stomachoque suc-
 currendum escis, medicamentis, victusque ratione. Sed omnia leniter
 adhibenda. Medicamētis quidem vt sinus effringatur, studendum est:
 herbam itaque hyssopum cum mulsâ potui dato, & marrubij comam **H**
 ipsam quoque cum mulsâ & succo absinthij. Hæc vtique, quò humo-
 res extenuentur, & viæ lubricæ reddantur, & purulenta corpora facile
 rumpantur, ante cibos bibere expedit. Dandum est & afininum lac bi-
 lem non generans, benè nutriens, in caseum non spissescens: quæ lactis
 virtus est. Ad hæc ægrotanti gratificandum in cibo & potione: quos, &
 si paulo deteriores iuuantibus sunt; nihilominus tamen cōcedito. nam
 stomachus nauseam mouenti & contristanti humori transitus erit. si-
 quidem nonnullos puris exitus offendit. Cauendum est etiam ne ieiun-
 ni sint: cumque aliquid cibi capiunt, illud purum syncerumq; sit. Opus
 est autem & in cæteris effluuijs diligentissimam stomachi curam susci-

A pere: quandoquidem ipse omnibus medicamentis iter præbet. Meminisse quoque iecoris oportet, vbi vlcerum radix est. Porro si pus in vesicam impetum facit; vrinam citantibus eliciatur: vtpote assari radice, adianto, & meo potabilibus. hæc enim ex mulsâ potui danda sunt. Bistini vtique varium medicamentum, & quod ex vesicario solano conficitur, & quotquot experimento aliquibus probantur; optima sunt. Verum enim verò si per intestina educere malis; tibi lac eductorium esto, præcipue quidem asinæ: id si non adsit, capræ, aut ouis. Succum autem lubrici & abstergentes præbeantur: qualis est ordeaceus. Obsonia sunt piper, zingiber, lygusticum. vtque semel de omni victus ratione absoluiam, in qualibet puris eruptione alimenta sint boni succi, stomacho vtilia, concoctionem facile admittentia. ea verò sint aut cremores, aut ex lacte pultes, & cibi ex amylo, & bellaria cum lacte *

Curatio Lienis.

Cap. XIII.

S Cirrhi in liene geniti discusiones non facillimæ sunt. quod si & ab hoc oriundi morbi proueniant, vtpote aqua intercus, aut malus habitus; insanabile malum effectum est. Hac ratione verò scirrhis medicus opem ferre debet: orientes auertere, & nuper incipientes discutere oportet: inflammationibus autem resistendum. Siquidem scirrhi inflammationibus ad difflationem tendentibus veluti hæreditario iure succedunt: hæc enim inflammationis germina sunt. Porro ijs remedijs vtendum est, quæ à me in sermone De acutis morbis relata fuerunt. Si tibi omnia facienti in inflammatione scirrhus immaneat; igni quoque similibus ad molliendam duritiam vtitor: irrigationibus ex aceto, oleo, et melle. Sed lanæ vice panni lintei complicati accipiantur. Sic vnguentariæ glandis puluis cribratus inspergendus est: & cataplasmatibus quàm mollissimis *

De curatione morborum in Articulis & Coxendice

D Cap. XII. Secundi Libri De curatione tardarum ægritudinum, Carens principio.

ciborum & raphanorum plerumque; deinde ad veratrum veniendū est. in his victus ratio aliarum affectionū cōmunis est & post victus rationem inunctio, lauatio in frigida marina præcipue quidem omnibus articularibus vitij communia medicamenta sunt. nam & podagricis veratrum mirifice, sed in primis morbi inuasionibus succurrit. Quod si multis iam annis inueterauit, vel & à maioribus per successionem descendit; ægrotum ad mortem vsque comitatur. Artuum exacerbationibus hoc sanè pacto subueniendum est. lanæ ex oue sordide adhibeantur: irrigationes fiant ex rosaceo & vino: nonnullis & spongia ex posca

Reliquū
istius libri
vsque ad
portionē
duodeci-
mi capitis
secundi li-
bri de cu-
ratione tar-
darū ægri-
tudinum
deficit.

A R E T A E I

profuit. Ad hæc cataplasma fiat, panis sumatur cum refrigerantibus, vt **E**
 puta, cucurbita & cucumere. Accipiatur & cucurbitula tenuis, & plan-
 tago herba, & rosarum folia. Necnō et sideritis dolorem sedat cum pa-
 ne & musco: & symphyti radix, & pentaphyllos herba, Quinque foliū
 romani vocant: & marrubiū, quod folijs est tenuibus. huius decoctum
 quidem infusum dolorē leuat. ex ipsa verò herba cum panis micis, aut
 cum ordeī farina cataplasma fiat. Malorum quoque citriorum pars nō
 apta cibo cum polenta magnopere subuenit: Fici aridi & amygdalæ
 cum aliqua farina. Hæc vtique est refrigerationis materia. Et hoc qui-
 dem remediorum genus aliud alium iuuat: & idem interdum alium
 atq; alium. Nonnullis verò calefacientia remedio sunt: atque idem re-
 medium aliàs alij opitulatur. Peruulgatum est autem & hoc ad dolorē **F**
 tollendum proficere. Capram oportet herbam iridem ad satietatem
 depasci: deinde interposito tempore, quantum ad pabulum in ventri-
 culo conficiendum satis sit, capram immolare: atque intra eius ven-
 trem in fimo pedes ægrotantis occulere. Demum infinita sunt medi-
 camenta. ægrotos nanque sibijs remedija parare vrgens impellit
 calamitas. Sed medicorū auxilia in proprijs libris conscribentur.

Curatio Elephantis. Cap. XIII. & vltimum secundi voluminis De curatione longorum morborum.

M Orbis, quò dissoluantur, maiore esse remedija opus est. Sed quæ
 nam medela excogitari poterit, quæ elephantem tam ingens
 malum expugnare digna sit? neq; enim in parte vna, aut viscere vno in-
 hærescit: neq; aut intus duntaxat labes occulitur, aut extra prorumpit:
 sed & in penetralibus totum hominem occupat, & exterius totum am-
 plectitur. Triste profectò, & visu terribile spectaculum. feræ nanq; spe-
 cies est. ac vnà cum his viuere, vnà cibum capere perinde, atque in pesti-
 lentia, formidolosum est. etenim per inspirationis communionem faci-
 lis infectio est. Quid igitur quispiam in arte medica inueniat, quod hu-
 iusce mali dignum remedium contineat? Verum enimuero omnia cō- **H**
 ferre simul oportet medicamenta, & victus rationem, & ferramenta,
 & ignē. Hæcque si nouo & orienti affectui adhibueris; sanationis spes
 affulget. Sin ad summum suæ creationis ascendat, in visceribusque sta-
 bilis sedeat, quando & in faciem inuadit; tunc de ægri salute spes omni-
 no abscissa est. Itaque venas in cubito ambas incidito: incidito & venas
 in malleolis eodem die: temporis enim interiectio atque separatio fun-
 dendo vbertim sanguini, & recreandis viribus aptior est. nam sangui-
 nem sæpe & multum mittere opere præcium est: quippe qui vitij huius
 alimentum sit. exigua verò ipsius pars est optima, quæ naturæ cibum

præbeat. Idcirco qua ratione prauum inquinatumque detrahatur, atq;
A interim corpori familiare ac bonum procreetur; cōiectandum est: quo-
ad alimenti penuria morbus prius fatigetur. noua enim esca applicata
corpori spatio temporis antiquā obscurat atq; debilitat. Postea medici-
nam sacram non semel propinato: quin omnia sæpius iteranda sunt, &
resumptio, & ad priora reditio. Esto & alia medicamētoſa in cibis pur-
gatio: sicut antea De curatione doloris coxendicis diximus. Lac etiam
promiscuū atq; indiscretum, sed largius ad aluum molliendam potui
detur. verū quintam aquæ partem, quò lac totum dilabatur, atq; de-
scendat; adijcito. At ieiunos primò ad vomitum celerius ducito, dein-
de à cibis iterum, postea aſumptis raphanis. frequenter autem atq; aſſi-
B duè omnia fiant. Veratrum quolibet tempore, sed potius vere atq; au-
tumno diebus alternis exhibeto: atq; idem in proximum annum repe-
tatur. Ceterū si morbus ſualuerit; potabilia medicamēta, quotquot
quis cognouerit, potanda præcipiat. multa enim ac varia adhibere me-
dicamēta est operæpreciū. Atqui & ego quotquot mihi cognita sunt,
literis mandabo. Cedriæ cyathum vnum, brassicæ duos miscens dato.
Aliud, sideritidis succi cyathus vnus, trifolij cyathus vnus, vini & mel-
lis cyathi duo. Aliud, dentis elephanti ramētorum drachma cum vini
cretici cyathis duobus. Quin etiā viperarum reptilium ferarum carnes
& ipsæ in pastillos conformatę bibuntur. oportet autē & caput & cau-
C dam ad quatuor digitorum spatium præcidere, reliquū vsq; eò elixare,
donec spinę separētur: carnes verò in pastillos redactas in vmbra frige-
facere: qui potioni, quemadmodum & scylla, exhibeantur. Ipsæ quoq;
viperae in coena obſonio dentur: quas coquere, & cōdire perinde, ac pi-
ſces, opus est. At si medicaminis illius varij ex viperis cōpositi facultas
adſit; id pro omnibus, quandoquidem omnia simul continet, bibendū
est. Præterea corpus detergendum est, tumoresq; calefaciendi. Alia itē
medicamenta sunt innumera Celtarum, quos hac tēpeſtate Gallos vo-
cant. Nitroſis quoq; illis factitijs globis, quibus velaminū sordes expur-
gant, ſaponemq; vocant; illis inquam, globis corpus in balneo deterge-
D re optimum est. Et portulaca, & sedum cum aceto benè facit. Rumicis
etiam radicum decoctum cum sulphure ignem nō experto ſummope-
re deterget. Illud item varium ex alcyonio trito, & nitro, & aceti ſecē
cōbuſta, & alumine fiſſo, & sulphure viuo, & coſto, & iride, & pipere.
forſitan autem omnia pro ſingulorū viribus miscenda sunt. Aliquibus
verò & hoc equis portionibus cōpositū inſpergentes perfricabimus.
Faciei tumoribus ſarmētorum cinerē alicui ferarum adipi admiscens
illinito, leonis videlicet, aut panthere, aut vrſi. ſin his careas, animalis,
quod græcè χυνάλωπεκα vocant: latinè vulpanſerē dicas. quod ge-
nus auis est, ſi per literas χ & η prima ſyllaba ſcribitur: aut laconicū ca-

A R E T A E I

nem significat ex vulpe et cane natum, si per *κ* & *υ* eandem syllabam **E** scripseris. simile enim in dissimili, quemadmodum simia homini, mirifice prodest. Item ammoniac gutta cum aceto, er plantaginis, aut sanguinalis herbe succo. & hypocisthis, & lycium. Si carnes liueant; prius, quò locus succulentus reddatur, scarificandus est. At si ab acribus fluctationibus exulceratas partes lenire volueris; fœnigræci aut ordeï cremoris decoctū molle absterforium est: item ex oleis rosaceū, aut lentiscinū. Assidue verò lotiones & ad corporis madefactionē, & ad noxiarum humiditatum difflationem mirè proficiunt. Esca munda esto, boni succi creatrix, concoctu facilis, simplex: & victus ratio prorsus rectè instituta sit in somno & vigilia, in ambulationibus & locis deligendis. **F** Exercitationes adhibeantur, cursus, cōuersiones corporis, perē aut sacculi iactus. omnia hæc citra lassitudinem aptè & cōgruenter intendantur. Esto & vocis emissio spiritus opportuna exercitatio. Vestis esto munda, non modò vt aspectu iucunda sit: sed quoniam etiam sordida cuti mordacia sunt. Ieiuni absinthite vinū potent. Oppidò quàm utilis est & panis ex ordeo, & falamētum tempestiuum, & exiguum quid maluarum, aut brassicæ semicoctum cum cumini liquamine. In cœna staphylini radix apponatur, & alica cum vino & melle antiquo mixtis: & marina quotquot ventrem subducunt, tellinorum iuscula, ostrea, erinacei, & ex piscibus saxatiles: ex terrestribus feræ lepus, aut sus: inter **G** aues perdices omnes, palumbes, columbi, & quęcunque optima in illa regione inueniuntur. Inter fructus arboreos illi admittantur, quos græci Horęos vocant: quòd ea parte anni maturescant, quam ijdem græci Horam appellant. Vina dulcia vinosis meliora. Balnea spòte calida sulphurosa iuuant. vita in aquis diu ducenda est: & mare, & nauigatio cōueniunt. Præterea per veratrum purgationes fiant. Album quidem superiorem ventrem, atrum verò inferiorem purgat. Quin & album veratrum non vomitum tantum molitur; sed etiam omnium simul purgantium medicamentorum efficacissimum est, nō multitudine & varietate excrementorum: id enim & affectus ille, qui Cholera dicitur, **H** præstare solet: nō distentionibus & violentia in vomēdo (ad hoc enim & nausea & mare validiora sunt) sed potentia & qualitate non vitiosa. quippe quæ laborantibus sanitatem reddit per exiguam purgationem, & modicam intensionem. vetustorum præterea morborum omnium firmis radicibus inhærentium, si cuncta alia medicamina viribus inferiora sint; id vnicum remedium est. siquidem igni facultate persimile est album veratrum: & quod ignis exurens facit, eo plus veratrum interius discurrens operatur: videlicet facilem spirationem ex difficili, ex pallido colore floridum, & ex macie corpulentiam *

Quæ deficiunt quærito quam præstantissimi medici Areteï.

Ruffi

R V F F I E P H E S I I

DE CORPORIS HVMANI

PARTIVM APPELLATIONIBVS

LIBRI TRES

Iunio Paulo Crasso Patauino Interprete.

R V F F I E P H E S I I D E C O R P O R I S
humani partium appellationibus
Quæ in primo libro continentur.

Vnde cuiusque Artis tradendæ initium sumendum.	cap. i.
Quæ prius, & quomodo docere Autor velit.	cap. ii.
Diuisio Corporis in maximas partes.	cap. iii.
De superioribus Capitis, & Faciei exterioribus partibus.	cap. iiii.
De Oculi exterioribus partibus.	cap. v.
De Faciei infra oculos partibus.	cap. vi.
De reliquis Faciei partibus.	cap. vii.
De Ore, in eoque contentis.	cap. viii.
De Collo, eiusque partibus.	cap. ix.
De Ala, Humero, Brachio, & Manu.	cap. x.
De Thorace, & eius partibus.	cap. xi.
De Genitalibus marium, & eorum partibus.	cap. xii.
De foeminarum Genitalibus.	cap. xiii.
De Dorsi ossibus.	cap. xiiii.
De reliquis vsque ad Inguina partibus.	cap. xv.
De partibus ab Inguinibus vsque ad extremos pedes.	cap. xvi.
De Interiorum membrorum appellationibus	cap. xvii.
De Capitis tunicis, ossibus, ac futuris.	cap. xviii.
De quibusdam Capitis ossibus.	cap. xix.
De Musculis quibusdam, & processibus in capite.	cap. xx.
De Foraminibus caluariæ.	cap. xxi.
De Cerebro, Membranis, Neruis, Spinalique medulla.	cap. xxii.
De Oculis.	cap. xxiii.
De prima et secunda colli Vertebra, Osse Ypsiloide, Gula, Tonis, Aspera Arteria, Guttura, & Bronchijs.	cap. xxiiii.
De Cordis partibus, Membranisque pectoris.	cap. xxv.
De Glandulosis carunculis.	cap. xxvi.
De Ventris inferioris partibus.	cap. xxvii.
De Iecore, & in eo contentis.	cap. xxviii.
De Liene, renibus, vesica, vrinarijs feminariisq; vasculis.	cap. xxix.
De Musculis lumborum.	cap. xxx.
De Genitalibus foeminarum locis.	cap. xxxi.
De Testium tunicis, alijsque partibus.	cap. xxxii.
De Venis. cap. xxxiii. De Arterijs.	cap. xxxiiii.
De Neruis, Tendonibus, Cartilaginibus, Membranis, Tunicis, Adipe, Carne, & Medulla.	cap. xxxv.
De Humoribus Excrementisque corporis.	cap. xxxvi.
De Foetu, & ad eum pertinentibus.	cap. xxxvii.

R V F F I E P H E S I I

DE CORPORIS HVMANI

PARTIVM APPELLATIONIBVS

Liber primus.

IVNIO PAVLO CRASSO PATAVINO

INTERPRETE.

Vnde cuiusque Artis tradendæ initium fumen-
dum sit. Cap. I.



Vid in arte citharæ pulsatoria primum didicisti? Singu-
las fides pulsare (credo) atque nominare. Quid in gram-
matica primum percepisti? Vnumquodq; elementum
cognoscere ac nominare. Igitur & alias artes à nomini-
bus docere incipiunt: Et ferrarius faber, & alutarius cer-

do, & carpentarius in primis ferri nomen, & instrumenti, & aliorum
omnium ad artem facientium nomina tradunt. Quin etiam grauiore
artes nonne & ipsæ à nominibus pari ratione docendi exordium ca-
piunt? Quid enim primum in geometria accepisti? Punctum sanè, et li-
neam, & planum, & superficiem, & figuram triangulam, & circulum,

B aliaque id genus, quid nam sunt, dignoscere, rectèq; appellare. Vis ne
igitur & medicinalem facultatem à nominibus exorsus perdiscere? ac
primum omnium, vt singulas corporis partes appellare cōueniat, dein-
de et reliqua, quemadmodum sermonis processus, connexioque requi-
ret, agnoscere? Aut tibi satis esse videtur, me ceu mutum, quæcunque
doceri postulas; tibi ostendentem explicare? Mihi verò id non melius
esse, teque ipsum hoc pacto discere, & alterum docere, haud facile esse
videtur. Atque de his quidem sic mea fert opinio.

Que prius, & quomodo docere velit, proponit. Cap. II.

C Aeterum audiens, & in puerum hunc respiciens; memoriæ, quæ
sensui patent, commendato. Ante omnia vt interiora appellan-
da sint, animal quopiam homini quàm simillimum dissecantes; in-
struere te conabimur: Nihil enim impèdiet, tametsi non omnia om-
nibus similia sint; quòminus summam saltem cuiusque doceamus.
Verùm priscis temporibus in humanis corporibus huiusmodi gene-
rosius ostendebant.

Diuisio Corporis in maximas partes. Cap. III. E

Maximę corporis partes hę sunt, Caput, Collū, Thorax, Manus & Crura. Thoracem autem non solum eam partem, quę à iugulis ad præcordia vsque pertinet, appellamus: verum etiam totum illud, quod intra iugula pudendaque concluditur.

De superioribus Capitis, & Faciei exterioribus partibus. Cap. IIII.

Caput vocatur quod pilis contegitur separatim, & simul cum facie. capillati autem prior pars Synciput, auersa verò occiput nominatur. partes à lateribus syncipitis positę Tempora dicuntur, gręcę Corfę & Crotaphi. quod autē in medio capite est, vbi maximē capilli inuoluuntur, Verticem vocamus: partem sub syncipite, Frontem. iuxta tempora pilorum exortus Iuli gręcę, latinē Lanugo dicuntur. occipitis autem capilli promissi Crines vocitantur. vltimas frontis rugas gręci Episcenium vocāt, nostri Supratentorium dixerint: quod oculis attrahimus, quando nobiscum aliquid altius cogitamus, aut veremur. alij verò partem sub supercilijs carnosam Episcenium vocauerunt. At supercilia hirsutę frontis extremitates sunt: quorum interstitium Mesophryon gręcę, latinē Glabella, quod glabrū sit, dicitur: sub supercilijs Palpebrę, quas etiam Genas vocant, altera supra, altera infra sitę sunt. **G**ab ijs prodeuntes pili gręcę Tarfi & Blepharides, latinē Cilia nominantur. harum extrema, cum nos dormimus, sese cōtingentia, Coronę & Chelę hoc est, Vngulę dicuntur. superioris palpebrę superficie quod super impendet, Cauum: illi autem respondēs inferius, Subcauum vocant. Id sanē & in aqua inter cutem, & alioqui in prauo corporis habitu, & in longinquo hęmorrhoidum effluuio, & antiqua mulierū menstrua purgatione, nōnunquam etiam inchoantibus lippitudinibus intumescere cōsuevit. Huiusmodi verò lippitudines mitiores esse videntur: propterea & id genus affectus, quoniam caux partis tumor est, gręcę κοιλοιδύει dicitur. At caux superioris inferiorisque palpebrę extremitates à gręcis Canthi, à nostris Anguli nominantur: alter maior ad nasum vergens, minor alter tempori propinquus.

De Oculis exterioribus partibus. Cap. V.

Oculi verò quod in medio aspicitur, Visio et Pupilla nūcupatur. Glenam etiam simulacrum in pupilla apparens vocant. Quod autem inter pupillam atque album, continuum interiacet, Iris est: sic vtique, quod colore euariet, nominatur: nam modo nigrum, modo

A igneum, modo cesium, modo splendidum id esse conspiciamus. Corona nigrum ambit, & ab albo distinguit: quæ circulus et copula oculi tunicarum est. Earum sanè prima duabus naturis prædita duo quoque nomina gerit: Cornicularis quidem in medio, & vsque ad iridem: hæc enim eius particula expolitis cornibus assimulatur. candida verò est altera pars omnis, qualis & aspicitur: nihil mediæ neque natura, neque colore similis. ipsi autē vocata Epidermis super incumbit. qua in iuuenibus & senioribus, & in affectu, qui Chemosis græcè, Vnguis latinè dicitur, abscedente atque elata, rufum siue igneum cernitur. Aliæ tunicæ, quæ sint nomenclatura præditæ; paulo inferius in animalis dissectione explicabitur.

De Faciei infra oculos partibus. Cap. VI.

S Vb oculis insurgentia ossa Subocularia nonnulli, alij Hypopia nominant. A superciliarum medio interstitio, quod Glabellâ vocari diximus, deorsum versus nasus protenditur. cuius foramina Rhothones, & Nares, atticè quoque Myxæ appellantur. sed Hippocrates pituitosum excrementum per ipsas destillans, Myxam, latini Mucorem vocant, Athenienses verò Coryxam. cartilagineum illud, quod foramina distinguit, nasi Interseptum est. partes osseæ, quæ utrinque ad malas vergunt, nasi Dorsum. extrema verò hinc atque in huiusce ossi fastigij Pinna vocatæ sunt. istæ in vehementiori spiritus difficultate, & alioqui cum voluerimus, agitantur. carneum autem illud ante nasi septum in labia descendens Columna, nasi Extremitas, Globulusque appellatur. at sub columna in superiori labro cavitas Philtrum græce vocata est: quasi Amatoriū, siue Amabile dixeris. sed totum sub naso superioris labij Hyporinon græcis est: latino vocabulo caret. deinde labia duo: quorum extrema græcè Prochila, latinè Prolabia dici possunt. qua parte autem committuntur, Prostomion vocant. inferioris labij cavitatem Nympham. Auriū foramen, per quod voces exaudimus, Auditū appellant. partē pendulam latini Fibram, græci Lobon vocant. quam etiam solam auris particulam nomen habere, cæteras verò nomine carere dixit Aristoteles. cæterum medici illis quoque nomina imposuere. Pinnam quidem supremam partem latam atque decliuem appellauerunt: Helicem totum illud, quod deinde aurium extremam oram ambit: Anthelicem id, quod in medio cavitatem extollit. Concham post anthelicem cauum: oppositam verò conchæ eminentiam iuxta temporis fines Tragum, latine Hircum dixeris: helicis finem, qui subbrevis est, Antilobida vocant.

TOta capitis prior pars Facies dicitur. Malæ sub oculis faciei eminentiæ sunt: vbi pudoris sedes est: maximeque ibi rubor ostenditur. post malas autem Maxillæ habentur: quarum altera superior, altera inferior est. inferiorisque maxillæ acies Mentum est. sub eadem inferiore maxilla carnosâ pars Leucania græcè dicitur. sed nonnulli hanc quidem carnosam partem Mentum, Leucaniam verò cauum iugulo proximum appellauerunt. Barbæ prima sub temporibus germinatio Iulus à græcis, à nostris Lanugo dicta est. primus eius in superiori labro exortus græcè Propogonium: latinè Probarbium, si fingere liceat, dicitur. qui pili postea adaucti Mystaces appellantur. sed in summo mento pili Pappus, sub mento autem Hypena græcis vocibus dicuntur: latina nomina deficiunt.

De Ore, in eoq; contentis. Cap. VIII.

PRima labiorum diuisura, & interior vsque ad fauces inanitas Os est. in ore autem alia sunt, & Dentes, quos nonnulli Cranteras appellant. horum primores quatuor Incisores, Caninos autem sequentes vtrinque singulos: Molares verò, & Maxillares post caninos vtraque ex parte quinos vocare consueuimus: Sophronisteras, hoc est, moderatores horum intimos atque vltimos græci vocant: quòd eo tempore, quo moderatos temperantesque esse oportet, oriri incipiunt. Ab vtraque parte vnus est, Genuinos latini appellat. totidem & superioris maxillæ, eademque nomina sortiti sunt dentes. Maxillarum colligatio Habena, Mensæ summitates latæ molarium, Mortariola & maxillarum cauitates, in quibus dentes defixi sunt, appellantur. Gingiuae circa radices dentium carunculæ sunt. Linguae radix, vnde ipsa exoritur, nominatur. pars eius musculosa ore contenta Lingua est. Ceruix, quæ sequitur. Parasyra autem, quæ ab vtroque linguae latere sunt, græci nominant: Hypoglossida partem linguae inferiorem; Epiglossida verò, quod intimum est gutturi operculum quoddam impositum; ne cum deuoramus, quippiam in pulmones irruat. sed, cum spiritus ducitur, ne transeuntem aerem impediat, sublimis attollitur. Cœlum verò, et Palatum concaua est superioris maxillæ pars. Columna et Gurgulio quidam ex palato processus, quem Aristoteles Viiferum nominauit: quoniam ea parte inflammata vix quiddam simile pendere videtur. Vuam enim nō partem, sed affectum nominari oportet. Fauces omnis ea capacitas, quā inter deuorādū dilatamus, vocata est. propterea & Homerus dixit. Faucibus erupit vinumque humanaque membra.

A Neque enim ex arteria aspera, & pulmone cibum potumque Cyclops euomuit. id enim mirum in modum rude, fatuumque fuisset. Paristhmia dicuntur, & Antiades, & Mala, latinè Tonfillæ, carnosæ quædā glandulosæque partes vtrinque à lateribus faucium positæ. Hæ numero quatuor sunt, duæ in summo gutture vtrinque, reliquæ inferius locatæ.

De Collo, eiusque partibus. Cap. IX.

Infra caput est Collum, quod & Ceruicē vocant. Hypodiris græco vocabulo est in priori parte colli postremū. in priori item colli parte Bronchus est, & Aspera arteria, per quam spiritus ducitur. Bronchi
B summitas Guttur est, At posteriore colli parte Tendones sunt. iugulis proximum cauum Homerus Leucaniam vocauit. sed medici Anticardion, quasi cordi oppositum, & Iugulationem appellant. Quæ autem à tendonibus ad humeros pertinent, Epomidas vocāt. Humerus verò brachij caput est, quod lato scapularum ossi inferitur, & cum toto etiā articulo copulatur. At humeri Acetabulum est lati scapularū ossis cauitas. lata scapularū ossa à græcis Omoplatē vocata ea sunt, quæ tergo incumbunt: quorum intermedię eminentię ipsorum Dorsum dicitur. Acromion iuguli, scapularumque ossis copula est. Eudemus verò ossiculum perexiguum esse dixit Acromion. Claues, quæ & Iugula dicuntur, sub imo collo ossa sunt cum pectoris ossē commissa; humeros scapulasque, ne in pectus cadant, vt alijs contingit animalibus, prohibentia. nam cætera animalia iugulis priuata sunt. quocirca & latissimi pectoris homo est.

De Ala, Humero, Brachio, & Manu. Cap. X.

Ala sub humeri articulo cauitas est, in quam sæpe humerus luxatione delabitur. Malam verò appellare haud græci sermonis est. aliquid autem sub ala calantem ferre, sub mala habere dicunt. Humerus illud etiam à latinis dicitur, quod exit ab humero, sed à græcis Brachium. Huius apud humerum rotunditas Caput humeri est. Interior iuxta cubitum excessus, quem nonnullos imperitè Processum autuma re dixit Hippocrates, et ipse alterum humeri Caput est. post humerum totus articulus, acutumque illud, cui reclinati incumbimus, Ancon à quibusdam, ab alijs Olecranon vocatur. Dores autē Siciliam incolentes, Cubitum, vt nunc apud latinos in vsu est, appellant. Quin Epicharmus cubito ferire *χυβιτίζειν*, hoc est cubitissare, verbum ē verbo trāsfereudo, appellat. ossium verò brachij quod subijcitur Cubitus, supra positum Radius est. hæc ad Brachiale protenduntur. post quod lata pars & compacta, Palma latinè, græcè Metacarpion, Tarsusque nomi-

natur. sequuntur Digiti. Manus totum illud est, quod ab humero pen- **E**
 det, & extremū, quo apprehendimus. Ex digitis Magnus Pollexq; est
 ab alijs summotus: alter Index inter quatuor primus. tertius Medius
 vocatur, quartus Anularis, vltimus Paruus. ipsorum ossa Scuticulę, &
 Phalanges, & Internodia. primi articuli Procondyli græco vocabulo,
 (latino enim carent:) medij, Condyli: postremi, Metacondyli. vnguiū
 initia Radices vnguium vocantur. internę digitorum summitates Aci-
 ni & Vertices. carnosā pollicis pars sub manus cauo insurgens Stethos
 græcè nominatur, quod apud latinos Pectus sonat. spatium, quod inter
 indicem, pollicemque intercedit, carnosūque est, sub quo manus in
 cauum subsidet; Thenar dicunt: Hypothenar verò, quod sub quatuor **F**
 digitis est. sed omnem manus interiorem latitudinem Thenar Hippo-
 crates vocasse visus est. id apud latinos Vola significat.

De Thorace, & eius partibus. Cap. XI.

A Iugulis pectus in priore parte est. medium autem, in quod costę
 fubeunt, Sternon vocant gręci, latini Os pectoris. ab auersā col-
 li parte ad metaphrenō vocatum vsq; Tergum est. Metaphrenon inter
 tergum lumbosque, vbi renes adhærescunt, locatum est. Lumbi verò
 dorsi vltima pars sunt. carneę in pectore eminentiæ Mammę, atq; Vbe-
 ra vocantur. mammę extrema pars, Papilla primum verò in pubescen-
 do incrementum, Faba dicitur. totum autem tumorem gręci Ascoma **G**
 vocāt: latinè Vtrem, siue Vber dicitur. sed in mulieribus magis propriè.
 Latus, illud totū quod sub ala est, appellatur. ossa verò Costę: inter ip-
 sas spatia, Intercoitalia nominantur. Spurię costę sunt, quę ad pectora-
 le os nō perueniunt. Sub pectore cauum Ventriculi os dicitur: quod
 alij Procardion, quasi latinè Præcordium, nonnulli verò Cor appella-
 runt: doloresque ibi orientes, cordis morsus, cordisque dolores ef-
 fe dixerunt. Spuriarum costarum extremitates Cartilagines sunt.
 Musculosę autem partes sub cartilaginibus collocatę Hypochondria
 græcè, ac si dicas Subcartilaginea, latinè Pręcordia à quibusdam vocan-
 tur. Alius ac venter deinceps locatur. Epigastrium græcè super ventrē **H**
 posita cutis appellatur. Eius media cauitas Vmbilicus est, venarū, per
 quas infans alitur, segmentum. vmbilici pars media, Acromphalon à
 gręcis vocatur. cutis vmbilicum ambiens, quoniam corrugata senectū-
 tem significat, Vetula appellatur. sub vmbilico Abdomē est, & Aqua-
 liculus. huic continua vsque ad pudenda pars Pecten
 atque Pubes dicitur; alij Ephe-
 beon vocant.

A De genitalibus marium, & eorum partibus. Cap. XII.

G Enitalium porrò membrorum, quæ in maribus sunt, propendens particula Colis, ac Stema est: quæ autem non pendet, Seditum, Collumque vesicæ. lineam per medium discurrentem apud græcos alij Trammida, alij Orrhon appellarūt. colis extremitas Glans est. cutis eam tegens Præputium: præputijq; extremum Summum præputij. cauernula verò, per quam semen, vrinaq; profunditur, Vrethra Vrinariumq; iter nominatur. Vretera autem ne dicito: Vreteres enim alij sunt: per quos scilicet à renibus in vesicam vrina delabitur. Scrotū ea cutis est, qua Gemini inuoluuntur. Geminos aut, aut Testes appellare nihil interest. Geminorū quod supra est, Caput; quod infra, Fundū vocatur. pars scroti laxior Laccopedon græcè, à quibusdā Achichadaron, ab Atheniensibus Laccoschea nominatur. inter scrotū, & sedimētum, & femur locū Plichada vocant. Et transire græci διαπλίσσειν, & id, quod est, circum, Amphiplex enunciāt. Sophocles verò & in Dracōnibus hoc verbo vtitur dicens, cardinem circum comprehendentem. perinde ac si dixisset, circumplexum cardinem.

De muliebribus Genitalibus. Cap. XIII.

C **M** Vliebris autē pudendi quod supra est, Pecten dicimus. id triangulum est, & imi ventris terminus. ab alijs Epifion appellatur. pudendi rima Schisma à græcis dicitur, Scissurā latinè interpretamur. musculosa in medio caruncula Nympha et Myrton, ab aliquibus Hypodermis, ab alijs Clitoris nominatur. lasciueq; eam tractare κλιτορίζειν dicunt. Myrtochilas verò vtrinque posita carnosā corpora. cæterum hæc Euripho & Cremnos, id est Rupes vocat. Sed nostræ ætatis medici Myrtochilas Pterigomata (quasi alas dixeris,) appellant, Myrton verò Nympham.

D De Dorfi ossibus. Cap. XIII.

D Orfi ossa vertebræ sunt: quas etiam Homerus Astragalos, id est, talos vocat. tota autem vertebrarum compago Spinam constituit. Extremum lumborum Os Sacrum est. id ab aliquibus etiā Hypospondylon, quod Subvertebrum latinè verteris, dicitur. Eius vltimum ossiculum Coccyx, id est Cuculus est.

De Reliquis usque ad Inguina partibus. Cap. XV.

S Vb costis molles partes à græcis Laparæ & Ceneones, à latinis Ilia vocantur. Deinde ilium ossa, quorum excauata capita Hemine &

R V F F I E P H E S I I

Acetabula. Clunes autem ac Sedilia post lumbos carnosæ partes: quoniam illis sedendo nitimur; ab alijs Nates dictæ sunt. Sub quibus Hypoglutides idest Subnatales vocatæ iacent.

De partibus ab Inguinibus usque ad extremos pedes. Cap. XVI.

Inguina femorum priores partes sunt propè pubem posita. nervus autem ad acetabulum pertinens, ac totus articulus Coxendix dicitur. Femorum internæ partes Parameria græcis, Femina latinis sunt. Inter femina autem loca Mesomeria græcè, Interfemina latinè dicitur. Musculi genibus inhærentes Epigunides, quasi Geniculares dixeris, vocantur. osli autem super genu posito Epigonatis græca appellatio, latina, Patella est: Hippocrates verò Epimylica vocavit. Genu articulus est Femur cruri committens. Poples posterior pars est, in quam genu inflectimus. Gastrocnemia græco nomine magnus mulculus est, latinè fura: vnde latus nervus oriens ad calcem tendo factus adhærescit. Ofsium verò cruris quod posterius est, Sura quoque dici potest: prius autem, Tibia. Sed Herophilus Suram Radium etiam appellavit. vtriusque ofsis extrema pedi inserta Malleoli sunt. Tali verò non rectè vocantur. Siquidem & humanus pes Talum sub malleolo abditum, non conspicuum habet. Calx postremum pedis rotundum est. Planta & Tarsus pars prior & ampla est. Stethos verò, id est, latinè Pectus, pars inferior post cauum, vnde nascuntur digiti, vocatur. Istos autem perinde, ut manus digitos, appellare, aliaque manuum digitis communia recensere, nihil est, quod impediat.

De Interiorū membrorū appellationibus. Cap. XVII.

Igitur quæ oculis aperta sunt, o fili, subiectæque his ossa in hunc modum nominare decens est. Modò interiora corporis membra Simiam dissecantes proprijs nominibus illustrare tentabimus. quandoquidem ipsa ofsibus, musculis, extis, arterijs, venis, nervis ad naturam hominis proximè accedit: Secundò alia multifida: Tertiò ex bisulcis vtrinque dentata. Non vtrinque dentata, ac solidipeda longissima ab hominis similitudine summotæ sunt. Quòd si aliquid de membris interioribus exteriora tradentes memorauimus; idem bis repetere vltèrius opus non fuerit.

De Capitis tunicis, ofsibus, ac futuris. Cap. XVIII.

Aspice itaque sub caluariae cute tunicam. hanc Pericranion, quod Cranion, hoc est, caluariam obuoluat, græci vocant. Quam verò

A alia ossa ambientem tunicam videris, hanc Perioftion, latinè circum offalem verbum verbo reddens appellato. qua ossa caluariæ committuntur, Suturae sunt: quæ duarum ferrarum compagem imitantur. Earum vna quidem rotunda est, synciputque circuncidit: altera occiput: tertia medium verticem diducit, quibusdam etiam hæc syncipitis futuram transiens, frontemque ipsam secans, inter supercilia terminatur. binæ alię in temporum ossibus in squammarum modum totis oris paulatim extenuantur, atque ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. Ipsis quidem vetusta nomina defunt, sed nuper à quibusdam Aegyptijs medicis græcam linguam male doctis imposita sunt syncipitis futuram Coronariam, occipitis Lambdoide, idest lambda græcè literę similem, mediam verò Coniungentem appellatibus. temporaneas etiã futuras Lepidoïdes à squammarum similitudine vocauerunt. ijdem & aliorum ossium partibus ab antiquis innominatis nomina indidere: quæ ego, vt alijs nostri sæculi medicis innotescant, non prætermittenda iudicaui.

De quibusdam Capitis ossibus. Cap. XIX.

Inter caluariæ ossa meditullium Diploen nominant. vbi verò nascitur initium est, crebra ibi foramina Ithmoïde, hoc est cribri speciem referentia vocantur. per ea indubiè sternutamentum, mucusque propellitur. Nonnulli & hac parte nos in cerebrum spiritum attrahere confirmant. Proxima auribus ossa ob firmitudinem Lapidea nomen habent. ab vtroque enim latere singula ossa dura, subalbidaque sunt, magnitudine caput maximi manus digiti æquantia: per quæ auditoria itinera seruantur. Alij procliues occipitij processus Lapideos appellant, idque non rectè. inanes enim, & cauernosi, & minimè solidi nomini non respondent. Ab auditorijs autem meatibus ad malas pertinentes processus Iugalia ossa nuncupantur.

De Musculis quibusdam, & processibus in capite.

Cap. XX.

Musculos caua temporum replentes Temporaneos, qui inferiorem maxillam amplectuntur, Mansores vocant. Tenuis illi, & oblongi, deorsumque versus fauces vergentes processus Stiloïdes à columnæ similitudine dicti sunt. Eudemus autem ipsos gallorum rostris assimulat, ac sine appellatione relinquit.

De foraminibus caluariæ. Cap. XXI.

Foramina permulta caluariam excavant: quæ omnia duobus exceptis, quæ Cœca appellantur, nomine vocat. inter se autem medici

altercantur, vtra nam hoc nomine appellanda sint: num illa, quæ propè maximum caluariæ foramen adiacent, per quod spinæ medulla in vertebra delabitur: an illa, quæ propè auditorias cauernas, & paulò prius iuxta maxillæ articulos sunt. Sed neq; illa, neque hæc adeo cœca sunt, quin ea in magnū spinalis medullæ cauum peruadant, hæc sub foramina cribrū repræsentantia subeant. ac per ipsa omnia nerui transire cōspiciuntur. de quibus in diuisionibus sermo habebitur. verū ideo ipsi Cœca dixisse visi sunt, quòd nō in rectum excauata esse cernantur.

De Cerebro, Membranis, Neruis, Spinaliq; medulla. Cap. XXII.

INtra caluariam Cerebrū cōtinetur. id Membranæ circumuoluunt altera crassior robustiorq; ossi proxima: tenuior altera, & firma quidem, sed priore minus, quæ cerebrū contingit. Summa cerebri pars Varicosa appellatur: inferior atque posterior Basis: à basi oriens processus Parencephalis græcè, latinè Cerebellū. Ipsius cauernæ cerebri Ventricle: ventriculos interius obuoluēs tunica Choroides, hoc est, secundis similis cognominatur. Herophilus autem & membranam Choroides, id est, secundis similem appellat. Germina à cerebro enascētia Nerui sensorij electorijque sunt: per quos sensus, & voluntaria motio fit, omnisque corporis actio perficitur. horum autem neruorum quidam à spinali medulla, & ex ipsam cingente membrana expullulant. Dorsalem verò, spinalemque omnem pariter per vertebra defluentem medullam nominant.

De Oculis. Cap. XXIII.

OCuli tunicarum primam inter extima, conspicuaque membra cornicularem superius nominauimus. secunda Rhagoides atq; Choroides græcis vocabulis dicitur. qua parte corniculari subijcitur, Rhagoides: quòd exterius læuore, interius aspritudine vix acino, quæ græci Rhaga dicunt, sit persimilis. qua verò albam tunicā subit, Choroides vocatur: quoniam venulis referta secundas quas vocant, foetui circumdatas repræsentat. Deinde tertia humorē à vitri similitudine Hyaloidea vocatum continet. hæc antiquo vocabulo propter tenuitatem Arachnoides appellata est: latinè Aranealem dicere ausim. at quoniā Herophilus eam reti cōtracto assimulat, nonnulli & Reticularem: alij ab incluso humore, qui vitri gerit similitudinem, Hyaloidea nominarunt. Quarta membranula guttam quandam humoris Crystalloidea nominatam includit. hæc antiquitus nomine caruit, à posteris Lenticularis ob figurā, Crystalloides ab contento humore cognominata est.

A De prima & secunda colli Vertebra, Osse ypsiloide,
Gula, Tonis, Aspera Arteria, Guttur, & Bron
chys. Cap. XXIII.

PRimam colli vertebam Dentem appellare mihi videtur Hippo
crates. Sub tonsillis osliculum gutturis caput continens quidam
à figura ypsiloides appellauerunt, quod Ypsilo græco elemēto sit per
simile. Ceterum Herophilus, quoniam tonsillis assideat, Assessorē vo
cat. Secundę vertebre processus sursum, ac prorsum versus spectans Py
rinoides ab oliuę nuclei similitudine dictus est. Iter illud, per quod ci
bi potionesq; in ventriculum descendunt, græcè Stomachus, & Eso
phagus, latinè Gula est. Nervi ab utroq; eius latere Toni, cæteraq; sen
soria, atque fibrosa pariter Toni dicuntur, Tenores in latinum vertere
liceat. Asperę arterię summum Guttur est. anuli ad eius plexum creati
Bronchia, Cauernę, & Aortę nominantur.

De Cordis partibus, mēbranisq; Pectoris. Cap. XXV.

CAloris vitę, arteriarumq; motus initium cor est. eius summa
pars Caput dicitur, infima & acuta Fundum. cavitates ventricu
li, crassior & læuus Arteriosus est, tenuior & dexter Venosus, læuo ca
pacior. ab utroque autem capitis latere ceu alę prominentes, caue, mol
les, & ad totius cordis motum agitabiles, cordis Auriculę sunt. Cor cir
cumplexę membranę Pericardios nomen inditum est. Ex membra
nis pectoris quę ipsum in duas diducunt partes, Intersepientes appel
lantur: quę costas interius vestiunt, Succingentes. Membrana, quę pe
ctoris viscera ab inferioribus disungit, Trāsuerfum septū, & Phrenes.

De Glandulosis carunculis. Cap. XXVI.

EX glandulosarum carniū genere, quas Adenas græci vocant,
(multę autem sunt,) aliquę in collo, nonnullę sub alis, quędam
D in inguinibus, alię in mesaręo vocato reperiuntur. Carnes quędam le
niter subpingues ac fragiles sunt. inter has & vocatus Thymus nume
ratur: qui in regione capitis cordis locatus est, septimę colli vertebre
insidens, asperęque arterię extremo, qua cum pulmone committitur,
adhærescens. non in omnibus tamen inuentus est.

De Ventris inferioris partibus. Cap. XXVII.

Sub transuerso septo Venter est. cuius summa pars, primaq; ven
triculi nomen habet. deinde primus intestini exortus Hostiarius
latinè, seu Ianitor, græcè Pyloros est. postea Ieiunum intestinum sem-

per alimento priuatum: vnde ipsi quoque vocabulum fuit. isti conti- **E**
nuum Gracile intestinum est. Ex gracili biceps prodit exortus, voca-
tur autem altera eius pars Cœcum intestinum, quoniã reuera cœcum
est: altera Colon græcè, & Venter inferior, & Laxum intestinum à lati-
nis. id Homerus & Nieram appellat. Est autem totum intestinorum
vinculum ac firmamentum, quod Mesenterion, ac Mesarœon græci vo-
cant. Aræam verò & ventrem, & omne intestinum vetustissimi græci
appellabant, ex quo ad hæc vsque tempora hoc nomen Mesarœon de-
riuatum est, latini Lactes appellasse videntur. Post grande intestinum
colon appellatum Rectum est iuxta sedem ac principem. Quod ex or-
biculo ventriculi fundo egerminat, ipsumq; & aliquam cæterorum **F**
intestinorum partem velat, Epiploon græci, quasi Supernauigās, Omē
tum latini vocāt. A renibus exoriens membrana, omnibusq; prætenta
intestinis Peritonæos est. At propè intestini primum exortum posita
caro præpinguis, glandulisque interstincta Pancreas vocata est.

De Iecore, & in eo contentis. Cap. XXVIII.

A Dextra ventriculi Iecur est. Iecoris autem pars Transuersum se-
ptum, Peritonæumque attingens conuexa, quæ infra ventricu-
lo inhærescit, Caua dicitur. Sub maxima eius fibra bilis vasculum fi-
tum est, cuius media & angusta particula Ceruix est, infima Fundum. **G**
Iecoris Porta vena est, per quam alimentum illabitur. Quæ in sacrifi-
cijs autem aruspices Portas, Mensam, Gladium, & Vnguem appel-
lant; in homine quoque, sed obscura & atque incerta reperiuntur: ad
nullumque medicinæ profectum necessariò nominantur.

De Liene, Renibus, Vesica, Vrinarijs, Seminarijsq;
vasculis. Cap. XXIX.

V Entriculo à sinistra Lienis incumbit, cuius crassissima summa q;
pars Caput est. propè vltimas autem costas Renes duo: ex qui-
bus duo vrinæ ductus Vreteres græcè appellati vesicam intrantes pro- **H**
deunt. Vesica verò conceptaculum est, in quod vrina è renibus per vre-
teres delabitur, à vesica est Ceruix, Sedimentum, Transis, & reliqua cō-
memorata superius. At seminaria vascula quatuor sunt, duo varicosa,
duo Glandulosa: quæ Genitales etiam venæ vocatæ sunt. varicosorum
partes illæ, quæ testibus adiacent Assesores dicuntur. Quidā verò om-
nia Assesores appellari nihil laborant. Cæterum an hæc eadem in fœ-
minis perinde, vt in maribus, constituta sunt, contemplandum est. Fœ-
minas varicosis assesoribus carere Herophilus planè existimat, nos ve-
rò in pecudis vtero è testibus enata vascula, atque vtrinq; varicis instar

Areuoluta conspeximus. hæc autem in vteri cauum perforata subibant: è quibus mucosus quidã humor, si quis exprimeret, emanabat, magnaq; erat spes hos seminarios esse canales, & eorũ generis, qui varicosi nuncupantur. id autem vt se habeat, dissectiones seorsum declarabunt.

De musculis Lumborum. Cap. XXX.

INtra lumbos muscoli Psoæ græco vocabulo nominantur: qui soli etiam in dorso lumbis agnati sunt. Istos aliqui Vterales neruos, alij Vulpes cognominant. atq; in libro Cnidiarum sententiarum nomen istud scriptum est. Si renum autem morbus vexat, notæ hæ sunt, si lottium crassum purulentumq; sit, si dolor lumbos, ilia, inguina, sumenq; torqueat, tum verò & vulpes male habet. Vnde iam constat, quanti ista scire inter sit: quò ea, quæ sic cognominantur, agnoscas. Clitharchus exteriores dorsi musculos Psoas, Vterales neruus, ac Vulpes appellari falsò opinatur.

De Genitalibus foeminarum Loci. Cap. XXXI.

Genitale autem mulieris membrum græcè Metra & Hystera, latine Vterus Vuluaq; vocatur. Hippocrates & Delphyn & Genitutam dicit. Eius sursum versus vtrinque processus Cornua et Cirri sunt ipsam exterius sustinentia vasa. medium atq; supremum Fundum est. quæ vtrinque sunt, Humeri: eius extremitas Ceruix, atq; Collum. colli Hostium primus meatus: Hippocrates græcè Amphidion à rotundi ferri, quò præfiguntur aratra, similitudine vocat. deinde cauum, quod sequitur, multis appellatiõibus exprimitur. muliebris enim Sinus dicitur, muliebres loci, Vterus, ac Vulua. Sed totum genitale cum exterioribus Pudendum, obsceniorique vocabulo cunnus.

De testium tunicis, alijsq; partibus. Cap. XXXII.

DA circa testes tunice sunt latinis carentes nominibus, à græcis autem Erytroides vna, Dartos altera nominatur. neruus quoque cum arteria concauus ad testem peruenit, qui Suspensor à nostris dici potest: Cremastera græci nuncupant. venulæ pariter ad testes, vnde nutriuntur: hæque testium Altrices nominantur.

De venis. Cap. XXXIII.

Aliarum quoque venarum nomina, (vt semel dicam,) hæc sunt. si gracilem tunicam habet, sanguineq; complentur, Venæ sunt. omnes verò magnæ venæ Ventres appellantur. postea inter medicos vsus obtinuit, vt ea vena, quæ à iecore in renes propagines mittit, Caua

R V F F I E P H E S I I

diceretur. in ea Praxagoras initium esse febrium affirmavit: solamque **E** eam Cauam ipse nominavit. Cæterum alij & eam, quæ sursum in cor per transuersum discrimen euadit, alij & hanc, & priorem vnico vocabulo Hepatitin, (latinè Iecorariam dixeris,) vocitât. à liene exeuntem Splenitin, idest, Lienariam. Cæterum non, quemadmodum in iecore, ita & in liene sursum versus, deorsumque in sinistra parte discurrens vlla vena reperitur. qui verò id asserunt, impudenter mentiuntur: quandoquidem venulæ in lienem pertinentes & graciles sunt, & ibidem in liene finiuntur. Philistio italus medicus pro doriensium eam partem incolentium more quasdam venas, quæ per tempora in caput ascendant, Aquilas vocat. venas à corde illicò nascentes Dracontidas Hippocrates nominat. Herophilus venam crassissimam grandissimamque **E** ex corde pulmones petentem Arterialem appellauit. in pulmonibus enim contra, atque in alijs, res habet. nam venæ in his validæ sunt, proximæque ad arteriarum naturam accedunt: arteriæ contra imbecillæ, venarumque naturam sapiunt. Omnium autem quos nouerim, primus Dionysius Oxymachi Efflorescentiâ, græcè Epanthismon nomen nouum adinuenit. aitque Eudemus Efflorescentiam venam appellari. Sed mihi quidem Dionysius rem venæ similem efflorescentiam, neque idem venam atque efflorescentiam, sed quoddam aliud aduentitium sanguinis receptaculum vocare visus est: idque ipse ita esse testatus est eodem loco sæpius venam, efflorescentiam, arteriamque inculcans, ac **G** repetens. neque enim, si rem eandem venam efflorescentiamque putaret, ita vnquam locutus esset. nam etsi nihil aliud efflorescentia, quàm vena est: nihilominus ipse aliter sensit, atque appellauit.

De Arterijs. Cap. XXXIII.

ARterijs præterea vetustissimi græci Venæ nomen imposuerunt: cumque venas micare dicebant, arterias intelligebant. arteriarum enim micare, seu palpitare munus est. Eas etiam tortas, & spirabilia vasa, & cauernas, & inanitates, & nervos appellarunt. Aortam verò eam præcipue Aristoteles vocat, quæ per dorsum omnium maxima fertur. hanc Crassam Praxagoras appellare cōsuevit. Cauas autem per colum subeuntes Carotidas, idest, Somniferas antiqui nominarunt: quoniam compressæ hominem sopore grauabant, vocemque adimebant. Cæterum nostro sæculo non arteriarum, sed neruorum sensoriorum propè iacentium id vitium esse compertum est. quare si nomen permutare volueris, nihil peccati admiseris.

De

A De Neruis Tēdonibus, Cartilaginibus, Mēbranis, Tun-
nicis, Adipe, Carne, atq; Medulla. Cap. XXXV.

N Erui à cerebro, spinæq; medulla prodeuntes Actiui, Sensorij
Electiui, atque Toni: qui circa artus sunt, Copulatiui dicuntur,
crassæ autem ex occipitio propagines, quæque ad calcem è musculo na-
scentes feruntur, Tendonis vocabulum habent. Cartilagines sunt, in
quas ossa degenerant, neruis duriores. Membranæ tenuia sunt velamē-
ta: Tunicae, crassiora. Adeps pinguisima est alimenti concretio. Caro
autem in visceribus illud est, quod inter vascula concretum reperitur,
B subtegmen quoddam, ac veluti receptaculorum texturæ fartum: quò
inania eius spatia compleantur. In musculis Caro pars fibrosa ac firma
est, & quæ in vlceribus, ossiumque cauis recens concrefcit. Medulla ve-
rò in dorso Dorfalis, in vertebriis Spinalis, has etiam ambiens membra-
nula Spinalis dicitur. Medulla intra caluam cõtenta cerebrum est: Sed
in alijs ossibus Ossalis vocatur: siue in magnis infit cauis, vt in femore
atque humero, siue in angustis foraminibus, quas Serangas, id est, ca-
uernas, vocant: vt in costis ac iugulis.

De Humoribus, Excremētisq; corporis. Ca. XXXVI.

C **S** Anguis calidissimus est, flauissimusque succus. Pituita album cras-
sum, ac subsalsum excrementum est: quod cum resiccatur, nigre-
fcit. Bilis flaua amarum est, ac flauum excremētum. Porracea acris est,
atque subuiridis: Aeruginosa verò est valde mera, atque syncera. Atra-
bilis autem Sanguinis crassamentum est. Alij nigrum sanguinem atrā
esse bilem asseuerant. Reliqua excrementa huiusmodi sunt: Saliua qui-
dem oris est humiditas. Mucus falsum est cerebri purgamentum. Su-
dor est per omne corpus effusa humiditas. Vrina est nitrosus humor in
vesicam delabens. Flatus est in intestinis superuacuuus spiritus. Cypse-
lis sunt aurium fordes, quas Cerumina, aut Marmorata veteres latini
D appellabant. Menses in mulieribus sunt menstrua per vuluam sangui-
nis excrementa: quæ cum alba sunt, non menses vltra, sed Profluuium
nominatur. Lac est in mammis alimenti concoctio. Semen, græcè Sper-
ma, Thora, et Gonos, hoc est, Genitura idem significant. id verò est spi-
ritus simul, atq; alimenti genitalis in assefforibus concoctio. Praxago-
ras peculiari quodam modo succos nominauit, Dulcem, Temp̃ratū,
& Vitreum. hos à pituitę specie sic vocauit: item Acidū, Nitrosum, Sal-
sum, & Amarum. hos ita, vt gustatus iudicat, appellauit. alios præterea
Porraceum quidē ex colore, Vitellinū verò ex crassitudine: alios quoq;
Abraforios, quoniam ad rasuram parant: alios Stagnantes, quòd in ve-

R V F F I E P H E S I I

nis inhæreant, neque in carnem fubeant, quia tenues, intra venasq; absorpti quiescunt. in summa omne liquidum Praxagoras Chymon appellat. At Mnesitheus quod liquidum est, Chylon, idest, Succū nominat: Sed gustatilem qualitatem, siue in arido, siue in liquido positam Chymon, idest, Saporem vocat. Calorem autem, atq; Spiritum Zeno idem esse censuit. Sed medici distinxerunt, Spiritum, quem spirando trahimus, Calorem autem spiritus elisionē appellātes. Alij vitę quoddam principium calorem esse dixerunt.

De Foetu, & ad eum pertinentibus. Cap. XXXVII.

Foetus membranis inuoluitur: quarum tenuem ac molliorē Amnion vocat Empedocles, Agninā latinè dicito. Inde & Hilithya, quę partui pręest, Amnias mihi agnominari visa est: non à Cretę, vt alij existimant, quodam portu. Nos hanc tunicam diffecantes, humoris cuiusdam longē illo, qui in secundis continetur, mundioris plenam inuenimus: accurateque æstimantibus veluti quidam foetus sudor videbatur. per vrinaculum verò humorem quendam in secundas instar vrinę transfundi cognouimus. Sed Amnius interior foetui, Secundę exteri-
us vuluę brevis atque venosa tunica adhærebant. è secundis Umbilicus oritur ex duabus venis totidemque arterijs compositus, & ex quinto appellato Vrinaculo, breui vasculo, vtrinque cauo, è vesicę fundo in secundas intrante.

Plurima in homine reperta huiusmodi appellationibus insignire oportet. quòd siquid in his omisum fuerit, non ideo tamen plurima ob pauca quędam conuiuentibus oculis pręterita aspernari conueniet.

R V F F I E P H E S I I DE CORPORIS HVMANI PARTIVM APPELLATIONIBVS

Quę in altero libro primo continentur.

Quę sit libri necessitas.	cap. i.	H
Quę sint maximę corporis partes.	cap. ii.	
De Capite eiusque partibus vsque ad nasum.	cap. iii.	
De Naso & alijs faciēi partibus vsque ad Labia.	cap. iiii.	
De Oculorum partibus.	cap. v.	
De Malis, Maxillis, & Mento.	cap. vi.	
De Aurium partibus.	cap. vii.	
De Ore, & in eo contentis.	cap. viii.	
De Collo, & eius partibus.	cap. ix.	


De Epomide, Humero, Scapulis, Alis, & reliquis vsque ad Extremam manum.	cap. x.
De Pectoris ac Dorfi partibus.	cap. xi.
De Ventris, seu Alui partibus.	cap. xii.
De Virilis membri partibus.	cap. xiii.
De Foeminarum locis.	cap. xiiii.
De Dorfi ossibus, extremisque eius partibus.	cap. xv.
De Inguinibus, Crurisque totius vsque ad extremum pedem partibus.	cap. xvi.

R V F F I E P H E S I I
DE CORPORIS HVMANI
PARTIVM APPELLATIONIBVS

Alter Liber primus.

Iunio Paulo Crasso Patauino Interprete.

Quæ sit libri necessitas. Cap. I.

A  Iquis fidibus canendi artem doceri cupiat, ante omnia fides peritè tractare, singulasq; proprijs nominibus appellare discat, necesse est. Grammatistæ ante legendi, cæteræque doctrinæ scientiam, elementorum nomina pueros prædocent. nec non in Geometria, quid linea sit, quid superficies, quid planum, quid figura triangula, quid circulus, id genusque alia, quoque ritè nomine appellentur, prædiscere opus est. in alijs itidē artibus prænotiones vocabulorū similiter edocent. Medicam itaq; artē capescere optantibus elemēta prius tradere perquàm necessariū esse duxi: vt quæq; videlicet corporis pars rectè nominanda sit.

B quandoquidē diuinissimus Hippocrates in libro, qui inscribitur, De locis in homine, ita loquitur. Corporis autem natura sermonis in medicina principium est. Nos igitur etiā à simplicioribus exteriusq; aspectui subiectis exorſi eorum prænotationem appellationesque trademus.

Quæ sunt maximæ corporis partes. Cap. II.

Maximæ corporis partes Caput, Collum, Thorax, Manus, Cruraq; sunt. Thoracem non solum à iugulis ad præcordia vsque, sed totum à iugulis vsque ad genitalia vocamus.

De Capite, eiusq; partibus, vsq; ad Nasum. Cap. III.

Caput, quod capillis intectum est, simul etiam cum facie & alia sic appellantes comprehendimus. prior capillata pars Syncipur

dicatur: in quo & futura est, quoniam ipsi coronas circumponimus, E
 Corona vocata. posterior Occiput. partes ab utraque syncipitis parte
 Tempora. pars media qua maximè conuoluuntur capilli, Vertex. sub
 syncipite Frons sita est. in temporibus pilorum exortus Iuli græco vo-
 cabulo, latinè Lanugo: posteriores occipitis pili à græcis Chætæ, à no-
 stris Crines dici possunt. vltimam frontis rugam Episcenion græci di-
 cunt, quod Supertentorium nostris sonat. partes frontis pilis hirtæ Su-
 percilia sunt: horum media intercapedo Mesophryon apud græcos est,
 romanis Glabella. inde Nasus porrigitur.

De Naso & alijs faciei partibus vsq; ad Labia. Ca. IIII. F

Nasi extremum Globulus dicitur. quod nasum in duas cauernu-
 las distinguit, Interseptum. à globulo carnosum quoddam in
 labium descendens Columna est. nasi caua ab utroque intersepti late-
 re, per quæ olfactus præstatur, Nares vocantur. nasi Alæ, seu Pinnæ hu-
 iusmodi caua ambientes sunt. sub columna subsidens cauitas supra la-
 bium Philtron græcè, latinè Amatorium dicitur. totum verò, quod in
 fra nasum supra labia est, Hyporinion appellat. deinde Labia duo, quo-
 rum summa Prochila græci dicunt. tu Prolabia, si lubet, dicito. quæ cõ-
 mittuntur autem Prostomion est.

De Oculorum partibus. Cap. V. G

Sub superciliis Oculi sunt. quæ oculos contegunt, Palpebræ sunt.
 harum altera supra, altera infra est: quarum in conuiuendo con-
 gressus Tarfos vocant. pili ex palpebris enati Cilia sunt. Tarforum ex-
 trema Anguli magnus naso, exiguus tempori finitimus. Coræ pupillæ
 sunt: Glenæ oculorum media, per quæ videmus. Alij Pupillam id vo-
 cant, quò videmus, Coram autem & Glenam simulacrū in pupilla cõ-
 spicuum. post hæc autem quæ sunt nigra, cæsia, aut splendida, à colore
 nominantur Iris: circulus est prædicta albo continuans. Sub oculis lo-
 ca Hypopia græcè, latinè Subocularia sunt. H

De Malis, Maxillis, & Mento. Cap. VI.

His insurgentes eminentiæ subiacent Malæ vocatæ: quæ per pudo-
 rem erubescunt. sub his Maxillæ, seu Mandibulæ. quarum infe-
 rioris extremum in acutum definit, Mentumque est. à quo vsq; ad in-
 ferius labium os fit rotundum, atque prominens. sub mento carnosæ
 pars à græcis Anthereon, seu Leucania dicitur. veràm alij Anthereo-
 na hanc partem, Leucaniam verò cauitatem iuxta iugu-
 lum appellant.

A De Aurium partibus Cap. VII.

A Vriculæ eminentiæ sunt ab utroque tempore iuxta extrema collocatæ. quarum cauernulæ Meatus Auditorij vocantur: per quos audimus scilicet. harum inferiores carnosæque partes Fibre sunt, superiores cartilaginoseque Pinnæ. Helices, quæ deinde circumferentiam ambiunt: Anthelices verò in medio post helicem extumescences propè cavitatem particulæ. cavitās ipsa Concha dicitur: conchæ opposita propè temporis finem elatio Tragus, idest Hircus vocatur: huic opposita ex crassiore anthelice Antitragus.

B De Ore, & in eo contentis. Cap. VIII.

O S est prima labiorum diuifura, & reliqua omnis vsque ad fauces inanitas. in ore & alia quædam, & Dentes sunt: quorum priores octo Incisores dicuntur: Canini hos sequentes quatuor. reliqui omnes viginti Molares. sunt horum extremi atq; interius cõditi Sophronistres, id est, Moderatores ac Temperates nuncupantur: qui tum, cùm sapere incipimus, oriuntur. Genuinos latini vocant. dentes circumplexæ carunculæ Gingiue sunt: quarum cõmisura Habena dicitur. latæ molarium dentium summitates Mensæ nominantur: maxillarum cavitates, in quibus dētes defixi sunt, Mortariola atq; Præsepia. Lingue exortum Radicem vocato: Ceruicem, quod sequitur: eius summum Proglotton, quasi Prælinguium dixeris: eius latera Parasira, idest, assequentia. quod est infra linguam Hypoglossis est: Epiglossis, quod interius supra guttur est arteriæ asperæ tegumentum: quò inter deuorandum nihil in pulmones decidat: inter spirandum verò, ne spiritus ascensum impediat, extollitur. Quod supra linguam in orbem cauum est, Cælum, Palatum uē dicitur. quæ deinde superius pendet caruncula, Columella est: quam alij Gurgulionem, Vuam alij vocitarunt. ipsi subijciuntur Arteriæ Asperæ caput.

De Collo, & eius partibus. Cap. IX.

D Einde Collum & Dera græcè, cuius prior pars Bronchus, & Aspera Arteria: Circa medium prominentia Guttur: auersa pars Ceruix & Occipitium: propè iugula cauum Anticardium & Iugulatio nuncupatur.

De Epomide, Humero, Scapulis, Alis, & reliquis usque ad Extremam manum. Cap. X.

A Tendone autem ad humeros pertinentia Epomides nominantur. Humeri capita sunt eorum ossium, quæ à græcis Brachiona, à nostris etiam Humeri vocantur. Scoptula operta siue lata scapularū

ossa tergo imposita lata ossa sunt: quorum media eminentia Spina est. **E**
iugulorum latorumque scapularum ossium copulae Acromia dicun-
tur. continenter Claves adfunt, seu Iugula. Ala est sub humeris cauum,
in quod frequenter humerus luxatus delabatur. deinde Humerus est,
qui Brachion à grecis vocatur. articuli angulus, quo nitimur inclinati,
Ancon est, siue Olecranon: latinè Cubitus. Quod sequitur, Vlna, siue
Lacertus siue Brachium est: quod brachiali terminatur. postea Palma:
deinde manus Pectus, alij Hypothenatron vocant, sub pollice est. po-
stea est manus cauitas, quæ Vola nominatur. Ex digitis vnus ab alijs di-
stans Magnus, Pollexque dicitur. Index autem inter alios quatuor pri-
mus est, alter Medius, tertius Anularis, vltimus Minimus. horum ossa
Scuticulae, aut Phalanges, aut Internodia vocantur. quorū curuaturæ **F**
Condylis, sed primæ Procondyli, vltimæ Metacondyli, omnes à latinis
Nodi vocati sunt. vnguium initia Radices vnguium appellantur: digi-
torum extrema Acini, aut Cacumina. interstitium anularis ac pollicis
Thenar est. Hippocrates autem totum hunc locum Thenar appellasse
visus est: qui apud latinos Volæ nomen habet.

De pectoris ac dorsi partibus. Cap. XI.

A Iugulis autem in parte priori Pectus ac Sternon est. Tergum ve-
rò posterius à ceruice ponitur. Deinde quod appellant Meta-
phrenon, hoc est, pars è regione septi posita. sequuntur Lumbi pars dor- **G**
si infima. in pectore carnosæ eminentiæ Mamme sunt, quarum summa
Papillæ: totum, quod sub ala deorsum versus protenditur, Latus est. of-
sa Costæ & Spathæ. quarum primæ inter se committuntur ad termi-
num ossis, quod greci Sternon, Latini Os pectoris nuncupant: qua cor
situm est, Septum trāsuerfum aliqui Phrenes, aliqui Procardiam, qua-
si ante cor positum, aliqui Cor nominant. post ipsum est vetriculi Ho-
stium. inter costas spatia Intercoastalia vocant. Spuriæ costæ sunt, quæ
non inter se coeunt. Hæ in cartilagine degenerant.

De Ventris, seu Alui partibus. Cap. XII. **H**

M Vsculosæ partes sub cartilaginibus Hypochondria grecè, Sub-
cartilaginea latinè, à quibusdam Præcordia dicta sunt. Deinde
Aluus est: quem alij Ventrè nominat. quod in medio est, Epigastrium
greci vocant; super ventrè scilicet cutem. media cauitas Vmbilicus est,
ei circumdata cutis Vetula vocatur: quod ea corrugata senectâ adesse
significat. quod sub vmbilico ponitur, Abdomen ac Sumen est. quod
postea ad genitalia vsque pertinet, Epision, Pubes,
ac Pecten dicitur.

A De Virilis membri partibus. Cap. XIII.

G Enitalium maris quod pendulū est, Stema græcè, Coles latinè, Penisq; dicitur. quod nō pendet, Hypostema hoc est, Sedimentum, aut Perinæus. eius extremum Præputium est. Scrotum quo testes continentur, appellatur. eorum superior pars Caput est, inferior Fundum. partem laxiorem scroti Laccopedon dicunt.

De Fœminarum locis. Cap. XIII.

B **M** Vliebrium locorum pars superior Pecten est: Fissum verò prima diuisio. in medio sita musculosa caruncula Myrton, aut Nympha est. Myrtachila verò à lateribus collocatæ pinnæ.

De dorsi ossibus, extremisq; eius partibus. Cap. XV.

D Ossi ossa Vertebrę sunt. vniuersa vertebrarum compago Spina dicitur: cuius infima pars Lumbi: postremumq; dorsi Sacrum os est: quod aliqui Hypospondylon, idest, Subvertebrum, vt verbum verbo reddatur, appellarunt. Huius extremum Coccyx est, latinè Cuculus. à lumborum lateribus Nates sunt. post lumbos carnosæ partes Clunes appellatæ sitæ sunt: quę & Ephedrana, quòd sedendo commoda sint, à græcis nominantur.

De Inguinibus, crurisq; totius, vsq; ad extremum pedem partibus. Cap. XVI.

I Nguina sunt femorum principia. femorum partes interiores Femina sunt, quæ partes inter has perinæumq; sunt, Plichades à græcis dicuntur. Musculi ad genua tendentes Epigunides græco nomine vocantur: ossa superiacētia Epigunatides. hæc Hippocrates Molas vocat, latini Patellas. Genu est femoris cum crure connexio: sub quo Poples est. Sura est posterior magnus cruris musculus: vnde Latus Nerus ad calcem tendit: ossium verò posterius item Suram, prius Tibiam dicito: extrema pedibus propinqua Malleoli, à nonnullis Tali, sed non rectè, dicuntur. Tali tamen & ipsi adsunt, sed non oculis conspicui. Calx posterior est pedis rotunda pars: post quam Cauum pedis est. post hoc verò Planta, seu Vestigium. cui oppositum supremum Tarsus est. totum verò pedis situm Pezam græci vocant. Pedum digiti manuum digitis appellationibus respondent.

R V F F I E P H E S I I

DE CORPORIS HVMANI

APPELLATIONIBVS

Liber Secundus quę contineat.

Libri continuatio, atque propositum.	cap. i.
De Cerebro, eiusque tunicis, & enatis.	cap. ii.
De Oculi partibus.	cap. iii.
De eis, quę ore continentur.	cap. iiii.
De Pharynge, idest Aspera Arteria, et Gula, et Pulmone.	cap. v.
De Iecore, Bilis conceptaculo, & Venis Portis vocatis.	cap. vi.
De Liene.	cap. vii.
De Corde, ab eoque enatis, & adiacentibus.	cap. viii.
De Pectoris partibus, & Septo transuerso.	cap. ix.
De Gula, & Ventriculo.	cap. x.
De Intestinis, & Lactibus.	cap. xi.
De Renibus, Vrinarijsque meatibus.	cap. xii.
De Omento.	cap. xiii.
De Seminarijs conceptaculis, & Semine.	cap. xiiii.
De Scroto, Testibus, eorumque membranis.	cap. xv.
De Vtero.	cap. xvi.
De Venis, Arterijs, multisque alijs corporis particulis.	cap. xvii.

R V F F I E P H E S I I

DE PARTIVM CORPORIS

HVMANI APPELLATIONIBVS

Liber secundus

Iunio Paulo Crasso Patauino Interprete.

Libri continuatio, atque propositum. Cap. I.



Osteaquàm extimarum corporis humani partium ap-
pellationes exposuimus; deinceps continuata serie ad
latentium, internarumque notitiam transeamus: quip-
pe cùm à viris sapientibus homo exiguus quidam mun-
dus appelletur, coelestis ordinis emulus, in membrorū
fabrica, actionibusque præstandis varium effectuum artificium possi-
dens.

A dens. quemadmodum igitur reliqua medicinæ præcepta, ita & quæ ad dissectionis artē faciunt, referenda sunt. Quam ob rem artis principia, ac veluti fundamenta illustrioris doctrinæ causa iacentes, quem situm membris natura tribuerit, eorumque simul nomina explicabimus.

De Cerebro, eiusque tunicis, & enatis. Cap. II.

I Taque in capite intra caluariæ concavum suis cum velaminibus cerebrum includitur: proque corporis mole longè maius in homine quàm in cæteris animantibus reperitur. eius substantia pulcullæ similis est, viscida atque præcandida, Post id in occipitio vocatum Cerebellum collocatur. Tunicarum prima caluariæ ossibus affixa est: quæ pulsatorio etiam motu cietur: altera cerebro circumdata ipsum dissipabile conseruat, eiusque fragile corpus in vnum cogit ac retinet: vtraque nervosa membranosaque est, exiguo intersitorum vasculorum sensu prædita. interius condita motu caret, exterior mobilis atque crassior est. A cerebro medullæ processus exoritur per caluariæ foramen in occipitio erumpens: per vertebrarumque omnium caua ad extremam usque delabitur. neque propria tamen cerebri substantia est, sed emanatio, quæ Spinalis medulla vocatur. Meatum verò processus sunt à cerebro nervosi ad singula sensoria, vt ad aures naresque, & huiusmodi alia propagati. vnus autem à basi prorsum versus in duos diuisus progreditur, et ad vtrumque oculum pergit: qua parte vocata Peluis est, atque instar foueæ iuxta vtranque narem faciei cauitas: vbi tunicarum oculum componentium plexus efficitur.

De Oculi partibus.

Cap. III.

E Arum tunicarum prima nimirum ab ordine Prima, à colore verò Candida vocata est: quemadmodum & cicatrices eius candorem indicantes ostendunt. Tunica igitur prima Candida vocatur: & Cornicularis, siue Cornea: aut propter firmitatē, aut quoniam interius conditus humor per hanc, tanquam per corniculum pellucet, aut quod instar cornu in corpuscula Ctedonas vocata, id est, fibras aut filamenta resoluitur. Secunda verò primæ per appensionem usque ad vocatam coronam adnexa est. quæ media dehiscit, atque orbiculari cauo perforatur: cauatum autem corpusculum exterius, qua cornicularem attingit, leue tersumque est: in auersa parte asperum, (vt inquit Herophilus) quale vuæ acini corium esse solet, vasculis perplexa hæc tunica est: quæ Secunda ab ordine, Perforata à structura, à similitudine Rhagoides, latinè Acinalis, aut Vualis: Choroides etiam, quod instar secunda-

rum, quas Chorion græci vocant, vasculis sit multis irrigata, nominatur. Tertia ab eodem meatu progressa tunica humorem oui albo similem, Vitreumque appellatum includit. est hæc prætenuis, vocaturque ab humoris concretione Vitrea, à tenuitate Aranealis, à vasculorum contextu figuraque; Reticularis: quippe quæ ex angusto in latum diffunditur, sinuaturque; quò Quartam tunicam humorem crystallo similem continentem inuoluat, cuius dimidium prominet secundæ tunicæ foramini contiguum, dimidium cum araneali committitur. Hæc igitur tunica Discoides, id est, disco similis, aut Lenticularis à figura vocatur, aut à concreto humore Crystalloides. nempe quidam hanc neque; Tunicam appellandam esse censent: nam membranofam quandam congelationem esse dixerunt. E
F

De his, quæ ore continentur. Cap. IIII.

DEinceps ad ea, quæ in ore latent, descendamus. Lingua primum turbinata figura consideretur, à lato in angustum gracilescens, à faucibus radices ducens, carnosio & quodammodo neruoso corpore, in cibis atterendis deuorandisque mobilis: præterea & ad articulatæ vocis creationem emissum aerem secundum animi inclinationem conformans, gustatoriumque sensum participans. In huius basi Epiglossis vocata exoritur, ceu quædam exigua lingua supra eius latitudinem affurgens, in faucibus ex latiore basi in angustum finiens, cartilaginea materia constans, faucibusque cognata. hæc asperæ arteriæ operculum, & ciborum in gulam descensus iter quoddam est. Supra epiglottida autem supernè Columella dependet, ex palati partibus secundum eius foramina exoriens. hæc & Vula ab extremitatis rotunditate vocatur, nullam magni faciendam vtilitatem afferens. vnde fit, vt ea recisa nulla corporis actio vitietur. In penitioribus autem ab vtraque lingue parte affixæ Tonsillæ sunt, numero sex, corpore glândulosæ, figura subrotundæ, natura facilè mutabiles, atque dissipabiles, membranulis quibusdā altius insertis cōuolutæ. ex his quatuor ab vtroque latere cernuntur, duæ vero cerni vix queunt. Has græci vocant Parissthmia, quòd in angusto meatu sitæ sint. veteres enim græci locorū angustias isthmos appellabāt. Antiadæ verò, quasi cōtrarias dicas, iccirco etiā nominabant; quoniā ore aperto inter se cōtrariæ, præsertim quum inflammatae sunt, appareant. G
H

De Pharynge, id est, Aspera Arteria, & Gula, & Pulmone. Cap. V.

INde à palati ac lingue partibus duo itinera patefunt. horum prius Pharynx græcum vocabulum habet. inter hoc & colli vertebrae

- A** Gula est. Pharynx cartilagineus est, atque in orbem patens, superius latior, infra verò angustior. per iugula autem, appellatumque Antisternon, idest, spinam dorsi, quæ pectori opponitur, descendens in medios pulmones inferitur: ipsosque anulis, quæ Bronchia vocant, intexit. huiusmodi membrum Aspera Arteria, quòd istis anulis asperata sit, dici meruit: Bronchus etiam à quibusdam vocatur, ad aeris inspirando ducti transitum, vocemque edendam à natura constitutus. De ipso Pulmo suspenditur rarus ac peruius, pectoris inanitate conclusus: Idem globosus est, murisque caudæ figura speciem repræsentans. in fibras quinque diducitur, colore cinereo atque subalbido. assidua motione concutitur, folliis morem in spiritus transitu retinens. quippe spiritus per asperam arteriam in bronchia tractus per pulmonis spiramenta intra pectoris cauum elabitur: atque iterum foras ab hoc per naturalia foramina propellitur.

De Iecore, Bilis conceptaculo, & uenis Portis uocatis. Cap. VI.

- A** B vtrisque præcordijs Lienis Iecurque iacent. sub pulmone à dextris Iecur est, transuerso discrimini magis appensum, posteriori parte in gibbum assurgens. in quatuor, aut quinque fibras dirimitur, colore lentis, ad rubicundius tamen vergit, venoso corpore iuxta, atque sanguineo. Venas autem, quæ caue per interseptum ad cor tendenti committuntur, Ora Portasque vetusti scriptores nuncuparunt. Sub conuexa parte pusillum quoddam Vasculum vesicæ simile defixum est, nervosum, fellisque inibi geniti capax: à quò sanè meatus quidam nerveus per lactes ad intestina contendit: per quem paulatim bilis in intestina delabitur, excrementaque felleo colore suffundit, atque ipsa depellendi cupidinem infert. Hoc intercluso itinere aurigo futura portenditur bile per omne corpus effusa. quocirca albidæ cretacæque deiectiones exeunt. Est autem præferuidum igneumque iecur plurimum ad se alimenti attrahens, ac finitimis partibus communicans. ideoque sinistris dextræ partes viribus præstant.

De Liene Cap. VII.

A T Lienis iecori contrarius in sinistris præcordijs iacens opponitur, ad humani vestigij longitudinem protentus, superius rotundus & robustus, infra contractus & gracilis, medius angustior, vini fecis colore perfusus, laxus ac foraminulentus, conceptaculis multis implicatus: ignauum membrum, nulloque fungens ministerio.

De Corde, ab eoq; natis, & adiacentibus. Cap. VIII. E

Plmonis fibris Cor circumtegitur, intra pectus sedem habens secundum medium, magis tamen ad sinistram declinans, & sub sinistra mamma collocatur, pinei nuclei effigiem adeptus, & à lata base in mucronem instar turbinis acuminatum, musculosum natura atque neruosum, pulsatorio semper motu percitum, medium inane, duobus manifestis sinibus concavum, altero in dextris, qui Sanguineus, quòd multitudine sanguinis affluat, appellatur: altero in sinistris Spirituoso, quoniam spirituum copia redundat, nuncupato. inde fit etiam, vt spirituum agitatione moueatur. Membranis præterea vtrinque latioribus Auricularibus vocatis cor præcingitur: quoniam ad aurium imaginem cordis lateribus inhærent, & prominent. Ab ipso verò plura conceptacula nascuntur & venæ & arteriæ: è quibus omne corpus vasculis tantquam riuis emanantibus irrigatur. Membrana præterea quadam cor veluti sepimêto vallatur, eam Pericardion græci nominât, neruosam, tenuem, motuque à corde transfuso palpitantem. F

De Pectoris partibus, & Septo transuerso. Cap. IX.

Hæc omnia complectens Pectus ex cartilaginibus componitur atque ossibus: quæ in costis, pectorali ossè, atque dorfi spina reperiuntur. neruorum etiam carniūque particeps extra carnosius, interior neruosum est. qua etiam parte succingente membrana vestitur. Interseptum autem, siue transuersum septum obliquum pectori, quæ costæ finiuntur, subtenditur. id ita vocatum est, quòd viscera in pectore ab inferioribus intersepit. G

De Gula, & Ventriculo. Cap. X.

A Superioribus igitur corporis partibus, quemadmodum supra retulimus, simul cum aspera arteria enascitur, secusque ipsam Gula protenditur, ab eisdem vtique partibus incipiens, non similiter autem desinens. Hæc tubæ imagine figuram amplitudine refert, supra angustior, infra verò, qua cum ventriculo cōmittitur, capacior. hoc quippe nomine superior venter natura neruosus vocatus est. munere autem ficci humidique alimenti deuorandi gula fungitur: cuius examen ipsa acutissimo sensu prædita facit. Ventriculus itaque à gula exorians sub medio intersepto ad læuam magis reflexus collocatur ab angusto ore in latam capedinem sinuatus, cuius conuexum extra in abdomen vergit, simum verò dorsum respicit. longè, quàm gula, neruosior ven-

Atricleus est atque amplior. ipse nimirum intus accepta colliquans non magnopere se dilatat: sed cibi ingressui cedens eius descensum se constringendo insequitur: cū ad alimenta suscipienda à natura creatus sit.

De Intestinis, & Lactibus. Cap. XI.

AVentriculo intestina in plures orbes implicita ad cibaria, quæ ab eo delabuntur, excipienda formata prodeunt. horum vnum idemque ab ipso vocato processu ad rectum ac sedem vsque iter pertinet. inter quæ primum est, quod Hostiarius, aut Dodecadactylus dicitur: Hostiarius quidem, quod in ventriculo posita tantisper, dum sunt coacta, custodiat: cū remissa sunt autem, tunc & hostiarius cum intestinis aperitur: quemadmodum ani musculus Sphincter, idest, Adstrictor vocatus remittitur. Dodecadactylus autem à duodecim digitorum longitudine vocabulum accepit: nervosa ipsius crassaque substantia est: hoc appellatum Ieiunum tangit alijs intestinis carnosius, semper ferè alimenti penuria laborans: vnde Ieiuni quoque appellationem adeptum est: quod in ipso videlicet alimentum, vt in ventriculo & intestinis assolet, non inuenitur. postea Gracilia quæ vocantur, intestina proluxa in multas spiras conuoluta, tredecim cubitorum longitudinē æquantia collocantur, & sub vmbilico in abdominis regione ponuntur. Sub his omnibus Cœcum intestinum, & Colon eodem loco exoriantur: Cœcum quidem rectā in dextrum inguen spectans, altera ex parte obstructum: Colon verò, quod Maius intestinum latini vocāt, à dextris enascens, supernè sese circumuoluens, in iecur præcordiaque adductum incidit, deinde lienem sinistrumque ile petens posterius cum Recto intestino coniungitur. id nonnulli & Inferiorem ventriculum nominarunt: in quo etiam plurima cibi pars in stercus vertitur. omnium postremum Rectum est ceteris carnosius, rectamque sedem, vnde & nomen accepit, sortitum est. in Anulum autem & Sphinctera vocatum, idest, Adstrictorem definit, eum quidem nervosum & durum, hunc autem carneum atque rugosum, infimum omniū collocatum. Inter intestina medij Lactes sunt, quos græci Mesenterij atque Mesaræi vocabulo insigniunt.

De Renibus, Vrinarijsque meatibus. Cap. XII.

Renes circa vltimas dorsi vertebrae siti sunt, numero duo, figura rotundi, colore lenticulae, & quasi subcinereo. dexter paulò altior grandiorque inuenitur. denso squallidoque corpore constant: fauciat inevitabilem mortem afferunt. In penitis cauisque eorum parti-

bus membranulæ sunt instar cribri foraminibus plurimis pertusæ. unde meatus duo exeuntes vesicæ summitatem intrant: per quos vrina in vesicam transfunditur, indeq; foras expellitur. hos paulo ante Meatus nominauimus. E

De Omento. Cap. XIII.

O Mentum intestina contegit præpingue, duplicique membrana contextum. ipsum idcirco natura condidit, vt intestinis superfluitans ea aduersus ambientis peritonæi duritiam remolliret. recisum aut vulneratum vitæ discrimine vacat.

De Seminarijs conceptaculis, & Semine. Cap. XIII. F

A T Seminaria itinera secundum renes quatuor descendunt: bina rectà tendentia, quos & Assessores et Glandulosos nonnulli vocant: bina Varicosa, quod varicis more circumflectuntur. intra hæc fecundum semen gignitur, grandinosum crassumque: quare et ipsa nonnulli Genitales venas appellare voluerunt. in alteris autem est infœcundum dilutumque semen, quod simul cum priore eius nutriendi causa excernitur. verum ab vtraque parte coniugata simul vtraque à dorso descendunt. sed sterilia vascula cum vesicæ ceruice coalescunt: varicosa verò per inguina testiculorum tunicas subeunt. Quapropter eunuchi semen quidem, sed infœcundum è glandulosis fistulis eiiciunt: è varicosis verò excisis testibus feminis profusio seruari non potuit. G

De Scroto, & Testibus, eorūq; Membranis. Ca. XV.

S Crotum & tota ea laxitas est, in qua testes continentur, & magis propriè exterior carnosæ pars, ex membranis constat exteriore quidem Darto vocata, quæ rugosa est, interiore autem Erythroide. Nempe scrotum & dartos communia amborum testium inuolucra eos superioribus partibus suspendunt: sed Erythroides sibi ipsi adnectit, atq; in orbem testes amplectitur, priuatim seorsumq; singulos inuoluens. Ipsi Testes autem ex puliculæ simili materia constant, humidique admodum neruosa firmaque membrana includuntur. H

De Vtero. Cap. XVI.

M Vliebre autem genitale membrum, quod Vulua atque Vterus vocatur, inter cōceptacula eximiū est: inter vesicam rectumq; intestinum poni tur huic incumbens, illi subditum, medicinalis cucurbitulæ figuram æmulans. hoc loco venerei congressus exercentur.

A De Venis, Arterijs, multisq; alijs corporis parti-
culis. Cap. XVII.

VEnæ receptacula sanguinem continentia sunt, per quas sanguis in omnes corporis partes diffunditur. Arteriæ spiritus & quodammodo etiam sanguinis receptacula sunt: in quibus motio fit, quæ Pulsus communi vocabulo dicitur, & à corde exclusus spiritus per ipsas in omnem corporis molem dispellitur. Pinguitudo est alba oleosaque concretio, quam Adipem etiam nominant. Glandulosæ carnes, quas græci Adenas vocant, concretiones quædam subpingues atque carnosæ sunt, peculiariter cauis locis insitæ: alis, dico, & inguinibus, necnon & lactibus. Ossâ coagmenta quædam sunt solida, sanguine & sensu carentia, per quæ actiuæ atque electoriæ motiones perficiuntur. Musculus corpus est firmum ac densum, non simplex, sed ex nervis, venis, arterijsque compositum, sentiendi particeps, officium voluntariæ motionis obiens. Cartilagines autem concretiones sunt mediæ inter ossâ nervosque naturæ: ossibus enim molliores, nervis duriores sunt, præcipue ossium extremitatibus coalescentes. Nervus corpus est simplex atque densum, voluntarij motus instrumentum, obtusi, dum inciditur, sensus. Secundum Erasistratum quidem & Herophilum sensorij nerui sunt: Asclepiades autem ipsos sensu vacare testatus est, cæterum secundum Erasistratum cum gemina nervorum natura sit, sensoriorum videlicet, atque mouentium; sensorij, qui caui sunt, in cerebri membranis originem habent; mouentes in cerebro ac cerebello. Dixit autem Herophilus aliquos esse voluntati obedientes nervos, qui & à cerebro spinalique medulla oriuntur: aliquos, qui ab osse orientes in os inferuntur: aliquos à musculo in musculum transeuntes, qui articulos etiam copulant. Medulla substantia est vnguinea & exanguis, quæ semper in ossium cauis includitur.

Quæ tertius Ruffi Ephesii liber contineat.

D

- | | |
|--|------------|
| De ossibus Capitis, & futuris, & cauis. | cap. i. |
| De Colli vertebri, Humeris, Scopulis opertis, & eorum processibus. | cap. ii. |
| De Iugulo, ossibus Humeri, Brachij, & Manus. | cap. iii. |
| De Dorso Lumborumque vertebri, & costis. | cap. iiii. |
| De Coxa, Femore, & reliquis usque ad extremum pedem ossibus. | cap. v. |

R V F F I E P H E S I I
DE MEMBRORVM HVMANORVM
APPELLATIONIBVS

Liber tertius.

IVNIO PAVLO CRASSO PATAVINO

INTERPRETE.

De ossibus Capitis, & futuris, & cauis. Cap. I.



Ostea quàm interiorum locorum naturam nominaq; pro viribus superius exposuimus; modò de ossibus sermonem subiiciemus. Caluaria igitur, qua parte vocata Scaphula est, globosa cernitur, in vertice extuberans, in syncipite subcrassa aliquantulum, & lata, atq; per ossis iniectum duplicata, circa tempora compressa, plerunq; futuris quinque diuisa: Vna in vertice in posteriorem partem tendente, quæ à literæ lambda similitudine Lambdalis nomen habet: Altera autem in syncipite orbiculari, coronæ vnde & dicta est, formam imitante: quæ ibidem terminata finitur: Tertia à lambdali recta verticem partita coronariæ vocatæ cõiungitur. Duæ præterea sunt secundum aures in temporum sedibus Squammosæ dictæ, non in profundo, vt reliquæ, structuras habentes. Priori ex parte cauernæ oculorû sedes sunt: Pyelidas græci nominant, nos Arculas, seu Peluiculas dixerimus. Inter has Nasi os infurgit, intra quod Ithmoides à cribri similitudine cognominatum os multis foraminibus cauum reconditur. Facies præterea ossium coagmentationes tales habet, infra supercilia vnam, duas ab nasi ossis obliquis lateribus, quartam inferiorem maxillam separantem, quintam in palato iugalibusque ossibus, duas alias, quæ vix cerni queant in malis. At Caluaria ab inferioribus partibus concaua foramina profunda rotundaque habet, per quæ spinalis medulla descendit.

De Colli uertebreis, Humeris, Scoptulis opertis, et eorum processibus. Cap. II.

Colli septem vertebræ sunt inter se congruenter insertæ. harum prima capiti motum exhibet, reliquæ immobiles sunt. postea Humerus est, deinde Scoptula operta figura triagula pectoris costis posterius ad tabellæ imaginem incumbunt. & qua parte latiora sunt, ibi etiã tenuissima: qua vero angustiora, ibi & crassiora et robustiora in sinum

A quendam subsidentia: in quē humeri caput conijcitur. Ab eo sinu processus exigitur, ceu spina quædam ab anchoræ hamiq̃ue similitudine Ancyroides & Ancistroides græcè nuncupatus. cum quo iuguli extremum per cartilagine[m] coalescens committitur.

De Iugulo, Ossibusq̃ humeri, brachij, & manus. Ca. III

A T Iugulum in tribuli formam effigiatum instrumēto illi, quod Cathetera masculinum græci vocant, persimile est, cum osse autem pectoris, cumq̃ lato scapularum osse connectitur. ipsa verò iugulorum media pars sigma græcæ literæ similis cum prima dorsi vertebra coniungitur. Humerus prælongus ac teres est, superiorique parte, quæ humeri Caput dicitur, tumidior. id dimidiū in verticillato scapularū osse reconditur. At inferius, quia cubito deligatur, inæqualis est, duosq̃ utrinque processus pugillis similes habet, medium cauum: à prioribus quidem partibus minus, à posterioribus autem magis contractus est. Brachium ex ossibus duobus constat Cubito ac Radio. Radius, quam Cercida græci appellant, superior breuiorq̃ue: & primo tenuior rotundo & leniter cauo capite exiguum humeri exteriusq̃ue tuberculum recipit. Cubitus inferior longiorq̃ue, & primo plenior est, atque in manus articulo brachialis extremum admittit. Radius utiq̃, quia brachiali **C** adnectitur, duobus sinibus cauus est, altero recto, quo firmatur articulus, altero à latere, in quo rotundum cubiti caput inseritur. Porro Brachiale ad figuram turbinis ex octo ossiculis coagmentatur. Post hæc Phalanges sunt, prælonga ossa digiti formam habentia. Deinde ossa digitorū Scytalides à græcis, idest Scuticulæ, à latinis Internodia nominata, in singulis digitis terna inter se inæqualia præter pollicem: quippe qui à basi duobus tantum ossibus nititur.

De reliquis Vertebris, & Costis.

Cap. IIII.

D **P** Ost septem colli vertebrae sunt dorsi duodecim, lumborum quinque vertebrae: ut omnes quatuor & viginti sint. Ita verò instructæ paratæque sunt, ut introrsum versus, qua viscera contingunt, leues ac circumductiles, exterius asperæ spinosæque sint, carne ingenita obrutæ, à lateribus in mensæ formam explanatæ, omnes in medio concavæ, vnicum in suo corpore cochleæ instar foramen habentes, per quod (ut supra diximus,) spinalis medulla demittitur. in transuersis præterea processibus parum desidentes sinus habent, qui costarum extrema recipiunt. Nempe costarum aliæ superius inflexæ instar fornicis, inter se deinde in interiora leniter flexæ committuntur: aliæ obliquæ occursan-

tes, postea cartilagineæ factæ Spinæ, Spuriæq; costæ nominantur et maiorem, quàm in superioribus, circuitum ex concursu minorem faciunt. Reliquis omnibus vertebrae vltima præstat, quod & Sacrum os secundum antiquorum consuetudinem appellamus: qui omnia magna Sacra nominabant.

De Coxa, Femore, & reliquis usque ad extremum pedem ossibus. Cap. V.

AB utroque autem huius vertebræ latere Coxarum ossa posterius extenduntur, suisq; extremis ossi pubis, cui Pectini nomen est, cartilagine coalescentia deligantur. Hæc figura lata sunt ac subrotunda, interdum etiam angusta ac crassiore. Id genus ossa sinus verticillatos, non exactè penetrantes, sed profundos hebent: quos græci Cotylas, latini Acetabula vocant. in eos femorum capita coniunguntur. At Femora prælonga valentiaque ossa sunt, à coxis ad genua usque pertinentia, tereti figura, atque in exteriori parte gibba. ab inferioribus autem, qua genua attingunt, tuberosis globis intumescunt adeo, ut utrinque in rotunda capita confurgant: media verò sinuata sunt, quò facilius excipi à tibijs possint. quæ triangulæ, & in summo capite latecentes leniter in sinus desident, in quos extuberantes femoris eminentias recipiunt: ipsius verò tibiæ prominentia in sinum femoris inseritur. At ab exteriori parte os alterum, quod Sura rectè nominatur, appositum est, tibia gracilius, non proximum femori, infra breuius, qua etiam parte tumidius est. eamque nonnulli vulgares Talum vocari asseuerant. utrunque os autem Sura, videlicet, ac tibia in fine multa cartilagine vnita continentur. Sed tibiæ femorisque commissuræ os incumbit, quod græci Epigomati da, latini Patellam, seu Molam vocant. Hoc disci figuram representat, & superfluitans medium situm est. verum in curuando crure ad tibiam magis accedit: cum autem extenditur, super utrunque os cadit. In partibus malleolo proximis Tibia paulum gracilescit, atque in extremo ad sigma græcæ literæ speciem ita equaliter distat; ut processus duos alterum oblongum, alterum breuiorem habeat. at maioris processus caput interius est, alterius enata carne occulitur. cum suræ autem extremo coniungitur, quod vltèrius procedens exteriori, ut modo dixi, tumorem ostendit. Quapropter huiusmodi ossa ad sigma literæ formam media dehiscunt: in quo hiato Talus delitescit. Hic secundum partem Quatrionem Allachium vocatam sursum vergit, & ea quidem imis tibiæ suræque processibus adiacet. verum os ἐπὶ τρεῖων vocatum super imposito illis suræ ossi, quod à figura Cubicum nominatur, ad cauita-

Ates incumbit: vt ofsis ἐπιτριῶν quod vocant, inæqualitates occludantur, cartilagineque circumnata deligentur. Anterior autem ipsius rotunda particula in cauitatem cuiusdam ofsis quod ex illis est, quæ Tarsus vocatum constituunt, & à cauitate Nauiculare dictum fuit, insertur. Ex octo autem ossiculis inæqualibus angulis Tarsus instruitur. Ipsa Planta subijcitur è quinque ossibus composita in medio tenuibus, in summo crassescens, sursum versus exurgentibus: vnde & à terra caua cernuntur. Post hæc deinde sunt ossa digitorum, quæ Scytalidas græci, Latini vocat Internodia, ad eorum, quæ in manu sunt, similitudinem comparata. Ossium figura, situs, & nomina pro viribus à nobis explicata sunt.



INDICES DVO LOCUPLETIS.

prior eorum quæ in A R E T A E I, posterior
eorum quæ in R V F F I libris scitu ac me-
moria digna continentur.



Abscessus in colo. 21.
 F. 35. D.
 Abscessus quibus rum-
 pendus. 70. G.
 Abscessus iecoris. uide
 Iecur.
 Abscessus lienis. uide Lienis.
 Abscessus renum. uide Renes.
 Absinthij succi quantum dandum & eius
 uires. 69. B.
 Absinthite uinū elephantidis bonū. 72. F.
 Acetabulum. 38. A.
 Adarce, Limnestis. 46. G. 57. H.
 Adenes. 30. E.
 Adeps Leonis. 72. D.
 Adeps Pantheræ. 72. D.
 Adeps Vrsi. 72. D.
 Aegritudines diuturnas quæ incommoda
 sequantur. 15. D.
 Aegritudo longa tabidos facit. 25. D.
 Aeger cum medico aduersus morbum con-
 spirare debet. 15. E.
 Aegrotantibus gratificandum. 54. G.
 Aegri omnes curari non possunt. 69. E.
 Aegyptus quos cibos & potus ferat. 4. G.
 Aegyptia & syriaca ulcera. 4. G.
 Aestatis damna. 33. E.
 Alimenti iter ad iecur & in omne corpus
 differens est. 59. H.
 Aloes uires. 69. B.
 Alui irritationis utilitates. 43. C.
 Alui sublutiones quātum prosint. 44. D.
 Ama. 66. B.
 Amyli facultates. 55. D.
 Anæsthesia. 19. B.
 Anagoge, Sanguinis reiectio. 7. B.
 Angina, Synanche. 3. C.
 Angina canina, Cynanche. 3. C.

Anginae species duæ. 3. B. 49. B.
 Anginae species in solo spiritu. 3. C.
 Anginae species peior. 49. B.
 Anginae signa. 3. F.
 Anginae caninae signa. 3. E.
 Anginae cum phlegmone symptoma. 3. B.
 Anginae causa. 3. H.
 Anginae mutatio. 3. G.
 Anginae caninae mutatio salubris aut per-
 nitiosa. 3. F.
 Anginae obnoxij canes, & sæpe linguam
 exerunt. 3. C.
 Anginae medendi regula. 3. G.
 Anginae ab ebrietate curatio. 49. B.
 Anginae clysteres qui & quando. 49. B.
 Anginae sectio uenæ q̄lis conueniat. 49. C.
 Anginae sectio uenarū ligaturæ pdest. 49. D.
 Anginae defectus animæ nocet. 49. C.
 Anginae quæ ligaturæ conueniant. 49. C.
 Anginam quæ purgatoria leuent. 49. D.
 Anginae q̄les cōueniūt irrigatiōes. 49. D.
 Anginae cataplasmata qualia. 49. E.
 Angina quibus ad pus ducenda. 49. E.
 Anginae collutiones. 49. F.
 Anginae illitiones. 49. F.
 Anginae crustosis ulceribus gargarismi
 utiles. 49. F.
 Anginae cū coincidentia curatio. 49. G.
 Anginam cum cōcidentia quid præcipue
 tollat. 49. G.
 in Angina curāda error medicorū. 49. H.
 Anhelitus, Asthma. 22. H.
 Anhelitus causa. 23. A.
 Anhelitus indicia. 23. B.
 Anhelitus mitescentis nota. 23. D.
 Anhelitū mulieres facile patiuntur. 23. A.
 Anhelitum pueri cur facile euadūt. 23. A.
 Anhelitu uix capti uiri citi percūt. 23. A.

A R E T A E I

Anhelantibus quō differt interitus.	23.B	Ardori uenæ magnæ et arteriæ quomodo	
Antitrochus.	64.B	uenæ sectio conueniat.	60.E
Animalia ob quæ uiuant præcipue.	6.C	Ardore uenæ & arteriæ laboranti quo-	
Animi perturbationes immodicæ quam		modo cucurbitula admouenda.	60.F
sint noxæ.	20.A	Ardori uenæ caue & arteriæ clysteres	
Antidoti ex multis constantes quas facul-		quales conueniunt.	60.F
tates habent.	67.G	Ardori uenæ caue & arteriæ uexato ex-	
Anus & uestica inter se coherent, mu-		trema quibus illinenda et quare.	60.G
tuq; afficiuntur.	31.H	Ardori uenæ caue & arteriæ urinaria re-	
Aphthæ.	4.D	media quæ & qñ conueniant.	60.G
Apij semen capiti conueniens.	65.D	Ardori uenæ caue & arteriæ lac compe-	
Apoplexia quid.	19.B	tit.	60.G
Apoplecton.	19.B	Ardoris uenæ caue & arteriæ cibaria.	
Apoplexiæ magna uis.	19.B	folio.	60.H
Apoplexiæ morbus planè ualidus.	45.A	Ardori uenæ caue & arteriæ sudoris euo-	
Apoplexiæ senibus letalis.	46.A	catio confert.	60.H
Apoplexiæ plerunq; cā saturitas.	46.C	Ardor uenæ caue & arteriæ ut febris ar-	
Apoplectico quæ uena soluenda.	46.B	dens curatur.	60.H
Apoplectico à quo latere sanguis mitten-		Ardor uenæ caue & arteriæ per crisi-	
dus	46.C	non soluuntur.	60.H
Apoplectico qñ non scindēda uena.	46.C	Arenulæ calculorum indicia & materiæ.	
Apoplectici clysteres quales.	46.D	folio.	30.H
Apoplecticus quando & quibus purgan-		Arquatus.	25.E
dus.	46.E	Arquatus à quibus mēbris gignitur.	25.E
Apoplectico utiles uomitus.	46.E	Arquatus quomodo à iecore fit.	25.E
Apoplectici inunctiones quales.	46.F	Arquati à iecore facti signa.	25.F
Apoplecticis conueniens inunctio.	46.F	Arquati ab liene signa.	25.F
Apoplecticks conuentientia cataplasmata.		Arquatus à colo & uentriculo.	25.G
folio.	46.G	Arquatus à quolibet uiscere oriri potest.	
Apoplecticis cucurbitulæ ubi & quando		folio.	25.H
affigendæ.	47.A	Arquati ab habitu totius corpis cā.	25.H
Apoplexiæ remedia conueniunt Epilep-		Arquati species duæ.	26.B
sia.	47.E	Arquati specierū diuersarū, causæ.	26.C
Apostematia.	21.E	Arquati nigri signa.	26.D
Aqua frigida epota qñ uomendum.	12.F	Arquati albidioris notæ.	26.E
Aqua ex colo.	35.D	Arquatus qñ salubris, qñ letalis.	26.F
Aquæ fluxus inspectus uertiginem affert.		Arquatus in acutis morbis malū est.	25.E
folio.	68.A	Arquatus quas ætates infestet.	26.G
Aquæ sponte natæ melancholicis utiles.		ab Arteria sanguis quō differt à sangui-	
folio.	69.G	ne à uena.	8.A
Aqua intercus, Hydrops.	28.A. uide Hy-	Arteriæ asperæ sanguinem emittentis	
drops.		notæ.	8.E
Arancorum telæ.	60.B	Arteriæ secundum dorsum porrectæ in-	
Ardoris uenæ caue & arteriæ crassæ st-		flammatiō.	12.C
gna.	60.E	Arteriæ exasperatæ remedia.	55.H

I N D E X

Arteriæ magnæ principium cor. 60.E
Arteriæ magnæ Ardor. uide Ardor.
in Articulo ulcus difficile est. 32.C
Arthritis. 37.E
Articulorum doloris duplex ortus. 37.E
Articularis morbi uarietas. 37.H
Articularis morbi initium. 38.A
Articularis morbus cur fit insanabilis.
folio. 38.B
Articularis morbus omnem ossium com-
pagem occupat. 38.C
Articularis morbi causæ. 38.D
in Articulis tofi. 38.D
Articulari morbo quid in principio quid
in fine conducatur. 38.E
Articularibus omnibus morbis lauatio in
frigida marina prodest. 71.D
Articulis dolentibus quæ imponenda. 71.D
Asinini lactis uires. 70.H
Asthma, Anhelitus. 22.H. 38. G. uide
Anhelitus.
Atræ bilis effectus uarij. 16.H
Atram bilem educit thymi coma. 68.H
Auditui Austri graues. 66.G
Aurium temporumq; palpatio quantum
ualeat. 42.G
Austri auditui graues. 66.G
Autumno Phthoræ abundant. 8.G

B

B *Alnea sponte calida sulphurea ele-*
phantem iuuant. 72.G
Bellaria omnia capiti inimica. 65.E
Bellaria omnia capiti nocent præter pul-
mulas, ficos, & uuas. 67.A
Besasa. 49.F
Bilis in iecore creatur. 25.E. 68.F
Bilis uariæ species. 26.B
Bistimus. 61.D
Bonus habitus corporis quæ præstat. 26.H
Brabila. 54.G
Brassica elephantice utilis. 72.B
Brassica semicocta elephaticis bona. 72.F
Bronchia. 22.G
Bubones iecoris soboles. 9.B
Bubula caro qualis. 65.D

C

C *Achexia. i. Malus habitus.* 27.A
uide Malus Habitus.
Cacochymia. 27.A. 68.F
Caligo sensuū est somni principium. 42.G
Calculi ubi nascuntur. 30.G
Calculorum indicia & materiæ arenulæ.
folio. 30.H
Calculi notæ. 31.H
Calculi renum notæ. 30.H
Calculi in uestica notæ. 31.A
Calculi exitus difficilis per colem. 31.A
Calculi in uesticam transitus magno dolo-
re fit. 61.D
Calculi uarie figurati. 31.B
Calculi oblongi & inequalis crassitudi-
nis. 30.G
Calculi qui in senibus et qui i pueris. 31.B
Calculi causæ in senibus. 31.D
Calculi causæ in pueris. 31.C
Calculis ulcera non sanesunt. 31.F
Calculi uesticæ difficultas. 31.F
Calculi parui citra noxā excindunt. 31.G
Calculo renum uenæ sectio quā pfit. 61.B
Calculo renū quales clysteres pñunt. 61.C
Calculo renum urinam citantia & cibaria
quæ prosint. 61.C
Calculo renum lauatio & infusiones uti-
les. 61.C
Calculos extirpantia potabilia medicami-
na. 61.D
Calculo renū agitatio corporis pdest. 61.D
Calculus mictum impediens quomodo re-
mouendus. 61.H
Calculus uesticæ quomodo sectione extra-
hendus & uulneri medendum. 61.H
Calculosis renibus q̄ extra iponēda. 61.B
Calculosos renes cruditas lædit. 61.C
Calor cōcoquens in oī corpe insitus. 26.A
Calor igneus humores omnes in bilem uer-
tit. 26.A
Calor sanguinem elicit. 55.G
Cancer uteri. 37.B
Cancer ulceratus non ulcerato longe im-
probior. 37.B

A R E T A E I

Canes anginae obnoxij, & saepius linguam exerunt.	3.C	do affigenda.	64.B
Canis rabiosi potentia.	3.D	Caput dolenti ueratrum quando dandum.	65.G
Canina angina, uide Angina.		Caput dolenti quando & qui chysterēs profint.	64.F
Canina conuulsio, uide Conuulsio.		Caput dolenti quando & quomodo corpus exercendum.	65.A
Cantharides uesticam ledunt.	67.E	Caput dolenti ambulationes quando & quales profunt.	65.F
Caput sensus neruorumq; originis locus est.	42.A	Caput dolenti peregrinatio qualis conuenit & nauigatio.	65.F
Caput neruos & musculos ubiq; hēt.	38.C	Caput dolenti quam iuuēt mare.	65.F
Caput difficiles aegritudines patit.	63.F	Caput dolenti abrasio capillorum prodest.	64.H
Capitis parte una laesa cur oppositi nerui ledantur.	19.E	Caput dolentes os quō eluere debēt.	64.E
Capitis morborum initia leuia, fines mortiferi.	63.F	Caput dolenti ratio uictus quae.	65.B
Caput uexant lac & caseus.	65.D	Caput dolenti coena frugalis esto, & uinū conceditur debili stomacho.	64.E
Capiti inimica bellaria omnia.	65.E	Caput dolenti quando uinū dandū.	64.A
Capiti nocent bellaria omnia praeter palmas, ficus, & uuas.	67.A	post purgationem dandum.	64.B
Caput quae radices replent.	65.E	quale uinum dandum.	65.E
Capiti nocet cruditas.	65.F	Caput dolenti quae olera profint.	65.E
Capiti obsunt labores.	65.F	ē Capite manantis sanguinis signa.	7.C
Capiti & neruis uenus inimica.	65.F	ē Capite manātis sanguinis curatio.	7.E
Capiti quā noceat uocē acutā adere.	66.E	Cardialgia.	33.C
Capiti pdest uox mediocriter acuta.	66.E	Cardiogmos.	33.E
Capitis omnibus longis morbis missio sanguinis prodest.	64.A	Caprae ad podagricos remedium.	71.F
Caput purgat hiera.	64.A	Caro bubula & ouilla quales.	65.D
Capitis omnibus uitijis quando profit & quomodo pituita euacuatio.	64.C	Caro leporum concoctu facilis.	68.D
Capiti conueniens semen apij.	65.D	Carnium raritas & mollicies melancholicos ualde iuuat.	69.G
Capitis dolor saepe redire solet, & praesens delitescit.	64.G	Carotides uenae somniferae.	13.H
Capitis dolores parui non sunt spernendi.	63.F	Cartilagine frigidae sunt.	22.D
Caput dolenti sol officit.	65.F	Caseus & lac caput dolore uexant.	65.D
Caput dolenti sanguis ē qua uena & quantus mittendus.	64.A	Castorei uires.	45.B
Caput dolenti uena frontis opportunissime scinditur.	64.B	Castoreum quomodo profit catocho & ueterno	45.H
Caput dolenti quomodo sanguis ē naribus mittendus.	64.F	Castoreum medetur neruis.	45.C
Caput dolenti uasa inanire non expedit.	64.B	Castoreum calefacit neruos.	62.C
Caput dolentes quando purgandi.	64.A	Castoreum quam sit utile resolutis.	46.F
Caput dolenti cucurbitula ubi & quomodo affigenda.		Castoreum tetanicis salutare.	48.G
		Castoreo in tetano quomodo utēdū.	48.G
		Cataplasma ex millio.	43.B
		Catiadium.	64.F
		Catochus ueterno similis.	45.H

I N D E X

Causus febris syncopæ causa. 9.E
 Causi signa. 9.F
 Causi conuersio in contrarium. 9.G
 Causi in syncopam conuersi symptoma=
 ta. 9.G
 Causi mirum symptoma. 9.H
 Causus quo tempore anni & quibus æta=
 tibus uiget. 12.D
 Causo laborātes quoto die pierūt. 12.D
 Causus qui sine periculo sed longior. 12.D
 Causo subuenit frigida potus. 12.E
 Causum habenti quomodo sanguis detra=
 hendus & quantum. 56.E
 Causi alimenta qualia. 57.B
 Causum habenti quando uinum largius cō=
 cedendum. 57.C
 Causo uexatis uini potio quando obest &
 quando prodest. 56.F
 Causo qñ cucurbitula conuenit. 56.F
 Causo clysteres quid prosint. 56.G
 Causum habenti caput qualibus irrigan=
 dum. 56.G
 Causum quæ exteriora iuuent. 56.G
 Causo quibus succurrendum crisis tempo=
 re uirtute debili. 57.A
 in Causo cordi sup dāda epithemata. 57.E
 Causo laborans quæ loca inhabitare de=
 bet. 57.F
 Causum habēs quibus operiendum. 57.F
 Causum qñ in tabem uerti metus est. 58.B
 Causus ne in tabem desinat, quibus prohi=
 bendum. 58.B
 Cedmata. 12.A
 Celta. 72.C
 Cephalalgia. 15.F
 Cephalæa. 15.F
 Cephalæa uariæ species. 15.F
 Cephalæa cause. 15.C
 Cephalæa qui pisces apti. 65.E
 Cephalæam remedia iuuant ad ossa pene=
 trantia. 64.B
 Cephalæam arteriæ quæ & quomodo inci=
 se iuuant. 64.B
 Cephalæa uexatis qñ caput lauādū. 64.E
 Cephalæa uexatis quando caput urendum

aut incidendum. 65.A
 Cephalæa uexatis quomodo quidā caput
 incidebant. 65.A
 Cephalæa uexato caput quomodo urēdū,
 & crustis quæ imponenda. 64.H
 Cephalæa uexatum quæ capiti applican=
 da iuuent. 65.B
 Cephalæa thapsia prodest. 65.B
 Cephalæam gestatio qualis leuet. 65.F
 Cerebrum uulturis. 67.G
 Cerumina, Aurium sordes. 67.G
 Chamelæa. 67.F
 Charoneorum strangulatus. 3.D
 Chlasmus. 19.F
 Chiragra. 37.E
 Cholera deffinitio. 10.A
 Cholera symptomata. 10.B
 Cholera quo anni tempore uiget. 10.D
 Cholera cui ætati plus minusue infesta.
 folio. 10.D
 Cholades. 34.E
 Cholerici excretiones non reprimen=
 dæ. 58.C
 Cholerico quando & quibus uomitus ci=
 tandus. 58.C
 Cholerici torminibus & pedum frigori
 quæ & quandiu adhibenda. 58.C
 Cholerico quando frigida aqua propinan=
 da. 58.D
 Cholerico quando uinum concedendū qua=
 le & quantum. 58.E
 Cholerico extreme laboranti quomodo
 succurrendum. 58.F
 Cholerico uomitus qñ sistendus. 58.G
 Cholerico afflatus auræ interdum utilis.
 folio. 58.G
 Cholerici uentri & pectori quæ imponen=
 da & quando. 58.G
 Cholerici pedes & musculi quando & qui=
 bus inungendi. 58.H
 Cholerici mēbra inungēda diuersa. 58.H
 Chordapsus. 10.E
 Cibi animum demulcent. 41.F
 Cibus humidus omnibus febrientibus ido=
 neus. 42.B

A R E T A E I

Cibi gratiores, licet paulo deteriores, æ-		tula conueniat.	50.B
gris concedendi.	56.H.70.H	Columnæ & uuæ adstringentia quæ con-	
Cicadæ uesticæ laboranti utiles.	61.G	ueniant.	50.C
Circumuolutio uertiginem & epilepsiam		Columnæ ulcerosæ quæ conueniant.	50.C
accerfit.	68.B	Columbinus finus.	49.E
Citria mala podagræ conferunt.	71.E	Coma, Sopor.	6.G.33.B
Cncorum.	49.D.67.F	Comitialis morbus. uide Epilepsia.	
Coagulum parce exhibendum.	55.C	Concoctioni uentriculus destinatus.	33.F
Coccus cnidius.	67.F	Concoctionis uentriculi imperfectæ si-	
Coeliacus affectus.	33.F	gna.	33.G
Coeliacus morbus non solum coctionis sed		Consentiunt oïa principiorū uitij.	2.C
etiam digestionis uitium est.	33.H	Contentio labiorum.	20.C
Coeliaci crescentis signa.	33.H	Conuulsionis species tres.	2.C
Coeliacus quibus accidat.	34.A	Conuulsionis causæ.	2.D
Coeliacus quando uigeat.	34.A	Conuulsionis communes notæ.	2.E
Coeliaci causæ.	33.E.34.B	Conuulsio quo tempore anni plus minus-	
Coeliacus difficilis morbus est.	34.A	ue infestet.	2.D
Colon, Laxius intestinum.	10.H.34.C	Conuulsio mulieres sæpius uexat sed le-	
Coli intestini magnitudo.	11.A	uius.	2.D
in Colo intestino uoluulus cur minus pe-		Conuulsio quas ætates plus minusue læ-	
riculosus.	11.B	dat.	2.E
Colum uim concoquendi habet.	25.G	Conuulsionones mitiores quæ.	2.E
à Colo icterus.	25.G	Conuulsio letalis à uulnere.	2.D
Coli cruditas bilem efficit.	25.H	Conuulsio ex abortu letalis.	2.D
in Colo intestino uoluuli signa.	11.A	Conuulsio canina.	19.C
Colici doloris signa.	34.B	Conuulsionis caninæ notæ.	20.C
à Colico nascentes morbi.	34.D	Conuulsio canina quomodo spectantibus	
Colici morbi causæ.	34.D	imponit.	20.D
Coli abscessus.	35.D	Conuulsione canina affectæ partes quod-	
ex Colo intestino aqua.	35.D	modo distinguantur à sanis.	20.E
Colliquati, Syntectici.	24.G	Conuulsio linguæ.	20.C
Colliquatiões habitus corporis malæ.	22.E	Conuulsio columellæ.	20.D
Columna.	3.H.4.A.50.A	Copiosum & subitum naturā uitiat.	56.E
Collumellæ affectus.	3.H	Cor oïum principatum tenet.	33.B
Columellæ conuulsio.	20.D	Cor animæ domicilium.	9.D
Columellæ uitia uaria egent curatione.		Cor uitæ sperādiq; principium.	6.D.23.A
folio.	50.A	Cor arteriæ magnæ principium.	60.E
Columnæ & uuæ celerrime succurren-		Cor arteriæ calorem impertit.	60.E
dum.	50.A	Cor attrahit aerem.	6.D
Columnæ & uuæ uenæ sectio qualis con-		Corde affecto breuis est uita.	6.D.23.A
uenit.	50.A	Cor graui malo oppressum nunquam sa-	
Columnæ & uuæ conuenientes clysteres.		nescit.	43.C
folio.	50.B	Cordis & uitæ ægritudo est syncopa.	9.B
Colūnæ et uuæ cōueniētes ligaturæ.	50.B	Cordis laborantis proprietas.	9.D
Columnæ & uuæ quando & ubi cucurbi-		Cordis affecti notæ.	9.C

I N D E X

Cordi noxas impertit stomachus. 9.C
Cor à stomacho non leso leditur. 9.C
Cor stomacho contiguum quos morbos excitet. 33.C
Cordi supradada epithemata in causo. 57.E
Cor Fulicæ. 67.G
Corallium. 55.B
Costæ qñ suo loco pelluntur. 21.G
Cotyla. 38. A/B
Crassædon. 4.B
Crassædicausæ. 4.B
Crassantia sanguinem & spiritum. 54.H
Cremasteres. 11.B. 34.D
Crisis p lotium cur optima. 24.D
Cruditæ capiti nocet. 65.F
Crusta, Eschara. 4.D
Crustæ accidentia. 4.D
Cyceon. 34.G
Cynanche, Angina canina. 3.C
Cypselis, aurium sordes. 26.A

D

D *Ebiles & assumpto cibo ualde laborant.* 57.D
Deliquium animæ. 19.C
Deliquium animi strangulatū auget. 53.A
Densum cur indolens. 37.G
Densa qñ sentiunt & dolent. 37.G
inter Dextram & leuam partem corporis differentia. 19.D
Diabetes quid. 29.H
Diabetes unde dictus. 30.B
Diabetis causa. 29.H
Diabetis causæ. 30.C
Diabetis præsentis indicia. 29.H
Diabetis futuri notæ. 30.A
Diabetes perniciosus. 29.H
Diabete affecti non diu durant. 30.C
Diarrhœa. 33.F
Diarrhœa unde. 36.H
Dij soli auertunt magnas noxas. 28.A
Diploe caluæ mediotullium. 65.A
Dipsas. 30.D
Diurnas ægritudines quæ incommoda sequuntur. 15.D
Diurna ægritudo tabidos facit. 25.D

Docilitas & in morbis iuuat. 18.C
Dolichi. 65.C
Dolor est res aspera sensui. 37.G
Dolores unde proueniunt. 37.H
Dolor capitis. uide Caput, & Cephalæa.
Dysenteria. 34.E
Dysentericæ causæ. 34.F
Dysenteria quo tempore anni & qua ætate proueniat. 34.A

E

E *Bur elephanticis utile.* 72.B
Eclegma pleuriticis. 52.E
Eclegma ad melancholicos. 70.A
Elaterium. 49.D
Elephas quale animal. 38.H
Elephantis cornua. 39.A
Elephantis dentium magnitudo. 39.B
Elephantis proboscis. 39.B
Elephas quo cibo uescitur. 39.C
Elephas quomodo bibit. 39.D
Elephas morbus unde sic noiat. 40.D
Elephas morbus cur leoninus dñr. 40.C
Elephantis morbi causa. 39.F
Elephantis morbi signa. 39.G
Elephantis morbi initium latet. 39.F
Elephas morbus à quo mēbro icipit. 39.G
Elephanticis membra singula corrumpuntur. 40.D
Elephas intus & extra totum corpus occupat. 71.G
Elephas ut pestilentia cōtagiosus. 71.G
Elephas morbus oīum pñitiosissimus. 39.F
Elephas oriens tolli potest, iam factus minime. 71.H
Elephas morbus cur incurabilis fit. 39.G
Elephantiorū ulcera insanabilia. 40.D
Elephanticis quæ uenæ secandæ quomodo & quantum sanguinis mittendū. 71.H
Elephantis alimentū sanguis malus. 71.H
Elephātico sanguinis paulū bonū ē. 71.H
Elephanticis hiera non semel dāda. 72.A
Elephanticis lac quomodo dandum. 72.A
Elephanticis omnia remedia sæpius iteranda. 72.A
Elephanticis ueratrum quo anni tempore

A R E T A E I

quoties exhibendum.	72.B	Epilepsia interdum à capite, interdum ab inferioribus oritur.	1.D
Elephantice uaria adhibenda remedia.		Epileptici quando futuram acceſſionem præſentiunt.	1.E
folio.	72.B	Epilepſiæ inuaſionis notæ.	1.F
Elephantice braſſica utilis.	72.C	Epilepſiæ acceſſionis remittētis ſigna.	1.H
ſemicocta.	72.F	Epilepſiæ inuaſiōe ſedata quales ſint.	2.B
Elephantice ebur utile.	72.B	Epilepſiæ paroxyſmi & eius finis triſte ſpectaculum.	1.E
Elephantice uiperarum carnes quomodo parandæ.	72.B	Epilepſia laborantium in intermiſſione ſymptomata.	16.F
Elephantice theriaca omnium remediorum utiliſſima.	72.C	Epilepſiæ originis opinio quorūdā.	16.E
Elephantici corpus quibus in balneo detergendum.	72.C	Epilepſiæ cauſæ.	16.G
Elephantice ſapo gallicus bonus.	72.C	Epilepſiam mouet deliquiū animæ.	67.B
Elephantici in facie tumores quibus illinendi.	72.D	Epilepſiam Gagates lapis concitat.	1.D
Elephantice quādo ſcarificandi.	72.E	Epilepſiam circunſolutio accerſit.	68.B
Elephanticorū ulcera quibus leniēda.	72.E	Epilepſia non facile recedit.	16.D
Elephantice lotiones aſidue benefaciunt.	72.E	Epilepſia cur interdum acutus morbus dicitur.	47.E
Elephāticis quomodo exercendi.	72.F	Epilepſia quā longus morbus efficit.	47.E
Elephāticis uestes mundæ ſint.	72.F	Epilepſia interdum mutatione ætatis abigitur.	16.D. 67.C
Elephanticorū cibi quales.	72.E	Epilepſia confirmata curationem non ſuſcipit.	16.E
Elephantice uinū abſinthite bonū.	72.F	Epileptici plerique humidi & craſſi.	68.B
Elephāticis uina qualia danda.	72.G	Epilepſiæ conueniunt remedia apoplexiæ.	47.E
Elephāticis qui piſces conueniant.	72.G	Epilepticorū puerorum auxilia.	47.F
Elephāticis quæ carnes dandæ.	72.G	Epileptici conuiulſis membris quomodo ſuccurrendum.	47.F
Elephantice qui arborum fructus dandi.	72.G	Epilepticum puerū iuuat crepituū emiſſio.	47.G
Elephāticos balnea ſponte calida ſulphurea iuuant.	72.G	Epilepticis pueris utilia pharmaca in paroxyſmo.	47.G
Elephāticus uitam in aquis & mari ducat.	72.G	Epilepticis iuuenibus in paroxyſmo utilia.	47.H
Emplaſtra irrigatiōibus potētiora.	54.E	Epilepſia magna medicamenta & ualentiſſima requirit.	67.B
Emproſthotonus.	2.C	Epilepſiæ in capite ortæ curatio conuenit quæ & cephalææ.	67.B
Emproſthotoni ſigna.	2.G	Epileptico quæ uenæ ſecandæ.	67.B
Empyema.	7.F	Epileptico quæ arteriæ incidendæ.	67.B
Empyi.	20.F. 21.E	Epilepticus quibus & quomodo purgandus.	67.B
Entera.	36.B	Epilepticos hilaritas & bona ſpes miſeros	
Epiglottis.	47.B		
Epilepſia, Morbus comitialis.	16.D		
Epilepſia cur ſacer morbus dicitur.	16.E		
Epilepſia caput obſidet.	9.B		
Epilepſiam antecedentia ſigna.	1.C		
Epilepſiæ acceſſionis appropinquantis ſigna.	1.C		

I N D E X

ros reddit. 67. D
 Epileptico caput quomodo urendum & secandum. 67. D
 Epileptico caput qualiter fricandū. 67. E
 Epilepsia raro ab inferioribus orit̃. 67. E
 Epilepsie ab inferioribus partibus ortę curatio qualis. 67. E
 Epileptici ab inferioribus fortius purgādi. 67. E
 Epilepsie ab inferioribus ortę cucurbitula perutilis. 67. F
 Epilepsiam lotium ducentia iuuant. 67. F
 Epilepsie prodest fibri testiculus. 67. F
 Epilepsiam iuuantia antidota. 67. F/G
 Epilepticis omnia adhibenda, quę iuuare aliquid, nihil uero ledere possūt. 67. H
 Epilepticis prodest à somno flatuū ac pituitę excretio. 68. A
 Epileptici ambulationes & gestationes quales & ubi. 68. A
 Epileptici exercitia uelociora sint quàm uertiginosi. 68. C
 Epileptico quales adhibendę frictiones. folio. 68. B
 Epileptico quę non inspicienda. 68. A
 Epileptici ad iram lacessendi. 68. C
 Epilepticorum cibi quales. 68. C
 Epileptico plura in cibis acria ponenda. folio. 68. C
 Epilepticis liquamen ex aceto & cumino bonum. 68. C
 Epilepticis carnes quando & quę concedendę. 68. C
 Epileptico quale uinum dandum. 68. D
 Epileptico qualia olera danda. 68. D
 Epileptico noxię iracūdia et uen⁹. 68. E
 Epilepsia locis calidis & siccis iuuatur, cū frigida & humida sit. 68. F
 Epilepsie similitudinē adducit uen⁹. 68. E
 Episcenium. 39. E
 Erosioni uenarum congelatio sanguinis & caloris succurrit. 55. A
 Erosionibus uenarū quę applicanda. 55. C
 Error medicorum. 34. D
 Error quorundā medicorū. 47. B. 68. E

Error medicorū in curāda angina. 49. G
 Error medicorū i curāda pleuritide. 52. F
 Error quorundam de uenis cubiti. 54. C
 Esca, uide Cibus.
 Eschara, Crusta. 4. D. 35. D
 Eterocrania. 15. G
 Eterocrania quę mala iterdū ferat. 15. G
 Eterocranię debilioris symptomata. 15. H
 Eterocranię curatio eadem quę & cephalę. 65. F
 Eunuchi quales. 32. F
 Exanthemata. 4. E
 Experientia bonus magister. 45. F
 Extrema frigida quibus illinenda. 57. H

F

Faba leguminum pessima. 65. C
 Faba ulcera purgat, sed flatibus reundat. 70. E
 Facultates ubi sint. 9. C
 Faseoli. 65. C
 Faucium pestilentis morbi quomodo curandi. 50. D
 Fauibus ignis non est adhibendus. 50. B
 Fauibus ægris ignis similia medicamenta adhibenda. 50. E
 Faucium ulcera minime cōprimēda. 50. E
 Faucium ulceribus quomodo applicanda medicamina. 50. F
 Faucium ulceribus conuulsionem minantibus quę adhibenda. 50. F
 Febris ardentis signa. 56. C
 Febris ardens initium syncopę. 56. C
 Febris ardens quando missionem sanguinis requirit. 56. D
 Felis domestica. 67. G
 Ferarum ira quomodo sedatur. 42. G
 Fibri testiculus epilepsie prodest. 67. F
 Fimus columbinus. 49. E
 Fimus caninus. 49. F
 Flatum euocantia. 59. C
 Frigidū crassas materias citius cogit. 31. C
 Fulicę cor. 67. G
 Furor quid est. 17. G
 Furor quo differt à senili delirio. 17. H
 Furoris causę. 17. H

**

A R E T A E I

Furoris cessatio quādo non tuta est. 17. H
 Furor quos facile infestet. 18. A
 Furorem quæ uictus ratio concitet. 18. B
 Furor quas ætates uexet. 18. A
 Furor quas mulieres lædat. 18. B
 Furunt non facile mulieres, sed ualde æ-
 cerbe. 18. B
 Furor qñ uiris accidat. 18. B
 Furentes cñ uoluptate quales sunt. 18. B
 Furentes ab ira quales sunt. 18. C
 Furoris species infinitæ. 18. C
 Furoris modi uarij. 18. G
 Furoris mira species. 18. H
 Furoris miri effectus. 18. C
 Furentium prauæ cogitationes. 18. C
 Furiosi cuiusdam naturæ narratio. 18. D
 Furor in capite et p̄cordijs continet. 18. E
 Furiosi quales cum morbus increuit. 18. E
 Furiosi non macrescunt. 18. F
 Furoris & melancholiæ cum phlegmone
 uiscerum notæ. 18. F
 Furor in summo qualis. 18. G
 Furor in remissione qualis. 18. H

G

G Agates lapis Epilepsiam conci-
 tat. 1. D
 Galli. 72. C
 Gallicus sapo elephantinis bonus. 72. C
 Genitura. uide Semen.
 Glās unguetaria lienis scirrhopdest. 71. C
 Globuli pleuritico sub lingua tenēdi. 52. D
 Gonorrhœa muliebris quæ et unde. 36. H
 Gratificandum ægrotantibus. 54. G
 Grummi in intestinis perniciosi. 35. D
 Gulæ quam sanguinis effusionem patia-
 tur. 8. B
 Gula uenulas & arterias tenues hēt. 8. C
 Gulæ sanguinē emittentis indicia. 8. C
 Gula resoluta quæ picula instant. 47. A
 Gurgulio. 3. H
 Gurgulionis morbi uarij. 4. A
 Gurgulionis affectus sine nomine. 4. B
 Gurgulionis affectus notæ. 4. B
 Gurguliois uitia quæ quibus ætatibus ma-
 gis accidunt. 4. C

H

H Abitus corporis colliquationes
 malæ. 22. E
 Halicæ uires. 51. C
 Halica quomodo pleuritico danda. 51. C
 Hæmorrhagia. 7. B
 Herculeus morbus. 39. F
 Hiera. 44. D
 Hieræ facultas. 46. E. 49. A. 69. F
 Hiera caput purgat. 64. A
 Hiera elephāticis non semel dāda. 72. A
 Homerus. 39. A
 Hominis nuper iugulati sanguis. 67. G
 Hominis iecur. 67. H
 Horrores ab ulceribus malefici. 48. G
 Humores in morbis quō explorādi. 20. G
 Humorū per renes & uescicam transmu-
 tatio optima est. 22. B
 Humor quō ex pulmone pellitur. 22. F
 Humores qñ ad interiora labūtur. 50. H
 Hydrocephalus. 29. E
 Hydrops. 28. A
 Hydropem creat iecoris scirrhus. 24. E
 Hydrops per uescicā purgari pōt. 24. E
 Hydrops per alui effluuium sed cum peri-
 culo tollitur. 24. F
 Hydropici p̄ sudorē facilius sanant. 24. F
 Hydropici ægre sudant. 24. F
 Hydropici per pauci liberantur. 28. A
 Hydropicis nulla ps uest noxacarēs. 28. A
 Hydrops quando adest. 28. E
 Hydropis causa princeps malus habi-
 tus. 28. E
 Hydropis species plures. 28. E
 Hydrops Tympanias. 28. E
 Hydrops Ascites. 28. E
 Hydrops Phlegmatias. 28. F
 Hydrops Anasarca. 28. F
 Hydropis specierum mixtio pessima quæ
 sit. 28. F
 Hydropis quæ peior species. 28. F
 Hydropis Ascitæ notæ. 28. G
 Hydropis Tympaniæ notæ. 28. H
 Hydrops Ascites ex tympania oriū. 28. H
 Hydropis Leucophlegmatiæ notæ. 29. A

I N D E X

Hydropis Anasarca notæ. 29. A
 Hydropi communia signa. 29. A
 Hydropi Anasarca propria. 29. B
 Hydropi Ascitæ et Typaniæ cōia. 29. B
 Hydropi Anasarca & Phlegmatia communia. 29. B
 Hydropici unde sint fiduciæ pleni. 29. C
 Hydropis causa aquæ gelidæ potus. 29. C
 Hydropis causæ diuersæ. 29. D
 Hydropis quæ species quibus magis cūniat. 29. D
 Hydrops Leucophlegmatias mitissima est. 29. E
 Hydrops Anasarca pessima, in qua homo totus permutandus. 29. E
 Hydrops membri unius. 29. E
 Hydrops ab utero. 29. E
 Hydrops à uesticulis. 29. F
 Hypopia. 40. C
 Hypostasis. 70. G
 Hyssopi uires. 70. G

I

I Chor. 36. E
 Icterus, Regius morbus, Arquatus, Aurigo. 25. E. uide. Arquatus.
 Icteri etymon. 26. B
 Ictis. 26. B
 Iecoris maxima pars sanguinis concretum est. 11. B
 Iecur intersepto appensum est. 23. H
 Iecur sanguinis fons et bilis creator. 68. F
 Iecur sanguinem semper creat, et ad alias partes diffundit. 11. D
 Iecur uenæ sanguinem infundit. 60. E
 à Iecore & liene sanguis quo appellit. 7. F
 in Iecore sanguis creatur. 25. H
 Iecur principatū alimenti tenet. 23. G
 Iecur uenæ cauæ radicatio. 60. E
 Iecur uenarum radicatio. 11. C. 23. G
 Iecoris portæ appetitricis animæ domicilium. 11. C
 Iecoris portæ egrotantes cur cito perimunt. 11. B
 Iecoris portarū inflamatarū notæ. 11. D
 Iecoris ad lienem cōparatio. 23. G

Iecur in morbis sanitatem molitur. 23. H
 Iecur quibus morbis afficitur. 23. H
 Iecoris morborum causæ. 24. G
 Iecoris morbos quæ ætas qui sexus magis patiuntur. 24. F
 Iecur egrotās magno cruciatu pimit. 11. B
 Iecur sanguinis profluvia maxima patitur. 11. C
 è Iecore profusio sanguinis sisti non potest. 29. B
 Iecur quas uomicas patitur. 11. C
 Iecoris uomica quo omni tempore, & quæ ætate plus uiget. 11. G
 Iecur uomicæ in hydropem uergentis signa. 11. F
 Iecoris abscessum patientis notæ. 23. H
 Iecoris abscessum interiora petentem natura melius sanat q̃ medicus. 24. B
 in Iecoris abscessu securior est puris exitus per uesticam. 24. B
 Iecoris exterior abscessus nisi secetur, exitialis est. 24. B
 Iecoris abscessus quō incidendus. 24. C
 Iecoris abscessu reciso q̃ sequatur. 24. C
 Iecoris abscessus interius effracti symptomata. 24. C
 Iecoris à phlegmone scirrhum patientis notæ. 24. E
 Iecoris scirrhus hydropem creat. 24. E
 à Iecore arquatus quomodo fit. 25. E
 à Iecore arquati facti signa. 25. F
 Iecoris dolori succurrentia. 43. A
 Iecoris phlegmonæ cur acutissimæ. 59. G
 Iecoris phlegmones pmutatio. 11. F
 Iecori inflammato quæ uenæ sectio conueniat. 59. H
 Iecori inflammato inedia & cibi paucitas conuenit. 59. H
 Iecori inflamato exterius apponēda. 59. H
 Iecoris inflammati cataplasmata & fomenta. 60. A
 Iecori inflammato cucurbitula quando et quō applicanda. 60. A
 Iecori inflammato hirudines an conueniant. 60. A

A R E T E A I

Iecoris inflammati ceratum. 60. B
 Iecori inflammati malagma qualia apponenda. 60. B
 Iecori inflammati cibi quales conueniant. 60. C
 Iecori expurgando uia per renes comoda. 60. C
 Iecoris materiae quomodo in renes trahenda. 60. C
 Iecur hominis. 67. H
 Ignis opera amara & bile infecta. 26. A
 Ileus, Voluulus. 10. E
 Inflammationis suppurantis indicia. 22. A
 Inflammationis proxime rumpenda signa. 22. A
 Inflammationis effractae symptomata. 22. B
 Inflatio facile recedit. 63. E
 Intestinorum binae tunicae. 35. C
 Intestinorum tunica. 35. C
 Intestinorum uulnus pernitiosum. 29. G
 in Intestinis ulcerum species. 34. E
 Intestinorum ulcerum nota. 34. G. 35. E
 Intestini tunica interior iterdum exit. 35. C
 Intestinum inferius solum tunica una priuari potest. 35. C
 Intestini inferioris ulcera cur salubriora. 35. E
 ab Intestinis sanguinis praeuuium quando mortiferum. 35. H
 in Intestinis grummi sunt perniciosi. 35. H
 ab Intestinis sanguis erupturi notae. 36. A
 ab intestinis praeuuium sanguinis cito occurrendum. 35. H
 Intestinorum pus suscipientium notae. 70. F
 Intestinorum leuitas, uide Leuitas intestinorum.
 Inunctiones irrigationibus praestant. 46. F
 Inusitatum magis laedit. 38. F
 Ionthi à latinis Vari appellati. 38. D
 Ira ferarum quomodo sedatur. 42. G
 Ischias. 37. E
 Ischiadis initium. 37. H
 Ischuria. 32. A
 Itrion. 66. H
 Iuuenibus laboriosis oculi inimici. 25. D

L

Abiorum contentio. 20. C
 Labores capiti obsunt. 65. F
 Lactes. 10. F
 Lactuca inter cruda olera optima. 65. E
 Lac. 45. H
 Lac asinae quale. 58. C. uires. 70. H
 Lac ardori uenae cauae & arteriae com-
 petit. 60. G
 Lac & caseus caput dolore uexant. 65. D
 Lactis uires. 70. C
 Lacte uescentes nationes frumentum non
 edunt. 70. D
 Laconicus canis ex uulpe & cane na-
 tus. 72. D
 Lacerpitij lachrymae uires. 48. H
 Lacerpitij lachryma tetanicis quomodo
 danda. 48. H
 Lauationis frigidae utilitates. 66. G
 Lauationis calidae noxae. 66. G
 Leuitas intestinorum à cicatrice. 36. B
 Leuitas intestinorum à debili calore. 36. C
 Leuitatem intestinorum quando uomitus
 soluit. 36. C
 Leuitas intestinorum à malo habitu &
 hydrope. 36. C
 Lentis uires. 65. C
 Leo Morbus. 39. E
 Leonis adeps. 72. D
 Lepores concoctu faciles. 68. D
 Lethargus, uide Veterinus.
 Lienis rarus & sensu carens in sanitate
 quoque est. 25. A
 Lienis natura dissolubilis est. 25. B
 Liene & iecore sanguis quo appellit. 7. F
 Lienem iuuantia. 43. A
 Lienis morbi quas aetates uexent. 25. D
 Lienis uitiorum causae externae. 25. D
 Lienosi quales euadant. 25. C
 Lienosorum ulcera qualia. 25. D
 Lienosi quomodo pereunt. 25. D
 Lienis quando purulentus fit. 24. G
 Lienis purulentus tactui cedit. 24. H
 Lienis suppurantis signa. 25. A
 Lienis abscessus oriens cur interdum la-

I N D E X

tet. 25. A
Lienis abscessus effracti notæ. 25. B
Lienis integræ ptes iterdū excretæ. 25. B
*Lieni inflammato eadem conueniunt quæ
 & iecori.* 60. D
Lieni scirrhus familiaris est. 24. G
*Lienis plerunq; lapideam duritiā pa-
 titur.* 24. H
Lienis scirrhus sanatu' difficilis. 71. B
*Lienis scirrhū sequentes morbi insana-
 biles.* 71. B
*Lienis scirrhus incipiens quomodo tol-
 lendus.* 71. C
Lienis scirrhu q̄ exterius adhibēda. 71. C
Lienis scirrhu glās unguētariā pdest. 71. C
Lienteria. 36. B. uide *Læuitas intestinorū.*
Limnestis, Adarce. 46. G. 57. H
Lingua quid sit. 20. D
Linguae conuulsio. 20. D
*Liquamen bonum stomacho, aluo, capi-
 ti.* 66. G
*Liquamen ex aceto & cumino epilepticis
 bonum.* 68. C
Lipothimia, Deliquium animæ. 19. C
Lobi. 65. C
Lorum. 4. A
Lotium biliosum est. 44. G
Lotij ueteris facultates. 62. D

M

M *Adefactio tendonibus ac neruis
 inimica.* 42. E
Malabathrus arbor indica. 62. D
Malua. 42. B
Maluæ semen melancholiæ utile. 69. F
Malus habitus quid. 27. A
*Malus habitus ab omnibus morbis ema-
 nat.* 26. G
Malus habitus interdum per se fit. 26. G
*Malus habitus omnium est in deterius cō-
 uersio.* 27. A
*Malum habitum sequentes morbi in-
 sanabiles.* 27. A
Mali habitus symptomata. 27. A
Mali habitus causæ. 27. B
Mali habitus futuri signa. 27. B

Mali habitus præsentis signa. 27. C
Malum habitū qui morbi sequunt. 27. E
Malus habitus quas ætates uexet. 27. E
Malus habitus quo tpe anni fit. 27. F
*Mandragora & altercus amentiam pa-
 riunt.* 17. G
Maris falsugo ulcera iterna siccant. 70. B
Marmorata, Aurium sordes. 26. A
Marrubij uires. 70. G
Marrubium podagricis utile. 71. E
Martes. 26. A
Mastiche. 45. F
*Maxilla ualde hiantibus interdum lu-
 xatur.* 20. C
Medicorum error. 34. D
Medicorū quorundā error. 47. B. 68. E
Medicorū error in curāda angina. 49. G
Medicorum error in pleuritide. 52. E
Medicus quæ præstare potest. 69. E
Medico iuueni consilium. 63. B
Medico qñ liceat sopire egrotum. 59. C
*Medicatio nonnullis nocet, resectio ui-
 rium sanat.* 69. F
*Mel quid in cataplasmate prosit, quid so-
 lum.* 43. C
Melancholia quid sit. 17. A
Melācholia furoris initium atq; ps. 17. A
Melancholia quo differt à furore. 17. A
Melancholicorum uariæ species. 17. B
Melancholicorum altera species. 16. H
*Melancholicos cur flatuosos antiqui ap-
 pellabant.* 16. H
Melancholia quomodo nascitur. 16. H
Melācholia qbus mēbris læsis oriū. 17. B
Melancholici qui fiant furiosi. 17. C
Melancholiæ causa. 17. C
*Melancholia prima ac maxima causa in
 capite.* 69. A
*Melancholiæ & furori qui sexus, quæ
 ætates, quæ anni tempora magis subij-
 ciantur.* 17. C
Melancholiæ indicia. 17. C
Melancholicorū qñ insomnia uera. 17. D
Melancholia quos facile corripiat. 18. A
Melācholiæ et furoris p̄cipua sedes. 18. E

A R E T E A I

Melancholia & furoris cum phlegmone
 uiscerum notæ. 18. G
 Melancholia ex quibus humoribus. 68. F
 Melancholia alimētū sāguis et bilis. 68. G
 Melancholicis carnes sunt sicca ac den=
 se. 69. G
 Melancholicis ppria est corpulētia. 18. F
 Melancholicorū sensus uitiantur. 69. A
 Melancholia quando insanabilis. 69. D
 Melancholiam sequentes morbi insana=
 biles. 69. D
 Melancholicis quando & quæ uena se=
 canda. 68. F
 Melancholicis quantum sanguinis mit=
 tendum. 68. G
 Melancholicus à purgatione quomodo
 habendus. 68. H
 Melancholico cucurbitula quando & ubi
 applicanda. 69. A
 Melancholici stomacho præcipue succur=
 dum. 69. B
 Melancholia quando uehementiora me=
 dicamenta requirit. 69. B
 Melancholia paruis medicamentis non
 cedit. 69. D
 Melancholicis ueratrū & qua ratione
 dandum. 69. D
 Melancholiae utile maluæ semen. 69. F
 Melancholicis utiles aq̃ spōte calida. 69. G
 Melancholiae humectatio prodest. 69. G
 Melancholicos ualde iuuat carniū ra=
 ritas ac mollicies. 69. G
 Melancholicis incunctio & frictio qua=
 lis conuenit. 69. G
 Melancholicorum cibi & potiones qua=
 les. 69. H
 Melancholici ne cibum euomant quomo=
 do succurrendum. 69. H
 ad Melancholicos eclegma. 70. A
 Melancholicis apponēda exterius. 70. A
 Membranæ succingentis sanguinem mit=
 tentis notæ. 8. F
 Membrana succingens cur'tanum furis
 contineat. 21. G
 Mentæ uires. 65. D

Metaphrenon. 2. H
 Mictus sanguinis. 31. C
 Mictus sāguinis pidioci symptomata. 31. C
 Mictu sanguinis consuetō cessante quæ
 sequantur. 31. D
 Mictus sanguinis disruptis renibus. 31. D
 Mictui sanguinis quamprimum succur=
 rendum. 61. F
 Mictum sanguinis supprimentia. 61. F
 ex Milio cataplasma. 43. B
 in Morbis acutis regula. 41. H
 Morbis longis dilatio medelæ nocet. 63. E
 Moretum. 34. F
 Mortis periculo imminēti omnia uel im=
 mitia danda. 55. H
 Motus & uigilia discutiunt. 44. H
 Mulieres humida & frigida sunt. 23. A
 Mulier es non facile, sed ualde acerbe fu=
 runt. 18. B
 Muliebris fluxus qui cui ætati magis no=
 cet. 36. G
 Muliebris gonorrhœa quæ et unde. 36. G
 Mulsæ à biliosis facile concoquitur. 42. B
 Mulsæ uires. 43. C
 Mydriasis. 19. H
 Myttoton. 34. F

N

N Aribus acria quō ifūdēda. 64. D
 Naturæ robusta potentia. 9. E
 Natura quō alimenta distribuât. 26. H
 Naturam copiosum & subitū uitiat. 56. E
 Naturæ ijsdem circuitibus iudicāt, quibus
 morbi interimunt. 56. F
 Naturæ salutare materiæ recursus. 65. H
 Natura statis temporibus oīa molit. 68. E
 Naturæ potētia sanitatem, debilitas egri=
 tudinem perit. 69. G
 Necrosis. 13. F
 Neruorū capitis progressus et situs. 19. E
 Neruorū è capite fluentium natura. 19. F
 Neruorum in musculis natura. 19. F
 Nerui ex capite oriuntur. 45. C

O

O Chri. 65. C
 Ocium inimicum iuuenibus labo=

I N D E X

riofis.	25.D
Ocium est nebula sensuum.	69.A
Oleum obtundet acria.	45.E
Olea quomodo spissanda.	46.F
Oleum rutaceū intestinis ppitiū.	59.D
Oleum scyonium.	64.D
Opisthotonus.	2.C
Opisthotoni signa.	2.G
Orgyia.	39.B
Oris ulcus depascens.	4.E
ab Ore sanguis exit duobus modis.	7.A
ab Ore sanguinis fluentis signa.	7.B
Oris uentriculi remedia.	43.G
Ordei cremor.	42.C
Ordei cremoris facultates.	51.B
Ordei grana quando & quomodo pleuritico danda.	51.D
Orthopnoea.	22.H
Oryza natura pleuritidi inimica.	51.C
Os pectoris, Sternon.	21.E
Ossa maximum dolorem afferunt ipsa non dolentia.	30.F
Ossa cur non dolent.	37.G
Ouilla caro qualis.	65.D
Oua quando & quomodo pleuriticis danda.	51.E
Oua proxime ē gallina edita & adhuc calentia pleuritico utilia.	51.E
Oua ex animalibus nuper edita absque igne optima.	70.E
Oxymel quando pleuriticis dandū.	52.E

P

P Alato exeuntis sanguinis nota folio.	7.D
Palpebrarum palpitatio.	20.C
Palpatio aurium temporumq; quantum ualeat.	42.G
Panis pleuritico quo modo præbendus folio.	51.C
Pantheræ adeps.	72.D
Papauer quo modo somniferū.	42.G
Papaueris lachryma quō utendū.	42.G
ex Papauere medicamen.	52.D
Paraplegia.	19.B
Paraplegia apud Hippocratem.	19.B

Paraplegiæ species.	19.G
Paralysis.	19.B
Paralysis in membris quomodo fit.	19.C
Paralysis signa.	20.B
Paralysis potissima causa.	20.A
Paralysis quibus ætatibus, quo anni tempore magis noceat.	20.A
Paralysis quos habitus corporis magis corripit.	20.B
Paralysis ab iciso neruo insanabilis.	20.A
Paralysis sanandæ indolentia pdest.	20.B
Paresis.	19.C
Paresis causæ.	19.H
Pectoris sanguinem fundentis indicia.	8.F
Pectoris os, Sternon.	21.E
Pectori æstuanti cōueniētia auxilia.	43.F
Pedum manuumq; natura similis.	38.B
Pedes suum concoctu faciles.	68.D
Pepones frigidi & humidi.	68.D
Perinaeus.	62.H
Peripneumonia Pulmonia. 6. E. uide Pulmonia.	
Peritonæum.	24.H
Peritonæi tumor qualis.	24.B
Peristrophus.	38.B
Phagedæna.	37.A
Phrenitis ubi plerunq; fit.	18.E
Phrenitici ex neruis laborant.	41.E
Phreniticorum febres quales.	42.A
Phrenitis facile in syncopam mutat.	41.H
Phrenitici acute audiunt.	41.B
Phrenitici parum bibunt.	43.H
Phrenitici cōclaue quale esse debet.	41.B
Phrenitici cubile & lectus quales esse debent.	41.E
Phrenitici in tenebris ne an in luce habendi sint.	41.F
Phreniticis cibi quales quando & quanti sint exhibendi.	41.F
Phreniticis cur cibi humidi maxime prosunt.	42.B
Phreniticis olera conueniunt.	42.B
Phreniticis qui fructus cōueniant.	42.D
Phreniticis quando cibus subtrahendus uel augendus.	42.C

A R E T A E I

Phreniticis qñ uinum conuenit. 43.H
 Phreniticis quando & quæ uena secan= da. 41.G
 Phreniticis non multum sanguinis detra= hendum. 41.H
 Phreniticis quando & quomodo secanda est uena. 42.A
 Phreniticis conducit lotij excretio. 42.B
 Phreniticis tonsura crinium quando & quanta conueniat. 43.E
 Phreniticis capitis irrigationes. 42.D
 Phreniticorū capitis irrigādi tpa. 42.E
 Phreniticis caput quando lauandū. 44.B
 Phreniticis quando somnus alliciendus. & quomodo. 42.F
 Phthee. 20.F
 Phthoes signa. 20.F
 Phthoe autumnno abundant. 8.G
 Phthisis. 20.E
 Phthisis sine ulcere pulmonis. 20.H
 Phthisicis aluū pturbari letale est. 21.C
 Phthisis cui ætati plus minusue noceat. folio. 21.C
 Phthisis senibus letalis. 7.A
 Phthisi expositi corporis habitus. 21.D
 Phthisim quæ regio ferat. 21.D
 Phthisicis oleum cū aceto prodest. 70.C
 Phthisicorum uaria edulia. 70.D
 Picerium. 52.D
 Pictura parietum mentem turbat. 41.E
 Piper & ei similia pleuriticis psunt. 51.E
 Pisces saxatiles alijs præstatiores. 42.C
 Pisces alios alia regio fert. 42.C
 Pisces pleuriticis utiles. 51.F
 Pituitæ uomitus unde. 36.H
 Pituitam per os ducentia. 64.E
 Plantaginis succus qualis. 55.G
 Plecas. 14.E
 Pleuritis. 5.A
 Pleuritis, lateris uel costarum morbus à latinis. 5.B
 Pleuritidis notæ. 5.A
 Pleuritidis accidentia. 5.B
 Pleuriticus in latus affectum facilius ia= cet. 5.B

Pleuritidis signa salubria. 5.D
 Pleuritidis pessimum signum. 5.B
 Pleuritis quomodo soluitur. 5.D
 Pleuritis quando plerūq; sanatur. 5.E
 Pleuritis quando terminatur. 5.C
 Pleuritidis mutatio. 5.C
 Pleuritis nonnullis erupit. 51.A
 Pleuritis qñ in purulentiam uertitur. 5.C
 Pleuritidis in purulentiam uergentis sig= gna. 5.E. 51.G
 Pleuritis pulmonie succedens minus ma= la. 50.H
 Pleuritis quo anni tpe plus abundat. 5.E
 Pleuritis cui sit ætati infestior. 5.F
 Pleuritida cur senes euadant. 5.F
 Pleuritis in pueros nec frequens nec peri= culosa. 5.F
 Pleuritidi protinus succurrendum. 50.G
 Pleuriticis qñ & quæ uena secanda. 50.G
 Pleuriticis quātū sāguinis mittendū. 50.H
 Pleuritico sanguis quō mittendus. 50.H
 Pleuriticus quo modo perungendus & ir= rigandus. 51.A
 Pleuriticorum Cibi quales. 51.B
 Pleuritico ptisana quomō paranda. 51.B
 Pleuritico halica quomodo danda. 51.C
 Pleuritidi oryza natura inimica. 51.C
 Pleuritico panis quomō præbendus. 51.D
 Pleuritico ordeï grana quando & quo= modo danda. 51.D
 Pleuriticis oua quādo & quō danda. 51.E
 Pleuritico oua proximè e gallina edita & adhuc calentia utilia. 51.E
 Pleuriticis piper & ei similia psunt. 51.E
 Pleuriticis quæ carnes apponendæ. 51.F
 Pleuriticis pisces utiles. 51.F
 Pleuriticis fructus q & quādo dādi. 51.F
 Pleuritici lateri dolenti quæ et quādo im= ponenda. 51.G
 Pleuritici in purulentiam uergentis notæ & quæ tunc imponenda. 51.G
 Pleuritico cataplasmata quomodo appli= canda & alia fomenta. 51.H
 Pleuritico cucurbitula quando & quomo= do admouenda. 51.H

Pleuriticis

I N D E X

Pleuriticis cucurbitula ualde utilis. 52. A
 Pleuriticis quid post scarificationes adhi=
 bendum. 52. B
 Pleuriticorum clysteres quales. 52. C
 Pleuritico quæ assidue deuoranda. 52. D
 Pleuritico globuli sub lingua tenēdi. 52. D
 Pleuritico quo tempore danda medicami=
 na. 52. E
 Pleuriticis eclegma utile. 52. E
 Pleuritidi diuturnæ medicamen conueni=
 ens. 52. E
 Pleuriticis oxymel quando dandū. 52. E
 Pleuritis non uera. 52. F
 Pleuritidi non ueræ aqua frigida pdesse
 ualet. 52. F
 Pleuritidi ueræ etiam frigida spiratio
 nocet. 52. G
 Pleuritidis reliquæ cur mature tollen=
 de. 52. G
 Podagra. 37. E
 Podagræ mutatio. 38. B
 Podagræ permutatio. 38. G
 Podagra sæpe in chiragrā mutatur. 38. B
 Podagra raro continua. 38. E
 Podagricus in olympicis uictor. 38. E
 Podagra quibus magis accidat. 38. F
 Podagra cui ætati magis infesta. 38. F
 Podagræ symptomata. 38. F
 Podagricorum mores. 38. G
 Podagricis ueratrū quando utile. 71. D
 Podagræ quinquefolium bonum. 71. E
 Podagricis marrubium utile. 71. E
 Podagræ conferunt mala citria. 71. E
 Podagricos non idem semper iuuat. 71. E
 ad Podagricos capræ remedium. 71. F
 Præcordijs utilia. 43. A
 Principiorū uitij omnia consentiūt. 2. C
 Proboscis unde dicta. 39. D
 Pruna damascena. 54. G
 Psoæ. 30. H
 Ptissana quomō pleuriticis parāda. 51. B
 Ptissana quibus condienda. 67. A
 Ptissana cremor coctilis & tenuis mate=
 rie. 70. D
 Ptissanam licet in alicā permutare. 70. D

Puerorum natura. 4. F
 Puerorum corpora qualia. 5. F
 Pueris uentris effluuiū cur assiduū. 34. A
 Pueris uomitus quomodo curandus. 47. F
 Pulegij uires. 65. D
 Pulmonis natura. 5. C. 22. F. 50. H
 Pulmo dolore uacat. 21. H
 Pulmo cur dolore uacat. 6. E
 Pulmo semper ad se humores allicit. 53. E
 ex Pulmone quomō humor pellitur. 22. F
 Pulmonis affecti notæ. 6. D
 Pulmonis morbi pleuritidi succedentes
 insalubres. 50. H
 Pulmoni madefactio inimica. 53. H
 Pulmoni qualia medicamenta conueniant.
 folio. 53. E
 Pulmonis sanguinem fundētis notæ. 8. E
 Pulmonia, Peripneumonia. 6. E
 Pulmonia malum peracutū et letale. 53. A
 Pulmonia quotidie necat. 6. G
 Pulmonia quando interficit. 22. F
 Pulmonia iuuenibus exitialis. 7. A
 Pulmonia salubris. 22. E
 Pulmonia in melius uergentis crisis. 6. G
 Pulmonia quæ in purulentiā uertit. 22. E
 Pulmonia signa. 6. E
 Pulmonia sputa qualia. 22. G
 Pulmonia mira proprietas. 22. G
 Pulmonia pleuritis succedens minus ma=
 la. 50. H
 Pulmonarium. 23. E
 Pulmonarium quādiu duret. 23. E
 Pulmonario qui sint obnoxij. 23. E
 Pulmonarij signa. 23. F
 Pulmonarium quomodo finit. 23. F
 Pulmonaria undiq; obsidenda impugnan=
 daq;. 53. E
 Pulmonarijs quæ uena secanda & quantū
 sanguinis mittendum. 53. A
 Pulmonarios quāiuuet uenæ sectio. 53. A
 Pulmonarijs sedes quibus oblinenda. 53. B
 Pulmonarijs acres clysteres quādo & qui
 conueniunt. 53. B
 Pulmonarijs ubi cucurbitule affigende.
 folio. 53. E

A R E T A E I

Pulmonarijs quæ ore sumenda.
Pulmonarijs quâdo somnifera danda. 53. F
Pulmonarijs mēbra laxanda, & sputo euo-
cando studendum. 53. G
Pulmonarij pectori quæ imponenda. 53. H
Pulmonario quibus extra ducendi humo-
res, calor, & spiritus. 53. H
Pulmonarijs cibi quales dandi. 53. G
Pulmonarijs potus qualis & quātus. 53. G
Pulmonarijs flatus infesti. 53. G
Pupillæ amplificatio. 19. H
Pupillæ phthisis. 19. H
Purgatio stomacho ac uiribus laboriosa.
folio. 69. A
Pus bonum. 22. C
Pus malum. 22. C
Puris multiplices differentia. 22. C
Pus internum per quas uias eijcitur. 21. E
Puris exitus per uesticam securior. 24. B
Pus per intestina quomō educendū. 71. A
Pure undelibet erumpente cibi quales dan-
di. 71. B
Purulenti. 20. F. 21. E
Purulentia causæ. 21. G
Purulentia signa. 21. H
Purulentia salubris signa. 22. D
Purulentia in osse pectoris qualis. 22. D
Pye. 20. E

Q

Q Vies exercitationibus succedat.
folio. 66. G
Quinquefolium podagræ bo-
num. 71. E

R

R Abiosticis potentia. folio. 3. D
Radices etiam elixæ prauæ sunt. 65. E
Rarum cur bene sentit. 37. G
Rarefactioni & diuisioni uenarū adstri-
ctio medetur. 54. H
Rarefactionis uenarum remedia. 55. A
Regula in morbis acutis. 41. H
Regula in mittendo sanguine. 46. G
Remedia morbis maiora esse debēt. 71. G
Res quando in cōtrarium mutantur. 9. G
Renum descriptio. 30. E

Renum uentres quales. 30. G
Renum natura. 61. E
Renum actio quæ. 12. G
Renum actionem quæ impediunt. 12. G
Renes non multū periculis expositi. 12. F
Renes morti inferendæ habiles. 12. G
Renum qui morbi quo anni tēpore. 31. E
Renum longi morbi. 30. F
Renum profluuium sanguineum quando
mortiferum. 13. B
Renum ulcerum signa. 31. E
Renum ulcera ægre sanabilia. 30. F
Renum ulcera uix sanabilia quæ. 31. E
Renū inflāmatio & iecur inflāmat. 61. A
Renum inflāmatōne quæ sequunt. 61. A
Renum calculi notæ. 30. H
Renum calculo et inflammationi uenæ se-
ctio quādam proffit. 61. B
Renibus calculosis & inflāmatis quæ ex-
tra imponend. 61. B
Renum calculo & phlegmonæ quales cly-
steres profunt. 61. C
Renum calculo & phlegmone urinam ci-
tantia & cibaria quæ profunt. 61. C
Renes calculosos & inflammatos cruditas
lædit. 61. C
Renum calculo & phlegmonæ lauatio et
insestiones utiles. 61. C
Renum calculo agitatio corporis pro-
dest. 61. D
Renibus lac utile. 61. C
Resolutis quā sit utile castoreum. 46. F
Resolutorum omnium præcipuum reme-
dium. 47. D
Rhei radix. 55. B
Rhœas. 31. G. 62. A
Rhyteon. 34. G
Rutaceū oleum intestinis propitiū. 59. D

S

S Acrum dicitur omne magnum. fo-
lio. 16. F
Sacri ex aloë medicamento uires. 69. F
Sal quomodo scarificato loco inspergen-
du. 52. A
Sanguinis fons iecur. 60. F

I N D E X

- Sanguis calidus est. 60. A
 Sanguis naturæ prædiū et alimentū. 68. G
 Sanguinis natura. 54. A
 Sanguis et bilis melancholice alimentū. 68. G
 Sanguis nimius quas noxas affert. 62. H
 Sanguinem calor elicit. 52. G
 Sanguine largius effuso natura cibi im-
 pia debilitatur. 68. G
 Sanguis undequaq; fluat malum est. 54. A
 Sanguinis effusionis tres modi. 7. G
 Sanguinis aliquo loco prius collecti effu-
 sio. 7. A
 Sanguinis effusio quo tempore anni uiget
 & maxime letalis est. 8. G
 Sanguinis fluori terræ spēs medētes. 55. D
 Sanguini sistendo apti globuli sub lingua
 tenendi. 55. E
 Sanguini sistendo apti pastilli. 55. E
 Sanguinem sistētia. 60. B
 Sanguinē mittēti loco quæ iponenda. 54. E
 Sanguis in naribus fluēs quomodo sistē-
 dus. 64. G
 Sanguinis sputū uel eruptio, Hemorrhæ-
 gia. 7. B
 Sanguis ab ore duobus modis exit. 7. A
 Sanguinis ab ore fluentis signa. 7. B
 Sanguinis ē capite manantis notæ. 7. B
 Sanguinis ē capite fluentis curatio. 7. E
 Sanguinis ē palato exeuntis notæ. 7. D
 Sanguinem spuenti quomodo gratifican-
 dum. 55. G
 Sanguinem spuentibus quæ medela præ-
 stantior. 54. H
 Sanguinis sputum sistētia ore sumenda
 triplicia. 54. H
 Sanguinē expuenti deligaturæ quales cō-
 ueniant. 54. E
 Sanguinem spuentibus epithemata uti-
 lia. 54. F
 Sanguinem spuenti alimēta uaria cur dan-
 da & qualia. 55. F
 Sanguinem spuenti dura concoctu negan-
 da. 55. H
 Sanguinem spuenti cur nimium siccantia
 & crassantia uitanda. 56. A
 Sanguinis reiectio, Anagoge. 7. B
 Sanguinis reiectionem semper comitan-
 tia. 8. G
 Sanguinis reiectio redire facile solet. 56. B
 Sanguis à uena quo differt à sanguine ab
 arteria. 8. A
 Sanguinis ab aspera arteria exeuntis no-
 tæ. 8. E
 Sanguinis quā effusione gula patiat. 8. B
 Sanguinis à gula exeuntis signa. 8. C
 Sanguinis ē pulmone effusi notæ. 8. E
 Sanguinis ex pulmone reiectio omniū pes-
 sima cur minime hominē terreat. 8. H
 Sanguinis ē pectore prodeūtis notæ. 8. E
 Sanguinis à membrana costas succingen-
 tis notæ. 8. F
 Sanguinis à uentriculo exeuntis indi-
 cia. 8. D
 Sanguis à iecore & liene quo propelli-
 tur. 7. F
 Sanguinis profluvia maxima iecur pati-
 tur. 11. C
 Sanguinis ē iecore profusio sisti non po-
 test. 24. C
 Sanguinis ab inferioribus uisceribus reie-
 ctio mortifera. 7. E
 Sanguinis reiectiōi cito succurrēdū. 54. B
 Sanguinem reiectātī qualis aer, locus, de-
 cubitusq; conueniat. 54. B
 Sanguinem reiectanti silentium & animi
 oblectatio prodest. 54. B
 Sanguini reiectiōi cū febre quæ psint. 55. F
 Sanguinem reiectanti quando & quæ ue-
 na secanda. 54. C
 Sanguinem reijcienti quantus et quomodo
 sanguis mittendus. 54. D
 Sanguis si à liene fertur, quæ uena secan-
 da. 54. C
 Sanguinē reiectanti emplastra quæ con-
 ueniant. 54. F
 Sanguinē reiectātī potus partissimus. 55. H
 Sanguinem & spiritum crassantia. 55. H
 Sanguinis reiectione suppressa quid agen-
 dum. 56. A
 Sanguinis erupturi ad ītestinis notæ. 35. E

A R E T E A I

- Sanguinis profluuium ab intestinis quan-*
do mortiferum. 35. H
- Sanguinis ab intestinis profluuium cito oc-*
currendum. 35. D
- Sanguinis mictus, uide Mictus sanguinis.*
- Sanguinis de uestica profluuium.* 32. A
- Sanguinis in uestica congelati signū.* 31. A
- Sanguis homines nuper iugulati.* 67. G
- Sanguinis missio usq; ad defectum animæ*
dolorem sedat. 59. B
- Sanguinis missio, uide Sectio uenæ, &*
Venæ sectio.
- Satiari qbuslibet uel utilibus malū ē.* 65. E
- Satyri Dionysio sacri.* 14. E
- Satyriasis.* 14. E. 39. E
- Satyriasis unde oritur.* 62. F
- Satyriasm quæ comitentur.* 62. G
- Satyriasi quæ accidunt.* 14. E
- Satyriasis facile neruos conuellit.* 63. B
- Satyriasis quomō iterdum soluitur.* 14. G
- Satyriasis septimo die hominem consu-*
mit. 14. H
- Satyriasis quibus anni temporibus, etati-*
bus, naturis maxime accidat. 14. G
- Satyriasm mulieres pati nequeunt.* 14. H
- Satyriasis curatio.* 14. G
- Satyriasm animæ deliquium leuat.* 62. G
- Satyriasi qualis corporis purgatio com-*
petit. 62. H
- Satyriasis quæ quibus locis exterius appo-*
ni requirat. 62. H
- Satyriasi utilia cataplasmata & alia exte-*
rius applicanda. 62. A
- Satyriasm quales clysteres leuent.* 63. A
- Satyriasm cucurbitulæ ubi posite iu-*
uent. 63. A
- Satyriasi hirudines quō profunt.* 63. A
- Satyriasis inueterata qua methodo curan-*
da. 63. B
- Satyriasi quales cibi utiles.* 63. C
- Scarificato loco sal quomodo inspergen-*
dus. 52. A
- Scarificatio minus uires ledit.* 56. E
- Scotoma.* 16. B
- Scirrhus.* 23. H
- Scirrhus iecoris hydropem creat.* 24. E
- Scirrhus lienis, uide Lienis.*
- Scirrhi inflammationibus succedūt.* 71. C
- Sectio uenæ quibus uitij cōpetit.* 42. A
- in Sectione uenæ regula.* 46. B
- Seminis seu genituræ facultates.* 32. E
- Seminis uitalis facultates.* 32. F
- Seminis profluuii causæ.* 32. D
- Seminis profluuium in mulieribus quā-*
le. 32. D
- Seminis profluuii symptomata.* 32. E
- Seminis profluuium cur paralyfim af-*
fert. 32. E
- Seminis profluuium satyriasi succedit.*
folio. 32. G
- Senectus frigida.* 29. D
- Senecta frigida & humida.* 2. E
- Senectæ delirium unde fit.* 17. H
- Senectæ uitium.* 33. E
- Sensuū caligo est somni principū.* 42. G
- Sensuum nebula ocium est.* 68. A
- Sepiæ atramentum.* 10. F
- Sicyonium oleum.* 64. D
- Simia homini mire prodest.* 72. E
- Sinapis uires.* 45. F. 65. C
- inter Sinistram & dextram corporis par-*
tem differentia. 19. D
- Sisarum.* 65. E
- Somni principium sensuum caligo est.*
folio. 42. G
- Somnus multus refrigerat, resoluit, stupe-*
facitq; neruos. 14. G
- Somnum inuitantia.* 42. F
- Somniferum quomodo papauer.* 42. G
- Somnum inuitant cuiq; usitata.* 42. H
- Somni mediocris utilitas.* 66. D
- Somnus multus crassum facit.* 68. A
- Sordida cuti mordacia.* 72. F
- Spirandi initium in pectore.* 3. G
- Spirandi principium cor.* 6. D. 23. A
- Spirationis instrumenta.* 6. D
- Sputū sanguinis uel eruptio, Hemorrhæ-*
gia. 7. B
- Sputum citantia.* 52. C
- Sternutatoria.* 45. C

I N D E X

Sternutatoria quæ. 64.D
Sternon, os pectoris. 21.E
Stomachi uires. 32.G
Stomachi munera. 70.F
Stomachi delectationē quæ sequat. 32.G
Stomachus ieiunus atra bile uexat. 32.G
*Stomachici nonnunquā melancholici fi-
unt.* 33.B
Stomacho laborant literarū studiosi. 33.C
Stomachi lesi notæ. 9.D
Stomachi ægri uaria symptomata. fo =
lio. 32.G/H
Stomachus cordi noxas impertit. 9.C
*Stomacho cor contiguū quos morbos ex-
citet.* 33.C
*Stomachus si male deuoret, æger, morbo
fameq; consumitur.* 70.F
Stomachi morborum causæ. 33.C
*Stomachus ante uiolenta uomitoria exer-
cendus est.* 66.B
*Stomachus atra bile uexatus quomō pur-
gandus.* 63.H
*Stomacho ac uiribus laboriosa est pur-
gatio.* 68.H
*Stomachum pure occupari exitiosissi-
mum.* 70.F
Stomachi pure occupati notæ. 70.G
*Stomacho pus suscipienti quomodo suc-
currendum.* 70.G
*Stomacho diligenter cauendum in omni-
bus puris effluuijs.* 71.A
Storyne. 64.F
Strangulatū auget deliquiū animi. 53.A
Stratum durum neruis ingratum. 41.E
Strophus. 34.B
*Succingens membrana cur tantum puris
contineat.* 21.G. uide Membrana.
Sudorem sistens epithema. 57.E
Sudori sistendo uaria remedia. 57.G
*Suppurationem quæ partes ægre admit-
tunt.* 22.D
*Suppuratio in quibus membris mortife-
ra.* 22.E
Suum pedes concoctu faciles. 68.D
Synanche, Angina. 3.C

Syncopa. 9.A
Syncopa quid est. 56.C
Syncopa cordis & uitæ aegritudo ē. 9.B
Syncopæ causæ. 9.E
Syacopæ causæ causus febris 9.E
Syncopæ initium febris ardens. 56.C
in Syncopā uersi causi symptomata. 9.C
Syncopæ notæ. 9.E
Syncopam futurā pspicere bonū ē. 56.C
Syncopa quando aduenit. 56.F
Syncopa iā præsens non facile tollit. 56.C
*Syncopa futura arcenda, aut incipiens re-
pellenda.* 56.C
*Syncopa uexatis plusquā alijs gratifican-
dum.* 57.A
Syncopæ potus & cibus quales. 56.H
Syncopæ inedia & fames inimica. 56.H
Syntectici, Colliquati. 24.G
Syria cœle quibus morbis subiecta. 4.G
Syriaca & Aegyptia ulcera. 4.G

T

T *Abidos facit aegritudo longa.* fo =
lio. 25.D
Temperantiæ utilitas. 23.F
Tergentia corpus. 72.D
*Terræ species fluori sanguinis meden-
tes.* 55.D
Tetanus. 2.C
Tetanus neruorum labes. 9.B
Tetanus ad syncopam uergit. 48.A
*Tetanus quas partes corporis maxime
ledat.* 48.C
Tetani signa. 2.G
Tetanus à uulnere letalis. 48.F
Tetanus patientis cubiculū quale. 48.A
Tetanus patientis lectus qualis. 48.A
Tetano sectio uenæ quō adhibēda. 48.B
Tetano inedia non conuenit. 48.B
Tetano cibi conuenientes. 48.B
*Tetano uexati corpus quibus inungendū
& oblinendum.* 48.C
Tetani fomenta. 48.C
Tetani caput quomodo fouendum. 48.D
*Tetanicorum capitis epiplasmata quæ-
lia.* 48.E

A R E T A E I

Tetanicis cucurbitula ubi & quomodo
affigenda. 48.E
Tetanicis castoreum salutare. 48.G
in Tetano quomodo utendum castoreo. 48.G
Tetanicis laserpitij lachryma quomodo
danda. 48.H
Tetanici anus & uestica quibus illinen=
da. 49.A
Tetanico per clysterem quod purgatorium
infundendum. 49.A
Tetani à uulnere curatio. 48.G
Tetani ulcere cataplasmata qualia. 48.G
Thapsia cephalæ prodest. 65.B
Theriaca elephanticis omnium remedio=
rum utilissima. 72.C
Thymelea. 49.D. 67.F
Thymi coma atram bilem educit. 68.H
Tinesmus. 10.D
Tosi in articulis. 38.D
Tonus. 2.C
Tonsillarum ulcera benigna. 4.D
Tonsillarum ulcera pestifera. 4.D
Tonsillas lædentia. 4.F
Tonsillarum morbi cur pueros uexet. 4.F
Tonsillarum uitia quoniam puellas tentat. 4.G
Tonsillarum uitia quibus regionibus abun=
dent. 4.G
Tonsillarum morbos comitantia. 4.G

V

Vari à græcis Ionthi appellati.
folio. 38.D
Vasculorum erosionis rupturæ & rarefa=
ctionis curatio quo differt. 8.B
Venenum in corporibus nostris creat. 3.D
Venarum radicatio iecur. 11.C. 23.G
Venæ causæ radicatio iecur. 60.E
Venæ causæ situs & partes. 11.G
Venæ causæ inflammatio. 12.B
Venæ causæ inflammata signa. 12.B
Venæ causæ & arteriæ innanitio non fa=
cile defectum animi tollit. 60.F
Venæ causæ & Arteriæ Ardor. uide
Ardor.
Venæ cubiti causæ utilitas. 54.C
Venarum cubiti quarundam declaratio. 54.C

Vena ad lienem pertinens. 54.D
Venæ somniferæ carotides. 13.H
Venarum rarefactioni & diuisioni adstri=
ctio medetur. 54.H
Venarum rarefactionis remedia. 55.A
Venarum erosioni congelatio sanguinis
& caloris succurrit. 55.A
Venarum erosionibus quæ applicanda. 55.C
Venarum uulneris remedia. 55.B
Venæ sectio quibus uitij conuenit. 42.A
uide Sectio uenæ. uide Sanguinis
missio.
Venus capiti ac neruis inimica. 65.F
Venus epilepsiæ similitudinem adducit.
folio. 68.E
Veratri albi facultates. 72.G
Veratrum album igni simile. 72.H
Veratri exhibendi uarij modi. 66.B
Veratrum nigrum quomodo exhiben=
dum. 68.G
Ventriculus concoctioni destinatus. 33.F
Ventriculi concoctionis imperfectæ si=
gna. 33.H
Ventriculi sanguinem effundētis signa. 8.B
Ventriculi inflammationi succurrentia.
folio. 42.H
Ventriculum tumidum curantia. 42.G
oris Ventriculi remedia. 44.D
Vertigo. 16.B
Vertiginis notæ. 16.C
Vertiginis causæ. 16.B
Vertiginis uariæ causæ. 65.G
Vertiginis causæ alimentum est sanguis
& uentriculus. 65.H
Vertiginis à cephalæa qualis curatio.
folio. 65.G
Vertiginis ab humorum retentione cura=
tio. 65.H
Vertigine quando sectio uenæ, quando cu=
curbitula subuenit. 65.H
Vertiginosis quæ uenæ, quæ arteriæ secan=
da. 66.A
Vertiginoso cucurbitula ubi ponenda.
folio. 66.A
Vertiginoso capiti omnia adhibenda quæ

INDEX

- Œcephalææ.* 66. A
Vertigini prodest cyclamini succus & a=
nagallidis in nares infusus. 66. A
Vertiginosi quando & quibus uomitibus
uti debent. 66. A
Vertiginis acceſſionibus quomodo succur-
rendum. 66. B
Vertiginis acceſſionem diſcutientes her=
bæ. 66. C
Vertigini quàm noceat ſomnus immodi=
cus. 66. D
Vertigini uigilia quæ noxia. 66. D
Vertiginem leuat alui lenitas. 66. D
Vertiginosis friktiones & ambulationes
quales conueniant. 66. D
Vertiginosi qualem uocem exercere de=
bent. 66. E
Vertiginosos qualis geſtatio iuuet. 66. E
Vertiginoso quomō caput & manus exer=
cendæ & fricandæ. 66. F
Vertiginosis pilæ ludus detrimēto ē. 66. F
Vertiginoso pdeſt ſaltus & curſus. 66. F
Vertiginosus quieſcat ab audiendo & lo=
quendo. 66. H
Vertiginosi quibus locis ambulare de=
bent. 66. H
Vertiginoso qualis capitis lauatio pro=
deſt. 66. G
Vertiginosus ante cœnam lauatur. 66. H
Vertiginosis potus & cibus qualis. 66. G
Vertiginosis oua qualia cōueniunt. 66. H
Vertiginosi cœna qualis. 66. H
Vertiginosis quæ carnes ſumendæ. 66. A
Vertiginosis ſecūdæ menſæ quales. 67. A
Vertiginosis à cœna quæ faciendæ. 66. A
Vertiginem affert inſpectus aquæ flu=
xus. 68. A
Vertiginem & epilepſiam circūuolutio
acceſſit. 68. B
Vertex capitis euacuationi commo=
dum. 44. H
Veficæ locus. 13. C
Vefica & anus inter ſe cohærent, mu=
tuosq; afficiuntur. 31. H
Veficæ munus. 13. C
Veficæ natura. 13. C. 32. B
Veficæ uitijſ pueri maxime uacant. 13. F
Veficæ uitia quo tempore quauæ ætate ui=
gent. 13. F
Veficæ acuti morbi qui accidunt. 61. E
Veficæ acutorum morborum notæ. 13. E
Veficam lædentes cauſæ uenenosæ. 13. E
Veficam morbi omnes difficiles. 31. F
Vefica morbi laborantium miſeria. 32. C
Vefica ſeuos dolores patitur. 13. B
Vefica oī corpori dolorem ipertit. 13. B
Veficæ dolor acutior & mors celerrima
ſequitur. 61. E
Veficæ occluſionis frequens cauſa. 13. C
Vefica occluſa quæ mala inferat. 13. C
de Vefica ſanguinis profluuium. 32. A
Vefica qualem ſanguinem effundit. 13. E
Veficæ ſanguineum profluuium raro mor=
tiferum. 13. E
Veficæ grummi & phlegmonæ exitiales
ſunt. 13. F
Veficæ grummi quæ ſequuntur. 32. A
Veficæ urinariæ pareſis. 19. F
Veficæ reſolutio. 47. C
Veficæ ulcerum ſigna. 32. B
Veficæ uulnus letale. 32. B
Veficæ calculi, uide Calculi.
Veficæ pus ſuſcipientis notæ. 70. F
Vefica cur non ualde refrigeranda. 61. G
Vefica laborante quæ pars corporis ſe=
canda. 61. F
Vefica laborans quibus irriganda. 61. F
Veficæ ægræ q̄ medicamina potāda. 61. G
Veficæ laboranti cicadæ utiles. 61. G
Veficæ laboranti iſeſiones q̄ utiles. 61. H
Veficæ laborāti quales cibi conueniant.
folio. 61. G
Veficæ grummi quibus diſſoluendi. 61. G
Veficæ inflammationi ſpecillo uti non p=
deſt. 61. H
Veficæ reſolutæ curatio. 47. D
Veficæ pus ſuſcipienti quomodo ſuccur=
rendum. 70. H
Veterno ſimilis eſt catochus. 45. H
Veternus flatibus abundat 44. H

A R E T A E I

Veternosis quale sit imū itestinū.	44.D	Viperatum carnes quomodo elephantice	
Veternosum excitantia.	44.C	paranda.	72.B
Veternus phrenitidi succedens quomodo		Visio alijs sensibus certior est.	20.G
curandus.	44.C	Vita principium in præcordijs est.	4.H
Veternus per se incipiens quomodo tol-		Vita principium cor.	6.D.33.A
lendus.	44.D	Vita quorū nō possit esse longior.	10.A
Veternosus quomodo habendus.	44.C	Viunt ob quæ præcipue animalia.	6.C
Veterno quando & qualis sectio uenæ qñ		Viura.	22.B
& qualis purgatio conueniat.	44.D	Vlcera Aegyptia, & Syriaca.	4.G
Veternoso inedia & cibi multitudo no-		Vlcus in articulo difficile est.	32.C
cet.	44.E	Vlcera intestinorum, uide Intestinum.	
Veternosorum cibi.	44.E	Vlcera renum, uide Renes.	
Veternosorū capitis irrigationes.	44.F	Vlcera uesticæ, uide Vesica.	
Veternosorum inunctiones.	44.F	Volatilium carnes natura leues.	68.C
Veternosis quando cucurbitula applican-		Voluulus, Ileus.	10.E
da & ubi.	44.H	Voluuli cause.	10.F
Veterni illitiones.	44.H	Voluulum qñ creat frigida potus.	10.F
Veterni fomenta.	45.A	Voluulus quas ætates plus minusue læ-	
Veternosis conuenientes potiones.	45.A	dit.	10.G
Veternosis utilia odoramenta.	45.C	Voluulus quo tempore anni plus minusue	
Veternosis pedes & genua quibus illinen-		infestat.	10.G
da.	45.D	Voluuli mediocris signa.	10.G
Veternosis conueniens cataplasma.	45.E	Voluuli maximi signa.	10.G
Veternosorum apophlegmatismi.	45.F	Voluuli in colo intestino signa.	11.A
Veternosis caput cur radendum.	45.G	Voluulus in colo cur minus periculo-	
Veternosis qñ lauatio proderit.	45.G	sus.	11.B
Veternosis quando prodest lenis corporis		Voluulus celerrime ac foedissimè necat.	
agitatio.	45.G	folio.	59.B
Veternosis urtica utilis.	45.D	Voluulo præsentissima remedia adhiben-	
Veterno similis est catochus.	45.H	da.	59.B
Victimæ cacoehymæ carnes habent grā-		Voluulo quādo missio sanguinis larga cō-	
dinosas.	40.B	ueniat.	59.B
Vigilia ad exterius mouet ac dissipat. so-		Voluuloso quando non secāda uena.	59.C
lio.	17.E	Voluulo qñ uomitus conuenit.	59.C
Vigilia & motus discutiunt.	44.H	Voluulosis quæ ano adhibenda.	59.C
Vigilia famem cit.	18.F	Voluulo conuenientes clysteres.	59.D
Vini epoti facultates.	44.A	Voluuloso quæ exterius uentri adhiben-	
Vini potus quorum auctor.	63.B	da.	59.D
Vinū solum refrigeratos restituit.	57.D	Voluuloso cucurbitula ubi apponenda.	
Vinum sine cibo sumptum lædit mentem.		folio.	59.D
folio.	57.C	Voluuloso quæ bibēda medicamēta.	59.E
Vini potio causo uexatis quando obest, qñ		Voluuloso cibi alium lenientes dādi.	59.F
prodest.	56.F	Voluuloso iura subducentia conueniunt.	
Vinum absinthite elephāticis bonū.	72.F	folio.	59.F
Viperæ remedium quō inuentum.	40.F	Voluuloso uinum quando prodest.	59.F

I N D E X

Vox mediocriter acuta capiti prodest.
 folio. 66.E
Vocem acutam edere quàm noceat capi-
ti. 66.E
Vrina interclusa quæ mala inferat. 12.G
Vrina interclusa qui pereant, qui libe-
rentur. 13.A
Vreteres, Vrinæ ductus. 13.D
Vrinæ canales. 30.E.31.B
Vrethra. 31.B
Vrſi adeps. 72.D
Vrtica esculenta est. 68.D
Vrtica ueternosis utilis. 45.D
Vteri functiones. 36.D
Vteri tunica. 37.D
Vteri membranæ. 37.D
Vteri tunica cur exit. 37.D
Vteri osculum quomodo procidit & re-
dit. 37.D
Vteri morbi longi. 36.D
Vteri fluoris differentie secundū mate-
rias. 36.E
Vteri fluoris differentie secundū circui-
tus. 36.E
Vteri profluij signa. 36.F
Vteri profluium quod pessimum. 36.G
Vteri profluium quod minime malum.
 folio. 36.G
Vteri ulcera. 36.H
Vteri cancer. 37.B
Vua. 3.H.4.A.50.A
Vuæ & columnæ celerrime succurren-
dum. 50.A
Vuæ & columnæ uenæ sectio qualis con-
uenit. 50.A
Vuæ & columnæ conuenientes clyste-
res. 50.B
Vuæ & columnæ conuenientes ligatu-
re. 50.B
Vuæ & columnæ quando & ubi cucur-
bitula conueniat. 50.B
Vuæ & columnæ adstringentia quæ con-
ueniant. 50.C
Vuæ ulceratæ quæ adhibenda. 50.C
Vulpanser aut species. 72.D

Vulturis cerebrum. 67.G
Vulvæ situs. 13.G.62.A
Vulvæ natura. 62.A
Vulva ueluti in animali quoddam ani-
mal. 13.G
Vulva quibus delectetur & contristetur.
 folio. 13.G
Vulvæ mobilitas. 13.G
Vulva suapte natura superfluitat. fo-
 lio. 14.C
Vulvæ ascendenti cause. 14.A
Vulva superiora petens quantum ledat.
 folio. 13.G
Vulva sursum petens celerrime strangu-
lat. 62.B
Vulvæ strangulatui morbus similis. 13.H
Vulvæ strangulatus cause. 14.A
Vulvæ strangulatus quas ætates uexet.
 folio. 14.C
Vulvæ strangulatus affectæ post mortem
magis rubent. 14.D
Vulvæ exitus. 37.C
Vulvæ exitus cause. 37.D
Vulvæ exitus plerunque mortiferus un-
de. 37.C
Vulvæ morbi communes uiris. 14.D
Vulvæ sanguinis profusio celeriter ne-
cat. 14.D
Vulvæ inflammata quæ accidant. 62.D
Vulvæ prodest ut menses ferantur. 62.F
Vulvæ prodest hiera cum castoreo. 62.F
Vulva quomodo uiolentius depellenda.
 folio. 62.E
Vulvæ sursum lapsa inferius quæ appo-
nenda. 26.D
Vulvæ detrahenda ubi cucurbitula defi-
gantur, ubi strangulatui leuādo. 62.E
Vulvæ strangulatum sedantia. 62.C
Vulva infestante quibus ad se redibit mu-
lier. 62.F
Vulvæ inflammata strangulatui quæ uena
secta opituletur. 62.E
Vulva inflāmata quæ uena secanda. 62.C
Vulva inflāmata quibus anus inungendus
& quibus clysteribus utendū. 62.D

INDEX EORVM QVAE SVNT IN RVFFI LIBRIS.



Bdomen. fol.	Antisternon.	86. A	Bilis atra.	81. C
76. H. 83. H	Antitragus.	83. A	Bilis flaua.	81. C
Acetabula.	Anularis digitus.	76. E	Bilis porracea ac rugino=	
77. E. 89. F	83. E		sa.	81. C
Acetabulum humeri. 76. B	Anulus.	87. C	Bilis receptaculum seu ua=	
Achichadaron.	Aorta.	80. G	sculum.	86. C. 79. G
Acini.	Aorta.	79. B	Bilis meatus ad intestina.	
Acini cacumina.	Aqualiculus.	76. H	86. C	
Acinalis tunica oculi 85. D	Aquila uenae.	80. E	Bilisusus.	86. C
Acromion.	Arachnoides tunica.	78. B	Blepharides.	74. G
Acromphalon.	Aranealis tunica.	78. H	Brachiale.	76. D. 89. C
Actiui nerui.	85. E		Brachium.	76. D. 83. E.
Adenes qui sint.	Arcula.	88. G	89. B	
Et ubi.	Arca.	79. E	Bronchia.	79. B. 86. A
Adeps.	Arteriarum munus est mi=		Bronchus.	76. A. 83. D
Adstrictor.	care.	80. G. 88. A	86. A	
Agnina membrana.	Arteriae ab antiquis uenae		Bruta iugulis caret.	76. A
Ala.	dictae tortae, spirabilia			
Alae seu pinnae nasci.	uasa, caeuernae, inanita=			
Altrices uenae testium. fo=	tes, nerui.	80. G		
lio.	Arteria crassa.	80. H		
Aluus.	Arteria aspera.	76. A.		
Amatorium.	83. D			
Amnios membrana.	Arteriae et uenae pulmonis			
Amphidion.	quales.	80. F		
Amphiplx.	Arterialis uena.	80. F		
Anatome humanorum cor	Ascoma.	76. G		
porum antiquitus fie=	Aspera arteria.	86. A		
bat.	Assessor os hyoides.	79. A		
Ancon.	Assessores.	79. H. 87. F		
Ancystroides et Ancyroi=	Astragali.	77. D		
des processus.	Atra bilis.	81. A		
Anguli oculorum.	Auditus.	75. C		
82. G	Auditorij meatus.	83. A		
Animalia homini similia.	Auricula.	79. C. 83. A		
77. H	Auriculae cordis.	86. F		
Anthelices.	Auriginis ortus.	86. C		
Anthereon.				
Antiades.				
Anticardion.				
Antilobis.				

B Asis. folio. 79. F
Biceps exortus.
79. E

C Aeca foramina.
folio. 78. D
Cecum intestinum. 79. E
87. C
Caelum. 83. C
Calor. 81. E
Caluarie foramina in fun= do. 88. G
Caluaria. 88. F
Calx. 77. G. 84. D
Candida oculi tunica. 75. A
85. C
Canini dentes. 75. F
Canthus. 74. H
Caput. 82. B
Capitis suturae. 78. A
Caput geminorum. 77. B
Caput humeri. 76. D
Caput lientis. 79. G
Caput scroti. 84. A
Caro musculorum. 81. B
Carotides arteriae. 80. H

R V F F I I N D E X

Cartilagine. 81.A.88.B	Collum. 76.A.83.D	Cratere. 75.F
Caro uiscerum. 81.A	Colli uertebrae. 88.H	Crassa arteria. 80.H
Cauerna. 79.B.80.G	Collum uteri. 8.C	Cremni. 77.C
Caua uena. 80.D	Collum uesticae. 77.A	Crines. 74.F.82.E
Cauum. 74.G	Colon. 79.E.87.C	Crotaphi. 74.F
Cauum pedis. 84.D	Columella. 83.C.85.G	Crystalloides tunica oculi
Centones. 77.D	Columna. 75.C.H.82.F	78.H.83.E
Cercis. 89.B	Conceptacula cordis. 86.F	Ctedones. 85.D
Cerebellum. 85.A	Concha. 75.D.83.A	Cubicum os. 89.H
Cerebrum. 81.B	Condyl. 76.E	Cubitus 76.D.83.E.89.B
Cerebrum in homine maxi	Conuexum iecoris. 79.F	Cubitissare. 76.D
mum. 85.A	Coniungens futura. 78.B	Cuculus. 77.D.84.B
Cerebri substantia. 85.A	Copulatiui nerui. 81.A	Cunus. 80.C
Cerebri uentriculi. 78.F	Cor. 76.G.83.G	Cypselis. 81.C
Cerebri ps uaricosa. 78.F	Cordis auriculae. 86.F	
Cerebri membranæ. 78.F	Cordis caput. 79.B	
Cerebri pria tunica. 85.B	Cordis conceptacula. 86.F	
Cerebri secunda tunica.	Cordis corpus. 86.E	
85.B	Cordis forma. 86.E	
Ceruix. 76.A.80.C.83.	Cordis motus. 86.E	
C.D	Cordis sinus. 86.E	
Ceruix linguae. 75.G	Cordis situs. 86.E	
Cerumina. 81.C	Cordis morsus. 76.G	
Cesta. 76.G	Coræ, Pupilla. 82.G	
Chela. 74.G	Cornea oculi tunica. 85.C	
Chemosis. 75.A	Cornicularis tunica. 75.A	
Cheta. 82.E	78.G	
Chorion. 85.E	Cornua & Cirri. 80.B	
Choroides tunica cerebri	Corona. 75.A	
78.F	Corona. 74.G	
Choroides tunica oculi	Corona futura capitis.	
85.D	82.E	
Chylos. 81.E	Coronaria futura. 78.B	
Chymos. 81.E	88.F	
Cilia. 74.G.82.G	Corse. 74.F	
Circuossalis tunica. 78.A	Coryza. 75.B	
Circulus. 82.G	Costa. 83.G	
Cirri. 80.B	Costarum forma. 89.D	
Claues. 83.D	Costæ spuria. 76.G.83.	
Clitoris. 77.C	G.89.E	
Clunes. 77.E.84.B	Cotyla. 89.F	
Coccyx. 77.D.8.B	Coxa. 89.E	
Coles. 84.A	Coxendix. 77.E	
Colis. 77.A	Cremnaster. 80.D	

D

D Artos. fol.86.D
87.G
Deiectiones albae. 86.C
Delphis. 80.B
Dens uertebra. 79.A
Dentes. 75.F.83.B
Dentes incisores. 83.B
Dentes genuini. 75.G
Dera. 83.D
Dextra ptes cur sinistris
ualidiores. 86.D
Digitum terna ossa præ
ter pollicem. 89.C
Digitus magnus. 76.E
Digitus medius. 76.E
Dionysius Oxymachi 80.F
Diploe. 78.B
Discoides tunica oculi.
85.E
Dodecadactylus. 87.B
Dorsalis medulla. 78.G
81.B
Dorsum nasi. 75.C
Dorsum scapularū. 76.B
Draconitides uenæ. 80.E
E
E Florescentia. fo=
lio. 80.F
***** ij

R V F F I

Electiui nerui. 81. A
 Epanthismos. 80. F
 Ephebeon. 76. H
 Ephedrana. 84. B
 Epidermis. 75. A
 Epigastrium. 76. H. 83. H
 Epiglossis. 75. H. 83. C. 85. F
 Epigonatis. 77. F. 89. G
 Epigunides musculi. 84. C
 Epimylis. 77. F
 Epiploon. 79. F
 Episton. 77. C. 83. H
 Episcenion. 74. F. 82. E
 Ε πὶ τριῶν cubicum os.
 89. H
 Epomides. 76. B. 83. D
 Erythroides tunica. 80. D
 87. G
 Eudemus. 80. F
 Eunuchi quale semen eij=
 ciunt. 87. G
 Exortus biceps. 79. E
 Extremitas nasi. 75. C

F

F Aba. folio. 76. G
 Facies. 75. E
 Fauces. 75. H
 Femina. 77. E. 84. E
 Femora. 89. F
 Fibra. 75. D. 83. A
 Fissum. 84. A
 Flatus. 81. C
 Flaua bilis. 81. C
 Frons. 74. F. 82. E
 Fundum cordis. 79. B
 Fundū scroti. 77. B. 84. A
 Fundum uteri. 80. C

G

G Astrocnemia. fo=
 lio. 77. F
 Gemini testes. 77. B
 Geminorum caput. 77. B

Gena. 74. G
 Genitales uenæ. 79. H.
 87. F
 Genitura. 80. B. 81. D
 Genuini dētes. 75. G. 83. B
 Genu. 77. F
 Gingiua. 75. G. 83. B
 Glabella. 74. F. 82. E
 Gladius in iecore pars.
 79. G
 Glandulosa (uasa semina=
 ria). 79. H. uel glandu=
 lost. 87. F
 Glandulosa carnes. 83. A
 Glans. 77. A
 Glena. 74. H. 82. G
 Globulus. 75. C. 82. F
 Gonos. 81. D
 Gracile intestinum. 79. E
 Gula. 79. B. 86. A
 Gula figura. 86. H
 Gula munus. 86. H
 Gula situs. 86. G
 Gurgulatio. 76. B
 Gurgulio. 75. H. 83. C
 Guttur. 76. B. 79. B. 83. D

H

H Abena. fol. 75. G
 83. B
 Helice. 75. D. 83. A
 Hemina. 77. D
 Hepaticis. 80. E
 Hilithya membrana cur
 Ammias dicta. 81. F
 Hircus. 75. D
 Hō exiguus mundus. 85. A
 Homo latissimi pectoris
 est. 76. C
 Hostiarius. 79. D. 87. A
 Hostium uentriculi. 83. G
 Hostium uteri. 80. C
 Humerus. 76. B. C. 83. E
 88. H.

Humeri brachiorum capi=
 ta. 83. D
 Humeri acetabulum. 76. B
 Humeri caput. 76. D
 Humeri forma & situs.
 89. B
 Humeri uteri. 80. C
 Humor uitreus. 85. E
 Humores in tunick foetus.
 81. F
 Hyaloides tunica oculi.
 78. H
 Hypena. 75. F
 Hypochōdria. 76. G. 83. H
 Hypodermis. 77. C
 Hypodiris. 76. A
 Hypoglossis. 75. H. 83. C
 Hypoglutides. 77. E
 Hypopia. 75. B. 82. H
 Hyporinon. 75. C. 82. F
 Hyposphondylon. 77. D.
 84. B
 Hypostema. 84. A
 Hypothenar. 76. E
 Hypothenatron. 83. E
 Hystera. 80. B

I

I Anitor. folio. 79. D
 Iecur. 86. B
 Iecoris conuexum. 79. F
 Iecoris porta. 79. G
 Iecoraria uena. 80. E
 Ieiunum. 79. D. 87. B
 Iliā. 77. D
 Ilium ossa. 77. D
 Inanitates. 80. G
 Incisores dētes. 75. F. 83. E
 Index digitus. 76. E. 83. E
 Inguina. 77. E. 84. C
 Intercostalīa. 76. G. 83. G
 Interfemina. 77. E
 Internodia. 76. E. 83. F.
 89. C. 90. D

Inter

I N D E X

Intersepientes membra=
na. 79.C

Interseptum seu Septū trās
uersum. 86.G

Interseptum nasi. 75.B
82.F

Intestinum. 79.D

Intestinum cæcum. 79.E

Intestinum gracile. 79.E

Intestinorū gracilium om=
nium longitudo & si=
tus. 87.B

Intestinum maius. 87.C

Intestinum rectum. 87.C

Intestinum laxum. 79.E

Intestinorum omnium unū
& idē foramen. 87.A

Iris. 74.C.82.G

Isthmus. 85.H

Iter urinarium. 77.A

Ithmoide foramina. 78.B.
uel Ithmodes os. 88.G

Iugalia ossa. 78.C

Iugula. 76.B.83.D

Iuguli forma et situs. 89.A

Iugulatio. 83.D

Iulus. 75.E. seu Iuli. 47.F.
82.E

L

L Abia. folio. 75.C.
82.F

Lac. 81.D

Laccopedon. 77.B.84.A

Laccoschea. 77.B

Lacertus. 83.E

Lactes. 79.E.87.D

Lambdalis futura. 88.F

Lambdoides futura. 78.H

Lanugo. 74.F.75.E.82.E

Laparae partes. 77.D

Lapidea ossa. 78.C

Lata scapularū ossa. 76.B

Latus. 76.G.83.G

Laxum intestinum 79.E

Lenticularis mēbrana ocu=
li. 78.H.85.C

Lepidoides futura. 78.B

Leucania. 75.E.76.B.
82.H

Lienaria uena. 80.E

Lientis caput. 79.G

Lientis forma. 86.D

Lientis uenæ quales. 80.E

Lingua. 75.G.85.F

Linguae ceruix. 75.G

Linguae radix. 75.G

Lobus. 75.D

Loci muliebres. 80.C

Lumbi. 76.F.83.G.84.B

M

M Agnus digitus.
fol. 76.E.83.E

Maius intestinum. 87.C

Malæ. 75.E.82.H

Malleoli. 77.F.84.D

Mammæ. 76.F.83.G

Manus. 76.E

Marmorata. 86.I

Mandibulæ. 82.H

Maxillæ. 75.E.82.H

Maxillares dentes. 75.F

Meatus auditorij. 83.A

Meatus bilis ad intestina.
86.C

Medius digitus 76.E.83.E

Medulla. 81.B.88.C

Medulla dorsalis seu spi=
nalis. 78.G.81.B.85.B
39.D

Medulla ossalis. 81.B

Membranæ. 81.A

Membranæ cerebri. 78.F

Membranæ intersepien=
tes. 79.C

Membrana succingens.
86.G

Mēbranula spinalis. 81.B

Mēsa in iecore pars. 79.G

Mensæ. 75.G.83.B

Menses. 81.D

Mentum. 75.E.82.H

Mesaraeon. 79.E.87.D

Mesenterion. 79.E.87.D

Mesomenia. 77.E

Mesophryon. 74.F.82.E

Metacarpion. 76.D

Metacondyli. 76.E

Metaphrenon. 76.F.83.F

Metra. 80.B

Minimus digitus. 83.E

Mnesthei opinio d Chylo,
& Chymo. 81.E

Mola. 84.C.89.G

Molares dētes. 75.F.83.B

Morsus cordis. 76.G

Mortariola. 75.G.83.B

Mucor. 75.B

Mucus. 81.C

Muliebres loci. 80.C

Muliebris sinus. 80.C

Musculus. 88.B

Musculi tēporarij. 78.D

Musculorum caro. 81.B

Myrtachilæ. 77.C.84.B

Myrton. 77.C.84.B

Mystaces. 75.F

Myxa. 75.B

N

N Ares. fol. 82.F
Nasus 75.B.82.E

Nasi dorsum. 75.C

Nasi extremitas. 75.C

Nasi interseptum. 75.B

Nasi pinnæ. 75.C

Nates. 75.B.77.E.84.B

Naiculare os. 90.A

Neruus. 88.B

Neruorum origo. 78.F

Neruorum natura duplex

***** ii

secūdum Erasistratum.

88.C

Neruorū facultates. 78.F

Nerui triplices secūdū Herophilum. 88.C

Nerui actiui, electiui, sensorij. 78.F.81.A

Nerui copulatiui. 81.A

Nerui uisorij. 85.C

Neruius latus. 84.C

Nerui arteriæ ab antiquis uocabantur. 80.G

Niera. 79.E

Nodi. 83.F

Noia prius in qualibet facultate discenda. 82.A

Nympha. 75.C.77.C.

84.B

O

Occipitium. folio. 83.D

Occiput. 74.F.82.E

Oculi tunica prima. 75.A
85.C

Oculi tunica secūda. 85.D

Oculi tunica tertia. 85.E

Oculi tunica quarta. 85.E

Oculorum anguli. 82.G

Oesophagus. 79.B

Olecranon. 76.D.83.E

Omentum. 79.F

Omenti usus. 87.E

Omenti uulnus periculo uacat. 87.E

Omoplate. 76.B

Opinio Mnesitheï de chybo, & chymo. 85.E

Opinio Zenonis de calore & spiritu. 81.E

Opinio Praxagoræ de succis. 81.D

Orrhos. 77.A

Os. 75.F.83.B

Os uentriculi. 76.G

Ossa. 88.B

Oscubicū ἐπὶ τριῶν. 89.H

Os nasi. 88.G

Os nauiculare. 90.A

Os pectoris. 76.F.83.G

Ossa ilium. 77.D

Ossa iugalia. 78.C

Ossa lapidea. 78.C

Os sacrum. 77.D.84.B.
89.E

Ossa scapularū lata. 76.B

Ossalis medulla. 81.B

P

P Alatum. folio. 75.
H.83.C

Palma. 76.D.83.E

Palpebræ. 74.G.82.G

Pancreas. 79.F

Papilla. 76.F.83.G

Pappus. 75.F

Parameria. 77.E

Parasira. 75.G.83.C

Parencephalis. 78.F

Paristhmia. 76.A.85.H

Patella. 77.F.84.C.89.G

Pecten. 76.H.77.C.83.
H.84.A.89.E

Pectus. 76.F.77.G.83.F

Pectus manus. 83.E

Peluis. 85.C. seu peluicula. 88.G

Penis. 84.A

Perforata oculi tunica. 85.D

Pericardios mēbrana. 79.
C.86.F

Pericranios tunica. 77.H

Perineus. 84.A

Periostios tunica. 78.A

Peritoneos. 79.F

Feza. 84.D

Phalanges. 76.E.83.F.

89.C

Pharinx. 85.H.86.A

Philistio Italus medicus
80.E

Philtron. 75.C.82.E

Phrenes. 79.C

Pinguitudo. 88.A

Pinnae auriū. 75.D.83.A

Pinnae nasi. 75.C

Pituuta. 81.C

Plata. 77.G.84.D.90.A

Plicas. 77.B.84.C

Pollex. 76.E.83.E

Poples. 77.F.84.C

Porracea ac ruginosa bilis
81.C

Portæ Mensa, Gladius, Vnguis in iecore. 79.G

Porta iecoris. 79.G

Præcordia. 76.G.83.H

Præcordium. 76.G

Praxagoræ opinio de Succis. 81.D

Prælinguium. 83.C

Præputium. 77.A.84.A

Præputij summum. 77.A

Præsepia. 83.B

Princeps intestinū. 79.E

Probarbium. 75.F

Procardia. 83.G

Procardion. 76.G

Prochyla. 75.C.82.F

Procondyli. 76.E.83.F

Profluuium. 81.D

Proglosson. 83.C

Prolabia. 75.C.82.F

Propogonium. 75.F

Prostomion. 75.C.82.F

Pterigomata. 77.C

Pusæ. 80.A

Pubes. 76.B.83.H

Pudenda. 80.C

Pulmo. 86.A

Pulmonis uena & arteriæ

I N D E X

quales. 80.F
Pulsus. 88.A
Pupilla. 74.H
Pyelides. 88.G
Pyloros. 79.D
Pyrinoides uertebra.
79.A

Q

Q Vatrio Alla=
chius. fo=
lio. 89.H.

R

R Adius. fol. 89.H
Radij sinus duo
89.C

Radices ungiū. 83.F
Radix linguae. 83.C
Rectum intestinum. 87.C
Renes. 79.G
Renū cribra. 87.D
Renū meatus. 87.E
Ren dexter altior & ma=
ior sinistro. 87.D
Renū uulnus mortife=
rum. 87.D

S

S Acrum os. fol. 77.
D. 89.E

Sacra ueteres omnia ma=
gna nominabant. 89.E
Salua. 81.C
Sanguis. 81.C
Sanguineus sinus. 86.E
Scaphula. 88.F
Scapularū ossa lata. 76.B
Schisma. 77.C
Sciissura. 77.C
Scoptula operta. 83 + D.
88.H
Scrotum. 77.A. 88.A
Scroti caput. 84.A

Scroti fundū. 77.B. 84.A
Scuticula. 76.E. 83.F
Scytades. 89.C
Secundae. 81.F
Sedes. 79.E
Sedilia. 77.E
Sedimentum. 77.A. 84.A
Semen. 81.D
Semen foecundum. 87.F
Semen infocundum. 87.F
Seminaria uasa glandulo=
sa. 79.H
Seminaria uasa uaricosa.
79.H. 87.F

Seminaria uasa & in fo=
minis sunt. 79.H
Sensorij nerui. 81.A
Septum trāsuersum. 79.C
83.G. 86.G
Seranges. 81.B
Sinus muliebris. 80.C
Sinus spirituosus. 86.E
Sinus sanguineus. 86.E
Sophronisteres. 75.G.
83.B

Spatula. 83.G
Sperma. 81.D
Sphincter. 87.B.C
Spina. 77.D. 83 + D. 84.
B. 89.E

Spinnalis medulla. 78.G.
81.B. 85.B. 89.D

Spinnalis membranula.
81.B

Spiritus. 81.E
Spirabilia uasa. 80.G
Spirituosus sinus. 86.E
Splenitis. 80.E
Spuria costae. 76.G
Squamosae suturae. 88.G
Stema. 77.A. 82.A
Sternon. 77.F. 89.G
Stethos. 76.E. 77.G
Stiloides processus. 78.D

Stomachus. 29.A
Subcartilaginea. 83.H
Subcauum. 74.G
Subcaui tumor. 74.G
Sub mala habere. 76.G
Subnatales. 77.E
Subocularia ossa. 75.B.
82.H

Succingens membrana. 79.
C. 86.G

Sudor. 81.C
Sumen. 83.H
Sura. 77.F. 84.C.D.
89.G

Supercilia. 74.F. 82.E
Supertentorium. 74.F.
82.E

Suspensor. 80.D
Suturae capitis. 77.H
88.F

Suturae squamosae. 88.G
Suturae in facie. 88.G
Synciput. 74.F. 82.B
Scytalides. 90.A

T

T Alus. folio. 77.F
89.H

Tarsti, idest Cilia oculorum
74.G. 82.G

Tarsus Os pedis. 77.G.
84.D. 90.A

Tempora. 74.F. 82.E
Temporarij musculi. fo=
lio. 78.D

Tendones. 76.B. 81.A
Tenores. 79.B

Tergum. 83.F
Testes gemini 77.B

Testium altrices uena. fo=
lio. 80.D

Testium materia. 87.H
Thenar. 76.E. 83.F

Thora. 81.D

R V F F I I N D E X

Thorax.	74.E.82.B	lio.	79.H.87.F	Visto.	74.B
Thymus.	79.D	Vasculorum seminis exi =		Visorij nerui.	85.C
Tibia. fol.	77.F.84.D.	tus.	87.F	Vitreata tunica.	85.E
	89.G	Vasculum bilis.	79.G	Vitreus humor.	85.E
Tibiae processus.	89.H	Vber.	76.G	Vlna.	83.E
Toni.	79.B.81.A	Vbera.	76.F	Vmbilicus.	76.H.81.F.
Tonsillae.	76.A.85.G	Venarum officium.	88.A		83.H
Tragus.	75.D.83.A	Venae aquilae.	80.E	Vnguis.	75.A
Trammis.	77.A	Venae arteriales.	80.F	Vnguium radices.	76.E.
Transuersum septum. fo =		Venae draconitides.	80.E		83.F
lio.	79.C	Venae uel arteriae pulmo =		Vnguis in iecore.	79.G
Tunica.	81.A	nis quales.	80.F	Vngulae.	74.G
Tunica prima cerebri. fo =		Venae genitales.	79.H.	Vola.	76.F.83.E.F
lio.	85.B		87.F	Vreteres.	77.A.79.H
Tunica secunda cerebri. fo =		Venae lients quales.	80.E	Vrethra.	77.A
lio.	85.B	Venter. fol.	76.H.79.D.	Vrina.	81.C
Tunica aranealis.	85.E		83.H	Vrinaculum.	81.F
Tunica candida.	85.C	Venter inferior.	79.E	Vrinarium iter.	77.A.
Tunica cornicularis.	78.G	Ventriculus.	79.D.86.H	Vter.	76.G
Tunica oculi cornea.	85.C	Ventriculi forma.	86.H	Vterus.	80.B.C
Tunica uitrea.	85.E	Ventriculi natura.	87.A	Vteri figura.	87.H
Tunica reticularis.	85.E	Ventriculi situs.	86.H	Vteri situs.	87.H
Tunica oculi prima.	85.C	Ventriculi os.	76.G	Vterales nerui.	80.A
Tunica oculi secunda.	85.D	Ventriculi cerebri.	78.F	Vua.	75.H.83.C.85.G
Tunica oculi tertia.	85.E	Ventriculi cordis.	79.B	Vualis tunica.	85.D
Tunica oculi quarta.	85.E	Vertex.	74.F.82.E	Vuifer processus.	75.H
Tunica oculi perforata.		Vertebrae.	77.D.84.B	Vulpes.	80.A
	85.D	Vertebrarum structura et		Vulua.	80.B.C
		forma.	89.D		
		Vertebrae omnes quatuor			
		& uiginti.	89.D		
		Vertebrae colli.	88.H		
		Vertices.	76.E		
		Vesica.	79.H		
		Vestigium.	84.D		
		Vetula.	76.H.83.H		

V

V Aricosa pars cerebri. folio. 78.F
V aricosa seminis uasa. fo =
lio. 79.H.87.F
V asa seminis. 79.H
V asa seminis uaricosa. fo =

Y

Y Psiloides ossiculum. folio. 79.A

Z

Z Enonis opinio de Calore & Spiritu. folio. 81.E

F I N I S T A B V L A E.

Errores sic corrigito.

Prior numerus significat folium, a priorem paginam, b'
posteriorem posterior numerus lineam indicat.

2. a 10. effertu. lege effertur. b 1. etates. lege atates. 6. b 13.
præcipua. lege præcipue. b 38. continue. lege continuo. 11. a 18. agrotant.
lege agrotant. b 19. circa. lege citra. 13. a 4. plegmone. lege phlegmone
a 11. continentur. lege continenter. a 34. legendum. Sed mors
ab ulceribus sanè quàm celerrima inuadit. 16. a 20. melancholica. lege
melancholia. 26. a 22. staturata. lege saturata. 29. a 17. euidenter.
lege euidentes. 38. b 27. medicabilis. lege immedicabilis. 40. a 12.
fastidio. lege fastigio. 44. a 38. nico. lege cnico. 45. a 6. rype. lege
ryte. 48. b 19. totibus. lege fotibus. 52. a 36. Picærium. lege Pi-
cerium. 55. b 9. electro. lege Electro. 58. a 9. lege plane concocta
erunt. 62. a 1. Rhæas. lege Rhœas. 63. b Cap. xiiij. & xv. lege
xij. & xiiij. 64. b 37. malefactum. lege madesactum. 67. a 7. flari-
bus. lege flatibus. 6. b 28. reperies. lege cum interrogatione. 71. b 22.
maiore. lege maiora. 74. b 36. lege. De oculi. 75. a 19. Coryxam.
lege coryzam. 78. a 40. uocant. lege uacant. 79. a 11. Osophagus.
lege Oesophagus. 80. a 14. neruus. lege neruos. a 16. loci. lege locis.
b 16. Efflorescentiam. lege Eflorescentiam. 82. b 38. ueràm. lege ue-
rùm. 89. b 26. Epigomatida. lege Eptigonatida.

Reliquos tum ad orthographiam, tum ad alia, si qui sint, spectantes, facile sibi
unusquisque corriget.

Registrum.

* A B C D E F G H I K L M N O P

Q R S T V X Y.

*, **, ***, ****, Duerniones omnes preter

Y & ****, Terniones.



VENETIIS APVD IVNTAS.

M D L I I

